


府 食 第 1028 号  
平成 16 年 10 月 7 日

厚生労働大臣  
尾辻 秀久 殿

食品安全委員会

委員長 寺田 雅昭



### トルフェンピラドに係る食品健康影響評価の結果の通知について

平成 16 年 7 月 12 日付け厚生労働省発食安第 0712003 号をもって厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に意見を求められたトルフェンピラドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので通知します。

なお、農薬専門調査会において各種試験結果概要及び評価結果をまとめた評価書を添付します。

記

トルフェンピラドの一日摂取許容量を 0.0056mg/kg 体重/日と設定する。

# 農薬評価書

## トルフェンピラド

2004年10月6日

食品安全委員会農薬専門調査会

<検討の経緯>

2002年4月24日 初回農薬登録  
2003年9月11日 農薬登録申請（適用拡大）  
2004年7月12日 厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請  
2004年7月15日 食品安全委員会第54回会合（要請事項説明）  
2004年7月21日 農薬専門調査会第14回会合  
2004年9月2日 食品安全委員会第60回会合  
2004年9月2日より2004年9月29日 国民からの意見聴取  
2004年10月6日 農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長へ報告

<食品安全委員会委員>

寺田雅昭（委員長）  
寺尾允男（委員長代理）  
小泉直子  
坂本元子  
中村靖彦  
本間清一  
見上彪

<食品安全委員会農薬専門調査会専門委員>

鈴木勝士（座長）  
廣瀬雅雄（座長代理）  
石井康雄  
江馬眞  
太田敏博  
小澤正吾  
高木篤也  
武田明治  
津田洋幸  
出川雅邦  
長尾哲二  
林真  
平塚明  
吉田綠

## 要約

ピラゾール環を有する殺虫剤である「トルフェンピラド」(IUPAC: 4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(*p*-トリルオキシ)ベンジル]ピラゾール-5-カルボキサミド)について、各種毒性試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に供した試験成績は、動物代謝（ラット）、植物代謝（なす、キャベツ、もも）、土壤代謝、水中光分解、作物残留、土壤残留、急性毒性（ラット、マウス）、亜急性毒性（ラット、マウス、イヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒性/発がん性（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット、ウサギ）、遺伝毒性試験等である。

試験結果から、発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

各試験の無毒性量の最小値はラットを用いた慢性毒性／発がん性併合試験の0.56mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.0056mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）とした。

## I. 評価対象農薬の概要

### 1. 用途

殺虫剤

### 2. 有効成分の一般名

和名：トルフェンピラド

英名：tolfenpyrad (ISO 名)

### 3. 化学名

IUPAC

和名：4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(*p*-トリルオキシ)ベンジル]ピラゾール-5-カルボキサミド

英名：4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(*p*-tolyloxy)benzyl] pyrazole-5-carboxamide

CAS(No.129558-76-5)

和名：4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(4-メチルフェノキシ)フェニル]メチル-1*H*-ピラゾール-5-カルボキサミド

英名：4-chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxamide


### 4. 分子式

C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>O<sub>2</sub>

### 5. 分子量

383.9

### 6. 構造式



### 7. 開発の経緯

トルフェンピラドは、1991年に三菱化学株式会社により発見されたピラゾール環を有する殺虫剤であり、その作用機構は主にミトコンドリアにおける電子伝達系の阻害によるものと考えられる。

トルフェンピラドは海外では、いずれの国においても登録されていない。我が国では2002年4月24日に野菜、茶等を対象に初めて登録され、原体ベースで28トン（平成14農薬年度）生産されている。（参照1）また、2003年9月に日本農薬株式会社（以下「申請者」とする。）より農薬取締法に基づく適用拡大登録申請がなされ、参照2～24、28～82の資料が提出されている。（参照2）

## II. 試験結果概要

### 1. 動物体体内運命試験

トルフェンピラドのピラゾール環を<sup>14</sup>Cで標識したもの(Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド)、トリル環を<sup>14</sup>Cで標識したもの(To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド)を用いて各種試験が実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合トルフェンピラドに換算した。(他の代謝試験も同様)

#### (1) ラットにおける動物体内運命試験(単回投与)

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド 1mg/kg 体重(低用量)、20mg/kg 体重(高用量)又は To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを 1mg/kg 体重(低用量)<sup>1</sup>の用量で単回経口投与し、トルフェンピラドのラットを用いた動物体内運命試験が実施された。

全血中放射能濃度の推移は表1のとおりである。

表1 全血中放射能濃度推移

投与量	低用量 (1mg/kg 体重)		高用量 (20mg/kg 体重)	
性別	雄	雌	雄	雌
T <sub>max</sub> (hr) *	2	4~6	6~8	4~12
C <sub>max</sub> (μg /mL) *	0.27~0.30	0.25~0.28	1.93~2.22	2.23~2.37
T <sub>1/2</sub> (hr) *	12.1~16.4	11.0~27.6	12.6~16.3	11.5~14.2

\*T<sub>max</sub>: 全血中放射能最高濃度到達時間、C<sub>max</sub>: 全血中放射能最高濃度、T<sub>1/2</sub>: 半減期

トルフェンピラドは投与後72時間以内に80%以上が排出された。投与後168時間の糞中排泄率は88.2~93.2%、尿中排泄率は1.7~3.0%であり、呼気中排出率は0.1%未満であった。Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド投与後48時間の胆汁中排泄率は51.3~69.5%であった。主要な組織の残留放射能は表2のとおりであった。(参照3)

表2 単回投与における主な組織の残留放射能 (μg/g 臓器)

投与条件		全血中最高濃度到達時付近*	投与168時間後
Py- <sup>14</sup> C 低用量	雄	肝臓(5.40), 胃(1.92), 小腸(1.68), 腎臓(1.35), 心臓(0.8), 血漿(0.46)	全ての組織で0.08以下
	雌	肝臓(5.70), 胃(1.96), 小腸(1.46), 腎臓(1.38), 褐色脂肪(1.11), 心臓(0.88), 血漿(0.65)	全ての組織で0.08以下
	雄	肝臓(5.56), 胃(2.47), 小腸(1.84), 腎臓(1.65), 褐色脂肪(0.93), 心臓(0.89)	全ての組織で0.08以下
	雌	肝臓(5.74), 胃(2.08), 小腸(1.48), 腎臓(1.41), 褐色脂肪(1.39), 心臓(0.88)	

\* 全血中放射能濃度推移試験においては20mg/kg 体重(高用量)投与群も実施された。

Py- <sup>14</sup> C 高用量	雄	胃(25.2), 肝臓(18.6), 小腸(13.4), 大腸(5.85), 腎臓(4.88), 血漿(4.14), 褐色脂肪(3.12), 心臓(2.79)	骨髓(1.6), 脂肪(1.27), 褐色脂肪(1.11), 皮膚(0.99)
	雌	胃(22.0), 肝臓(20.0), 小腸(12.7), 大腸(6.92), 血漿(5.50), 褐色脂肪(5.17), 腎臓(4.95), 心臓(3.06)	骨髓(2.6), 皮膚(1.64), 脂肪(1.42)

※低用量：投与 4 時間後 ( $T_{max}$  付近)、高用量：投与 6 時間後 ( $T_{max}$  付近)

投与後 48 時間までの尿及び糞への排泄は、尿中ではトルフェンピラドは認められず、代謝物は全て 1.0% 以下であり、糞中ではトルフェンピラドが処理放射能の 4.1~15.1%、代謝物として PT-CA、Sul-OH-PT-CA 及び OH-PT-CA がそれぞれ 23.9~48.9%、5.3~11.7% 及び 6.4~12.9% 認められた。投与後 48 時間までの胆汁中への排泄は、トルフェンピラドが処理放射能の N.D. ~ 0.7% 認められ、代謝物として PT-CA-TA, PT-CA-GA, PT-CA (それぞれの代謝物の合計)、Sul-OH-PT-CA 及び CO-PT がそれぞれ 31.3~42.9%、4.7~7.7% 及び 3.7~7.4% 認められた。

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを低用量又は高用量投与し、血漿、肝、腎及び白色脂肪中の代謝物濃度が測定されたところ、トルフェンピラドはほとんど認められず、主要代謝物は PT-CA であり、検出された代謝物量の約 90% を占めていた。用量及び性差による代謝物の生成パターンに差異は認められなかった。

トルフェンピラドの主要代謝経路はトリルオキシ環のメチル基の酸化 (PT-CA) 及びそれに続くピラゾール環のエチル基等の酸化 (OH-PT-CA)、抱合 (Sul-OH-PT-CA) であり、ベンジルアミン部分の C-N 結合の開裂はわずかであると考えられる。(参照 4)

## (2) ラットにおける高用量経口投与時の血漿中濃度及び消化管内残存率

SD ラット (一群雄各 5 匹) に Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを単回強制経口 (160, 320 mg/kg 体重) 投与し、トルフェンピラドの高用量経口投与時の血漿中濃度及び消化管内残存率が測定された。

投与後 6 時間の血漿中濃度は 160mg/kg 体重投与群で 4.08~8.34 $\mu$ g/mL (7 時間後に死亡した 1 例 16.7 $\mu$ g/mL を除く)、320mg/kg 体重投与群で 5.18~6.97 $\mu$ g/mL (死亡動物を除く) であった。160mg/kg 体重投与群では 72 時間後には 10.3~18.0 $\mu$ g/mL となり、168 時間後でも顕著な低下は認められなかった。320mg/kg 体重投与群では 168 時間後で 11.8~19.1 $\mu$ g/mL となった。

168 時間後の胃内容物中の放射能残存率は 160mg/kg 体重投与群では処理放射能の 0.2~29.7% とばらつきが大きく、320mg/kg 体重投与群で 48.4~53.5% であった。小腸内容物中の放射能残存率は両投与群で処理放射能の 1.9~4.8% であった。

胃内からの放射能排泄が遅れるのは、本試験の胃内容物中残存放射能は生理食塩液による洗浄で容易に回収されたことから、消化管壁に固着されているのではなく、内容物中に混在していると考えられることと、小腸内容物中残存率が約 3% と少ないとから、トルフェンピラドの致死量投与により胃の運動が抑制されることによるものと考えられる。(参照 5)

### (3) ラットにおける動物体内運命試験（反復投与）

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド又はTo-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド（雄のみ）を1mg/kg体重/日の用量で、14日間反復強制経口投与し、トルフェンピラドのラットにおける反復投与代謝試験が実施された。

14日間反復投与後の全血中におけるT<sub>max</sub>、C<sub>max</sub>及びT<sub>1/2</sub>は雄でそれぞれ8時間、0.26～0.30μg/mL及び18.6～20.7時間であり、雌で12時間、0.51μg/mL及び45.8時間であった。

最終投与後168時間での糞中排泄率は92.1～94.9%、尿中排泄率は2.2～3.4%であった。主要な組織の残留放射能は表3のとおりであり、単回投与時と類似した分布傾向であった。（参照6）

表3 反復投与における主な組織の残留放射能（μg/g臓器）

投与条件		全血中最高濃度到達時付近*	投与168時間後
Py- <sup>14</sup> C-トルフェンピラド	雄	肝臓(7.77), 腎臓(2.98), 褐色脂肪(3.01), 大腸(1.87), 小腸(1.86), 脂肪(1.38), 骨髄(1.48), 心臓(0.95), 皮膚(0.75)	脂肪(0.89), 骨髄(0.76), 皮膚(0.57)
	雌	肝臓(11.3), 褐色脂肪(7.27), 骨髄(3.06), 腎臓(2.88), 大腸(2.16), 脂肪(1.66), 小腸(1.35), 心臓(0.91)	骨髄(1.20), 脂肪(0.86), 皮膚(0.62)
To- <sup>14</sup> C-トルフェンピラド	雄	肝臓(8.88), 腎臓(3.55), 褐色脂肪(3.02), 大腸(1.75), 小腸(1.39), 骨髄(1.28), 脂肪(1.40), 皮膚(0.80)	脂肪(0.95), 骨髄(0.63), 皮膚(0.55)

\*投与12時間後 (T<sub>max</sub>付近)

14日間反復投与後24時間以内における尿及び糞への排泄は、尿中ではトルフェンピラドは認められず、代謝物は全て1.0%以下であり、糞中ではトルフェンピラドが処理放射能の0.6～1.1%、代謝物としてPT-CA、Sul-OH-PT-CA及びOH-PT-CAがそれぞれ57.2～65.2%、12.5～16.4%及び11.1～13.8%認められ、その他はいずれも2%未満であった。

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを14日間反復投与後、血漿中にはトルフェンピラドは認められず、ほとんどがPT-CAであった。

尿中、糞中の代謝物のパターン及び分布割合については、反復経口投与と単回経口投与の間でほとんど差は認められなかった。（参照7）

### (4) ラットにおける胎盤透過性および乳汁中移行性試験

SDラット雌各4匹（妊娠）にPy-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを3mg/kg体重の用量で経口投与し、胎盤透過性及び乳汁移行試験（投与24時間後まで測定）が実施された。

母体血漿及び胎児中の放射能は投与後12時間で最高濃度に達し、母体血漿で2.90μg

/mL、胎児ホモジネートで 0.87 $\mu$ g /g であり、母体血漿中及び胎児ホモジネート中の代謝物の大部分は PT-CA であった。

乳汁中の放射能は投与後 12 時間で最高濃度に達し、母体血漿で 0.82 $\mu$ g /mL、乳汁で 23.2 $\mu$ g /mL であった。乳汁中の代謝物の大部分は、PT-CA のメチルエステル体 (PT-CA-Me) であった。

乳児血漿中の放射能は経時に上昇し、母動物に Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを投与後 12 時間以降は母体血漿濃度を上回った。乳児血漿中の代謝物の大部分は PT-CA であった。(参照 8~11)

#### (5) ラット肝臓 S-9 *in vitro* 系における代謝試験

*in vitro* 代謝系 (ラット肝 S-9 4mL) に Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド 0.1mg 又は 1mg、To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド 0.1mg 及び非標識体 1mg を加え、37°Cで 3 時間インキュベーションし、*in vitro* 代謝試験が実施された。

トルフェンピラドが処理放射能の 10.2~12.4% 検出され、主要代謝物として OH-PT-CA、PT-CA 及び CO-PT-CA がそれぞれ 24.5~32.4%、13.4~16.2% 及び 9.3~13.2% 検出された。その他、12 種類の代謝物が検出及び同定されたが処理放射能の 8% 以下であった。

トルフェンピラドの肝 *in vitro* 代謝系での主要代謝経路は、ピラゾール環のエチル基の  $\omega$ -1 位の酸化及びトリルオキシ環のメチル基の酸化であり、その他、ベンジルアミン部分の開裂、N-メチル部分の脱メチル化、ピラゾール環のエチル基のビニル基への変換であると考えられる。(参照 12)

## 2. 植物体体内運命試験

### (1) なすにおける植物体内運命試験

ナス (品種: 千両 2 号) を用いて、植物体内運命試験が実施された。本試験で用いられた試験設計概要は以下の通りである。

標識体	To- <sup>14</sup> C-トルフェンピラド		To 又は Py- <sup>14</sup> C-トルフェンピラド
試験区分	①	②	③
処理方法	水耕液処理	葉面に塗布処理	果実及び葉に塗布処理
処理時の植物体ステージ	播種 3 週間後	播種 10 週間後	播種 10 週間後
処理部位	根部からの吸収	葉中央部の主葉脈に対して直交させて帯状に塗布	果実及び着果部位直下の葉の裏表
検体採取日	処理後 1、2、4 日	塗布直後、塗布後 7、28 日	塗布後 3、7、14、28 日
投与濃度	1 $\mu$ g/mL	7.5mg/mL	750 $\mu$ g/mL

試験①では、植物体への放射能の移行は経時に増加したものの根から茎及び葉への移行は少なく、4日後に処理放射能の53.9%が根で、0.4%が葉で、0.2%が茎で認められた。

試験②で葉の中央に塗布された放射能は葉脈沿いに移行し、28日後では葉の先端方向の全面に分布したが、基部の方向への移行はほとんど認められなかった。

試験③では、処理葉及び果実とも表面に放射能が残留しており、28日後で処理放射能の87.1~91.8%が表面に分布していた。非処理の葉及び果実における分布は、0.1%未満であり、非処理部位への移行は認められなかった。

葉ではトルフェンピラドが処理放射能の89.5~93.6%(132~206 $\mu\text{g/g}$ )、主要代謝物としてPT-OH、OH-PT、PT-CA及びDM-PTが認められたが0.2~0.3%(0.3~0.7 $\mu\text{g/g}$ )程度であり、その他の同定された代謝物はいずれも0.2%(0.4 $\mu\text{g/g}$ )以下であった。

To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド特有の代謝物としてT-AMが認められたが、28日後で処理放射能の0.4%(0.4 $\mu\text{g/g}$ )であった。果実ではトルフェンピラドが処理放射能の92.2~93.6%(0.76~0.80 $\mu\text{g/g}$ )、主要代謝物としてPT-OH、OH-PT、PT-CA及びCO-PTが認められたが0.2~0.4%(0.002~0.003 $\mu\text{g/g}$ )程度であり、その他の同定された代謝物はいずれも0.3%(0.002 $\mu\text{g/g}$ )以下であった。To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド特有の代謝物としてT-AMが認められたが、28日後で処理放射能の0.1%(0.001 $\mu\text{g/g}$ )であった。

トルフェンピラドはなすにおいてはほとんど代謝されないが、代謝経路は、トリル環メチル基の水酸化(PT-OH)及びピラゾール環のエチル基の $\omega$ -1位の水酸化(OH-PT)及び酸化(CO-PT)、その他、ベンジルアミン部分のC-N結合の開裂(T-AM)及びピラゾール環1位の脱メチル化(DM-PT)と考えられる。(参照13)

## (2) キャベツにおける植物体内運命試験

To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド又はPy-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを含む処理溶液(0.5mg/mL)を結球肥大期のキャベツ(品種:秋徳)に1ポット当たり8mLで地上部全面に散布し、処理直後、7、14、28日後(Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドは28日後のみ)に採取し、トルフェンピラドのキャベツにおける植物体内運命試験が実施された。

To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドのキャベツにおける総残留放射能(TRR)は処理直後で処理放射能の80.0%であったが、28日後には58.9%に減少した。植物体中における分布は、処理直後では外葉に90.6%、結球に9.4%であり、28日後では外葉に99.7%、結球に0.3%であった。処理28日後の外葉ではトルフェンピラドが55.0%TRR(4.63 $\mu\text{g/g}$ )、主要代謝物としてOH-PT、OH-T-CA、OH-T-OH及びCA-T-AMがそれぞれ6.4%TRR(0.54 $\mu\text{g/g}$ )、3.9%TRR(0.33 $\mu\text{g/g}$ )、3.7%TRR(0.31 $\mu\text{g/g}$ )及び2.4%TRR(0.20 $\mu\text{g/g}$ )認められ、その他の同定された代謝物はいずれも1.9%TRR(0.16 $\mu\text{g/g}$ )以下であった。処理28日後の結球ではトルフェンピラド及び代謝物はいずれも0.1%TRR(0.03 $\mu\text{g/g}$ )未満であった。

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドのキャベツにおけるTRRは28日後で処理放射能の89.4%であった。植物体内における分布は外葉に97.2%、結球に2.8%であった。処理28日後の外葉ではトルフェンピラドが49.8%TRR(4.71 $\mu\text{g/g}$ )、主要代謝物としてOH-PT、OH-PT-OH、OH-PT-CA、PCAがそれぞれ7.89%TRR(0.75 $\mu\text{g/g}$ )、3.40%TRR(0.32 $\mu\text{g/g}$ )、2.93%TRR(0.27 $\mu\text{g/g}$ )及び2.11%TRR(0.20 $\mu\text{g/g}$ )認められ、その他の同定された代謝物はいずれも1.6%TRR(0.15 $\mu\text{g/g}$ )以下であった。処理28日後の結球ではトルフェンピラド

が 0.41%TRR(0.034μg/g)が認められ、代謝物はいずれも 0.2%TRR 未満であった。

トルフェンピラドはキャベツでは比較的容易に吸収され、多くの代謝物に分解されるが、結球への移行性は低く、代謝経路は、ピラゾール環のエチル基の  $\omega$ -1 位の水酸化(OH-PT)、ピラゾール環及びトリルオキシベンジル基の結合部分の酸化的分解及びアミド結合の加水分解(T-AM)、開裂の結果生じるトリルオキシベンジル部分のアルキル基の酸化(T-CA)であると考えられる。(参照 14~15)

### (3) ももにおける植物体内運命試験

To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド又はPy-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドを含む処理溶液(1.0mg/mL)を、もも(品種:紅清水)の果実が着果した一枝全面に4mL散布し、To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド処理では処理直後、14、28、56日後に葉、茎、果実を、Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラド処理では56日後に葉と茎を、53日後に果実を、それぞれ採取し、トルフェンピラドのももにおける植物体内運命試験が実施された。

To-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドのももにおけるTRRは処理直後で処理放射能の32.6%、56日後で32.8%であり経時的な変化は少なかった。植物体中における分布は、処理葉、茎及び果実でそれぞれ放射能残留量の83.1%、7.5%及び9.3%であり、果実に残留する放射能の95%以上は果皮に存在した。非処理葉への分布は0.1%未満であった。

処理56日後の葉ではトルフェンピラドが20.0%TRR(12.4μg/g)、主要代謝物としてPT-CA、CA-T-CA及びT-CAがそれぞれ9.1%TRR(5.6μg/g)(抱合体を含む。以下同様)、9.1%TRR(5.7μg/g)及び5.1%TRR(3.2μg/g)認められ、他の同定された代謝物はいずれも2.0%TRR(1.2μg/g)以下であった。56日後の果実には1.02μg/gの残留放射能が認められ、そのうちトルフェンピラドが0.79μg/g残留し、他の代謝物は0.02μg/g以下であった。処理56日後の果肉ではトルフェンピラドは認められず、代謝物としてCA-T-CAの抱合体が0.02μg/g認められた。

Py-<sup>14</sup>C-トルフェンピラドのももにおけるTRRは、処理56日後で処理放射能の23.5%であった。植物体中における分布は処理葉、茎及び果実でそれぞれ86.1%、7.3%及び6.6%であり、果実に残留する放射能のうち86.4%は果皮に存在していた。葉ではトルフェンピラドが28.1%TRR(21.1μg/g)、主要代謝物としてPT-CA、OH-PAM、PT-OH及びOH-PT-CAがそれぞれ14.6%TRR(11.0μg/g)(抱合体を含む。以下同様)、7.8%TRR(5.82μg/g)、3.8%TRR(2.83μg/g)及び2.8%TRR(2.06μg/g)認められ、他の同定された代謝物はいずれも1.87%TRR(1.40μg/g)以下であった。果皮ではトルフェンピラドが4.28%TRR(8.24μg/g)認められ、同定された代謝物はいずれも0.06%TRR(0.12μg/g)以下であった。果肉ではトルフェンピラドが0.02%TRR(0.003μg/g)とわずかしか認められず、代謝物としてOH-PAMが0.26%TRR(0.035μg/g)認められ、他の同定された代謝物はいずれも0.02%TRR(0.003μg/g)以下であった。

トルフェンピラドのももにおける主要代謝経路は、トリルオキシ環のメチル基の酸化(PT-CA)と、ピラゾール環とトリルオキシベンジル基の結合部分の酸化的分解及びアミド結合の加水分解(OH-PAM)、開裂して生成するトリルオキシベンジル部分のアルキル基の酸化(CA-T-CA)であると考えられる。(参照 16~17)