

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成16年4月1日~平成16年7月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静薬	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	ジスキネジー 横紋筋融解 振戦	1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	視覚障害  食欲不振 中毒性表皮壊死融解症 薬疹 薬物依存	1  1 1 1
解熱鎮痛薬	1錠中アセトアミノフェン33mg	血小板数減少 紫斑 白血球数減少	1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	スティーブンス・ジョンソン症候群  肝障害 腹痛 薬剤離脱症候群	1  1 1 1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg, トラネキサム酸140mg, 無水カフェイン80mg	意識消失	1
解熱鎮痛薬	2錠中イブプロフェン150mg	中毒性表皮壊死融解症 粘膜浮腫	1 1
解熱鎮痛薬	4錠中エテンザミド1g, アセトアミノフェン600mg, 無水カフェイン140mg, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg	中毒性表皮壊死融解症	1
解熱鎮痛薬	2錠中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド400mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	そう痒症  潮紅	1  1
解熱鎮痛薬	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	多形紅斑	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック 白血球破碎性血管炎	1 1
解熱鎮痛薬	4錠中アスピリン1.32g, 炭酸マグネシウム400mg, ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩200mg	間質性肺疾患	1
解熱鎮痛薬	3錠中アセトアミノフェン900mg	肺臓炎	1
解熱鎮痛薬	1錠中アスピリン0.5g	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛薬	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウイ8g	肝障害  間質性肺疾患	1  1
かぜ薬(内用)	3包中アセトアミノフェン675mg, クエン酸ペントキシベリン48mg, 塩酸イソチベンジル7mg, アスコルビン酸ナトリウム500mg, 無水カフェイン90mg, マオウ乾燥エキス400mg, カンゾウエキス末357.14mg, ショウキョウ末150mg	中毒性皮疹	1
かぜ薬(内用)	1包(1.5g)中アセトアミノフェン300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, 無水カフェイン25mg, カミツレエキス111.1mg, ニンジンエキス14.3mg, カンゾウエキス150mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	3包中トラネキサム酸750mg, アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム150mg, 無水カフェイン75mg	上腹部痛	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患  上腹部痛 薬剤離脱症候群 薬物依存 嘔吐	1  1 1 1
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	腎尿細管壊死	1
かぜ薬(内用)	3包(4.5g)中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, 無水カフェイン150mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 小青竜湯エキス1.335g(小青竜湯8.01g)	肝機能異常  薬疹	1  2
かぜ薬(内用)	3包中葛根湯乾燥エキス850mg, アセトアミノフェン715mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン60mg, ノスカピン48mg, グアヤコールスルホン酸カリウム200mg, 無水カフェイン150mg	肝障害	1
かぜ薬(内用)	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
かぜ薬(内用)	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	横紋筋融解  黄疸 肝障害 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少	1  1 1 1
かぜ薬(内用)	9錠中アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン15mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, ビタミンB2 12mg, ビタミンC500mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬(内用)	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	1
かぜ薬(内用)	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	薬疹	1
かぜ薬(内用)	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック  間質性腎炎 間質性肺疾患	1  1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
かぜ薬(内用)	3錠中イブプロフェン150mg, 塩酸プロムヘキシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	四肢痛	1
かぜ薬(内用)	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	薬疹	1
かぜ薬(内用)	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	肝障害 劇症肝炎 肺炎	1 1 1
かぜ薬(内用)	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, クエン酸ペントキシベリン16mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	9錠中d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, エテンザミド900mg, アセトアミノフェン360mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, カンゾウエキス末72mg(カンゾウ504mg), オウヒエキス80mg(オウヒ2g), 無水カフェイン150mg	肝機能異常	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	胸水 肺水腫	1 1
かぜ薬(内用)	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジソ酸クロベラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン720mg, カッコン湯乾燥エキス834mg(葛根湯5g), ノスカピン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 合成ケイ酸アルミニウム600mg	中毒性表皮壊死融解症	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アスピリン750mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, アスコルビン酸120mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン660mg, エテンザミド400mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン9mg, ヘスペリジン40mg	アナフィラキシーショック	1
かぜ薬(内用)	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 胆汁うっ滞	1 1 1
かぜ薬(内用)	60mL中アセトアミノフェン300mg, 塩酸ジフェンヒドラミン25mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 柴胡桂枝湯エキス300mg(柴胡桂枝湯3g)	血小板減少症	1
その他の精神神経用薬	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	ほてり 顔面浮腫 第6脳神経麻痺 頭痛	1 1 1 1
一般点眼薬	1mL中プラノプロフェン0.5mg	角膜びらん 虹彩炎	1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
抗菌性点眼薬	1mL中スルファメトキサゾール40mg, グリチルリチン酸ニカリウム1mg	視力低下 緑内障	1 1
鼻炎用内服薬	1包(1g)中ベラドリン20 0.67mg, グリチルリチン酸46.7mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン2mg, 塩酸プソイドエフェドリン60mg, 無水カフェイン25mg	アレルギー性胞隔炎	1
鼻炎用内服薬	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフリン3mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン34mg, ダツラエキス12mg	くも膜下出血 肝機能検査値異常 血中アマラーゼ 血中クレアチンホスホキナーゼ 呼吸不全 脳出血 不整脈	2 1 1 1 1 1 1
鼻炎用内服薬	2カプセル中塩酸フェニルプロパノールアミン90mg, 無水カフェイン100mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg	胃腸出血 脳梗塞 脳出血 播種性血管内凝固	1 1 1 1
鼻炎用内服薬	2カプセル中ヨウ化イソプロパミド5.092mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, 塩酸ジフェニルピラリン7.5mg, 無水カフェイン100mg	心筋症	1
鼻炎用内服薬	2カプセル中マレイン酸カルビノキサミン12mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン80mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), 無水カフェイン120mg	不安定狭心症 薬物依存	1 1
鼻炎用内服薬	3カプセル中塩酸ジフェニルピラリン12mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, グリチルリチン酸ニカリウム60mg, カフェイン75mg	浮動性めまい	1
鼻炎用内服薬	3カプセル中マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 塩酸フェニルプロパノールアミン75mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, カフェイン120mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
鼻炎用点鼻薬	100mL中塩酸テトラヒドロゾリン0.1g, マレイン酸クロルフェニラミン0.5g, 塩化ベンゼトニウム20mg	閃輝暗点	1
動脈硬化用薬	6カプセル中80%パンテチン水溶液375mg(パンテチン300mg), ソイステロール600mg, 酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール100mg	感覚減退 背部痛	1 1
鎮咳去痰薬	1包(1g)中塩酸メキシフェナミン50mg, ノスカピン20mg, カンゾウエキス末66mg(カンゾウ330mg), グアヤコールスルホン酸カリウム90mg, 無水カフェイン50mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg	嘔声	1
鎮咳去痰薬	3包(36錠)中リン酸ジヒドロコデイン30mg, ノスカピン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン9mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg	急性全身性発疹性膿疱症	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	9錠中有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg, タカチアスターゼN1135mg, ビオチン18 $\mu$ g	肝障害 多形紅斑	1 1
ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	1錠中ファモチジン10mg	肝障害 急性肝炎	1 1
瀉下薬	1錠中ピサコジル5mg	尿路結石	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	3包(3.6g)中ヒドロタルサイト1.5g, アルジオキサ90mg, ウルソデオキシコール酸30mg, ビオチアスターゼ1000 120mg, カンゾウ末150mg, ロートエキス3倍散90mg, ウイキョウ末90mg, ケイヒ末150mg, ショウキョウ末90mg	失神	1
制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	4錠中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 芍薬甘草湯エキス末140mg(シャクヤク・カンゾウ各280mg)	肝機能異常 肝障害	1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
その他の泌尿生殖器官及び肛門薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリヨウ・タクシャ・サンシュユ・ポタンビ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	尿閉	1
殺菌消毒薬	0.3m2中ヨードホルム1.1g	記憶障害 失見当識 不安	1 1 1
殺菌消毒薬	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75mg	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100mL中サリメント2.5g, l-メントール3g, マレイン酸クロルフェニラミン100mg, ニコチン酸ベンジル10mg, ノニル酸ワニルアミド12mg	胃炎	1
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100g(1,000cm2)中サリチル酸グリコール2g, 酢酸トコフェロール0.3g, トウガラシエキス0.02g(伸縮性)	接触性皮膚炎	1
鎮痛・鎮痒・収斂・消炎薬	100g中サリチル酸メチル6.29g, l-メントール5.71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1.24g(1枚6.5×4.2cm2)	皮膚炎 皮膚色素脱失	1 1
みずむし・たむし用薬	1mL中塩酸ブテナフィン10mg	接触性皮膚炎	1
みずむし・たむし用薬	100mL中トルナフタート2g, 塩酸ジフェンヒドラミン0.51g, グリチルレチン酸0.2g	角膜損傷	1
みずむし・たむし用薬	15mL中木樨皮チンキ6mL, 安息香酸1.8g, サリチル酸0.9g	蕁麻疹	1
みずむし・たむし用薬	1mg中塩酸ブテナフィン10mg	リンパ腺感染 皮膚感染	1 1
毛髪用薬	100mL中ミノキシジル1g	アレルギー性肉芽腫性血管炎 狭心症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 発疹	1 1 1 2
毛髪用薬	100mL中塩化カルプロニウム水和物1.09g(塩化カルプロニウム1g), カシュウチンキ3mL(カシュウ1g), チクセツニンジンチンキ3mL(チクセツニンジン1g), パントテニールエチルエーテル1g, l-メントール0.3g, ヒノキチオール0.05g	湿疹	1
ビタミンE主薬製剤	3錠中メコパラミン1500μg, 葉酸5mg, 酢酸d-α-トコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	眼の充血 血圧低下 呼吸困難 霧視	1 1 1 1
ビタミンB1主薬製剤	3錠中塩酸フルスルチアミン109.16mg, 塩酸ピリドキシン100mg, シアノコパラミン1.5mg, コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg, ガンマ-オリザノール10mg, パントテン酸カルシウム30mg	悪心 下痢 口渇 食欲不振 頭痛 発熱 嘔吐	1 1 1 1 1 1 1
カルシウム主薬製剤	3錠中ボレイ末2.014g	下痢	1
生薬主薬製剤	1g中ローヤルゼリー100mg	口内炎	1
ビタミン含有保健薬	1本(50mL)中クエン酸鉄アンモニウム18mg, リン酸リボフラビンナトリウム15mg, 塩酸ピリドキシン25mg, ヨクイニン流エキス1mL(ヨクイニン1g), ニコチン酸アミド40mg, アミノエチルスルホン酸500mg	胆汁うっ滞性肝炎	1
ビタミン含有保健薬	3瓶(150mL)中カンゾウエキス1.05g, オロチン酸コリン174mg, アミノエチルスルホン酸900mg, 塩酸ピリドキシン15mg, パンテノール60mg	高血圧 動悸 腹部不快感	1 1 1

薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
抗ヒスタミン薬 主薬製剤	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg, 塩酸ピロキシシン2.5mg, グリチルリチン酸カリウム20mg, グルコン酸カルシウム150mg	急性肝炎	1
漢方製剤	3包(4.5g)中葛根湯エキス末M3.9g(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)	咽頭不快感  体位性めまい 動悸 浮動性めまい 嘔吐	1  1 1 1 1
漢方製剤	12錠中釣藤散料エキス末1.8g(チョウトウコウ・チンピ・バクモンドウ・ハンゲ・ブクリヨウ各1.5g, ボウフウ・キクカ・ニンジン各1g, セッコウ2.5g, ショウキョウ・カンゾウ各0.5g)	肝機能異常	1
漢方製剤	3本(90mL)中葛根湯水製抽出液90mL(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
漢方製剤	3瓶(90mL)中葛根湯抽出液A 60mL(カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g)	中毒性表皮壊死融解症	1
漢方製剤	3包(5.4g)中清心蓮子飲乾燥エキス4.06g(レンニク・ニンジン各3.5g, バクモンドウ・シャゼンシ・オウゴン・ジコツピ各2.1g, ブクリヨウ・オウギ各2.8g, カンゾウ0.7g)	尿閉  尿路感染 両側水腎症	1  1 1
漢方製剤	1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg)	好酸球性肺炎	1
殺虫薬	フェントリン0.4%	甲状腺機能低下症	1
禁煙補助剤	1個中ニコチン2mg	呼吸困難	1