

平成18年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」  
《患者特性調査(医療療養病棟) 集計結果(全病院比較)》

平成18年度調査集計対象:平成18年度調査対象病院(全85病院)の療養病棟入院基本料2を算定している患者  
平成17年度調査集計対象:平成17年度慢性期入院医療実態調査の対象病院(全428病院)の下記入院料を算定している患者

- ・療養病棟入院基本料1, 2
- ・療養病棟入院基本料特別1, 2
- ・特殊疾患療養病棟入院料1, 2
- ・特殊疾患入院管理料

(注)本集計における「医療区分」は、特殊疾患療養病棟等の経過措置については考慮していない。

1 ADL区分・医療区分、認知機能障害加算の状況

ADL区分	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=1,743)	医療区分2 (n=2,756)	医療区分3 (n=1,098)	合計 (n=5,597)	医療区分1 (n=11,066)	医療区分2 (n=8,147)	医療区分3 (n=1,924)	合計 (n=21,137)
ADL区分3	10.0%	28.0%	15.7%	53.7%	14.0%	18.3%	6.3%	38.6%
ADL区分2	11.0%	13.0%	2.7%	26.7%	16.1%	10.2%	1.2%	27.5%
ADL区分1	2.5%(認)	2.1%(認)	1.3%	19.6%	5.3%(認)	2.6%(認)	1.3%	33.9%
	7.6%	6.2%			17.5%	7.2%		
全体	31.1%	49.2%	19.6%	100.0%	53.0%	38.3%	8.8%	100.0%
無回答(n)	(5)	(6)	(0)	(11)	(157)	(103)	(28)	(288)

※平成17年度調査の結果は、サンプルの特殊疾患療養病棟入院患者の構成割合を全国の割合に合わせた補正後のもの

2 医療区分採用項目

医療区分採用項目	平成18年度調査				平成17年度調査			
	医療区分1 (n=1,748)	医療区分2 (n=2,762)	医療区分3 (n=1,098)	合計 (n=5,608)	医療区分1 (n=11,223)	医療区分2 (n=8,250)	医療区分3 (n=1,952)	合計 (n=21,425)
スモン	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24時間の監視・管理	0.0%	0.0%	5.7%	1.1%	0.0%	0.0%	9.7%	0.9%
中心静脈栄養	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>33.2%</b>	<b>6.5%</b> ↑	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>17.2%</b>	<b>1.6%</b>
24時間持続点滴	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>47.9%</b>	<b>9.4%</b> ↑	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>29.5%</b>	<b>2.7%</b>
人工呼吸器(レスピレーター)	0.0%	0.0%	5.6%	1.1%	0.0%	0.0%	5.7%	0.5%
ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.0%	0.0%	1.0%	0.2%	0.0%	0.0%	2.8%	0.3%
気管切開・気管内挿管(×発熱)	0.0%	0.0%	14.1%	2.8%	0.0%	0.0%	13.9%	1.3%
酸素療法	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>47.4%</b>	<b>9.3%</b> ↑	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>51.4%</b>	<b>4.7%</b>
感染隔離室におけるケア	0.0%	0.0%	7.3%	1.4%	0.0%	0.0%	7.1%	0.6%
多発性硬化症	0.0%	0.5%	0.3%	0.3%	0.0%	0.7%	0.3%	0.3%
* パーキンソン病関連疾患	<b>0.0%</b>	<b>15.5%</b>	<b>6.9%</b>	<b>9.0%</b> ↑	<b>0.0%</b>	<b>14.2%</b>	<b>5.0%</b>	<b>5.9%</b>
その他神経難病	0.0%	3.8%	3.1%	2.5%	0.0%	3.2%	3.8%	1.6%
神経難病以外の難病	0.0%	3.1%	1.2%	1.8%	0.0%	3.2%	3.8%	1.6%
脊髄損傷(×四肢麻痺)	0.0%	1.5%	0.3%	0.8%	0.0%	0.7%	0.4%	0.3%
肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.0%	3.8%	10.2%	3.9%	0.0%	4.2%	12.7%	2.8%
悪性腫瘍(×疼痛コントロール)	0.0%	1.0%	1.7%	0.8%	0.0%	1.2%	1.0%	0.6%
肺炎	0.0%	9.1%	24.3%	9.2%	0.0%	11.7%	22.1%	6.5%
尿路感染症	<b>0.0%</b>	<b>10.4%</b>	<b>11.0%</b>	<b>7.3%</b> ↑	<b>0.0%</b>	<b>6.1%</b>	<b>5.9%</b>	<b>2.9%</b>
創感染	0.0%	1.3%	1.3%	0.9%	0.0%	1.1%	1.0%	0.5%
リハビリテーション	0.0%	4.7%	2.6%	2.8%	0.0%	7.4%	2.4%	3.1%
脱水	<b>0.0%</b>	<b>6.6%</b>	<b>12.1%</b>	<b>5.6%</b> ↓	<b>0.0%</b>	<b>2.5%</b>	<b>5.6%</b>	<b>1.5%</b>
体内出血	0.0%	1.0%	3.0%	1.1%	0.0%	0.9%	2.7%	0.6%
嘔吐	0.0%	2.7%	3.7%	2.1%	0.0%	2.3%	3.9%	1.2%
褥瘡	0.0%	5.1%	7.3%	4.0%	0.0%	14.2%	16.0%	6.9%
うつ血性潰瘍	0.0%	1.2%	1.2%	0.8%	0.0%	0.9%	1.2%	0.5%
せん妄の兆候	0.0%	2.2%	2.4%	1.5%	0.0%	3.1%	3.1%	1.5%
うつ状態	0.0%	13.1%	3.8%	7.2%	0.0%	11.9%	5.6%	5.1%
暴行	0.0%	3.0%	1.2%	1.7%	0.0%	2.5%	1.2%	1.1%
透析	0.0%	3.7%	0.4%	1.9%	0.0%	4.8%	1.0%	2.0%
* 経鼻胃管・胃瘻の経腸栄養	<b>0.0%</b>	<b>9.6%</b>	<b>23.2%</b>	<b>9.3%</b> ↓	<b>0.0%</b>	<b>7.6%</b>	<b>21.9%</b>	<b>4.9%</b>
[×発熱または嘔吐]								
喀痰吸引(1日8回以上)	<b>0.0%</b>	<b>27.8%</b>	<b>47.0%</b>	<b>22.9%</b> ↓	<b>0.0%</b>	<b>18.8%</b>	<b>42.5%</b>	<b>11.1%</b>
気管切開・気管内挿管	0.0%	10.2%	23.0%	9.6%	0.0%	10.7%	27.9%	6.7%
血糖検査(1日3回以上)	<b>0.0%</b>	<b>7.6%</b>	<b>6.4%</b>	<b>5.0%</b> ↓	<b>0.0%</b>	<b>3.2%</b>	<b>2.3%</b>	<b>1.4%</b>
皮膚の潰瘍のケア	0.0%	8.3%	10.1%	6.1%	0.0%	9.4%	10.6%	4.6%
創傷処置	<b>0.0%</b>	<b>14.7%</b>	<b>13.1%</b>	<b>9.8%</b> ↓	<b>0.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>11.0%</b>	<b>6.8%</b>
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(注) ↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

### 3 入退院の状況

調査病棟に入院する前の状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	181	10.4%	250	9.1%	71	6.5%	502	9.0% ↓
2. グループホーム	3	0.2%	8	0.3%	5	0.5%	16	0.3%
3. 有料老人ホーム	6	0.3%	14	0.5%	3	0.3%	23	0.4%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	4	0.2%	5	0.2%	1	0.1%	10	0.2%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	17	1.0%	66	2.4%	33	3.0%	116	2.1%
6. 介護老人保健施設	74	4.2%	120	4.3%	66	6.0%	260	4.6%
7. 他の医療機関	844	48.3%	1,271	46.0%	465	42.3%	2,580	46.0% ↑
(再掲)他の医療機関の一般病床	724	41.4%	1,126	40.8%	431	39.3%	2,281	40.7%
(再掲)他の医療機関の療養病床	105	6.0%	115	4.2%	30	2.7%	250	4.5%
(再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等)	15	0.9%	30	1.1%	4	0.4%	49	0.9%
* 8. 自院の他の病床	601	34.4%	984	35.6%	434	39.5%	2,019	36.0% ↓
(再掲)自院の一般病床(転棟)	400	22.9%	666	24.1%	279	25.4%	1,345	24.0%
(再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟)	201	11.5%	318	11.5%	155	14.1%	674	12.0%
9. わからない	7	0.4%	8	0.3%	6	0.5%	21	0.4%
無回答	11	0.6%	36	1.3%	14	1.3%	61	1.1%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

調査病棟に入院する前の状況	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	1,966	17.5%	1,105	13.4%	268	13.7%	3,339	15.6%
2. グループホーム	30	0.3%	22	0.3%	5	0.3%	57	0.3%
3. 有料老人ホーム	28	0.2%	23	0.3%	5	0.3%	56	0.3%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	28	0.2%	17	0.2%	3	0.2%	48	0.2%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	115	1.0%	122	1.5%	49	2.5%	286	1.3%
6. 介護老人保健施設	319	2.8%	278	3.4%	81	4.1%	678	3.2%
7. 他の医療機関	3,820	34.0%	2,802	34.0%	765	39.2%	7,387	34.5%
8. 自院の他の病床	4,528	40.3%	3,655	44.3%	733	37.6%	8,916	41.6%
9. わからない	389	3.5%	226	2.7%	43	2.2%	658	3.1%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
急性期状態が安定	1,120	64.1%	1,783	64.6%	667	60.7%	3,570	63.7%
疾病の急性増悪	115	6.6%	233	8.4%	203	18.5%	551	9.8%
継続的高度医療管理が必要	140	8.0%	497	18.0%	387	35.2%	1,024	18.3% ↑
* 継続的なリハビリが必要	828	47.4%	1,097	39.7%	314	28.6%	2,239	39.9%
他施設の空きがない	194	11.1%	235	8.5%	46	4.2%	475	8.5%
自宅の体制が整わない	388	22.2%	534	19.3%	96	8.7%	1,018	18.2% ↓
* 本人、家族等が希望	844	48.3%	1,376	49.8%	462	42.1%	2,682	47.8%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

調査病棟に入院した背景(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
急性期状態が安定	6,846	61.0%	5,588	67.7%	1,341	68.7%	13,775	64.3%
疾病の急性増悪	727	6.5%	634	7.7%	242	12.4%	1,603	7.5%
継続的高度医療管理が必要	654	5.8%	1,225	14.8%	530	27.2%	2,409	11.2%
継続的なリハビリが必要	5,014	44.7%	3,268	39.6%	479	24.5%	8,761	40.9%
他施設の空きがない	1,177	10.5%	778	9.4%	93	4.8%	2,048	9.6%
自宅の体制が整わない	2,659	23.7%	1,685	20.4%	266	13.6%	4,610	21.5%
本人、家族等が希望	5,192	46.3%	3,722	45.1%	851	43.6%	9,765	45.6%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

退院先の見通し (「退院(転院・転倒)の見込みは無い」と回答された患者を除く)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=962)		医療区分2 (n=1,146)		医療区分3 (n=339)		合計 (n=2,447)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	244	25.4%	232	20.2%	32	9.4%	508	20.8% ↓
2. グループホーム	26	2.7%	20	1.7%	3	0.9%	49	2.0%
3. 有料老人ホーム	12	1.2%	25	2.2%	6	1.8%	43	1.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	18	1.9%	19	1.7%	5	1.5%	42	1.7%
* 5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	220	22.9%	220	19.2%	29	8.6%	469	19.2%
6. 介護老人保健施設	270	28.1%	334	29.1%	71	20.9%	675	27.6% ↑
7. 他の医療機関	101	10.5%	219	19.1%	90	26.5%	410	16.8%
(再掲)他の医療機関の一般病床	25	2.6%	32	2.8%	24	7.1%	81	3.3%
(再掲)他の医療機関の療養病床	68	7.1%	177	15.4%	61	18.0%	306	12.5%
(再掲)他の医療機関のその他の病床	8	0.8%	10	0.9%	5	1.5%	23	0.9%
8. 自院の他の病床	37	3.8%	48	4.2%	35	10.3%	120	4.9%
(再掲)自院の障害者施設等入院基本料算定 病棟	1	0.1%	2	0.2%	1	0.3%	4	0.2%
(再掲)自院の一般病床(10.の病棟を除く)	6	0.6%	19	1.7%	20	5.9%	45	1.8%
(再掲)自院のその他の病床	30	3.1%	27	2.4%	14	4.1%	71	2.9%
9. その他	30	3.1%	25	2.2%	66	19.5%	121	4.9%
無回答	4	0.4%	4	0.3%	2	0.6%	10	0.4%
全体	962	100.0%	1,146	100.0%	339	100.0%	2,447	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

退院先の見通し	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=4,989)		医療区分2 (n=3,276)		医療区分3 (n=553)		合計 (n=8,818)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	2,096	42.0%	1,127	34.4%	162	29.3%	3,385	38.4%
2. グループホーム	66	1.3%	36	1.1%	2	0.4%	104	1.2%
3. 有料老人ホーム	65	1.3%	31	0.9%	2	0.4%	98	1.1%
4. ケアハウス	53	1.1%	25	0.8%	1	0.2%	79	0.9%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	968	19.4%	645	19.7%	127	23.0%	1,740	19.7%
6. 介護老人保健施設	973	19.5%	628	19.2%	57	10.3%	1,658	18.8%
7. 他の医療機関	567	11.4%	607	18.5%	130	23.5%	1,304	14.8%
8. 自院の他の病棟	201	4.0%	177	5.4%	72	13.0%	450	5.1%
全体	4,989	100.0%	3,276	100.0%	553	100.0%	8,818	100.0%
(わからない)	6,234		4,974		1,399		12,607	

(注)上記集計表は、平成18年度と比較するため、「9. わからない」の回答者を除く患者数での、各選択肢の回答割合である。

<平成18年度のみ> 退院の見通し	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
90日以内に退院できる見通し	267	15.3%	253	9.2%	36	3.3%	556	9.9%
90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる	656	37.5%	821	29.7%	163	14.8%	1,640	29.2%
悪化して転院・転棟・死亡する見通し	39	2.2%	72	2.6%	140	12.8%	251	4.5%
退院(転院・転棟)の見通しはない	783	44.8%	1,613	58.4%	757	68.9%	3,153	56.2%
無回答	3	0.2%	3	0.1%	2	0.2%	8	0.1%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「90日以内に退院できる見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=267)		医療区分2 (n=253)		医療区分3 (n=36)		合計 (n=556)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	126	47.2%	119	47.0%	8	22.2%	253	45.5%
2. グループホーム	9	3.4%	2	0.8%	1	2.8%	12	2.2%
3. 有料老人ホーム	2	0.7%	8	3.2%	0	0.0%	10	1.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	1	0.4%	5	2.0%	1	2.8%	7	1.3%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	26	9.7%	45	17.8%	11	30.6%	82	14.7%
6. 介護老人保健施設	73	27.3%	41	16.2%	11	30.6%	125	22.5%
7. 他の医療機関の一般病床	10	3.7%	5	2.0%	0	0.0%	15	2.7%
8. 他の医療機関の療養病床	11	4.1%	18	7.1%	3	8.3%	32	5.8%
9. 他の医療機関のその他の病床	2	0.7%	5	2.0%	1	2.8%	8	1.4%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
12. 自院のその他の病床	3	1.1%	1	0.4%	0	0.0%	4	0.7%
13. その他	3	1.1%	2	0.8%	0	0.0%	5	0.9%
無回答	1	0.4%	1	0.4%	0	0.0%	2	0.4%
全体	267	100.0%	253	100.0%	36	100.0%	556	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=656)		医療区分2 (n=821)		医療区分3 (n=163)		合計 (n=1,640)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	116	17.7%	113	13.8%	20	12.3%	249	15.2%
2. グループホーム	17	2.6%	18	2.2%	1	0.6%	36	2.2%
3. 有料老人ホーム	9	1.4%	16	1.9%	1	0.6%	26	1.6%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	17	2.6%	13	1.6%	3	1.8%	33	2.0%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	192	29.3%	174	21.2%	18	11.0%	384	23.4%
6. 介護老人保健施設	196	29.9%	291	35.4%	58	35.6%	545	33.2%
7. 他の医療機関の一般病床	8	1.2%	11	1.3%	7	4.3%	26	1.6%
8. 他の医療機関の療養病床	57	8.7%	154	18.8%	50	30.7%	261	15.9%
9. 他の医療機関のその他の病床	6	0.9%	5	0.6%	1	0.6%	12	0.7%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	0	0.0%	2	0.2%	2	1.2%	4	0.2%
12. 自院のその他の病床	20	3.0%	15	1.8%	2	1.2%	37	2.3%
13. その他	16	2.4%	7	0.9%	0	0.0%	23	1.4%
無回答	2	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	3	0.2%
全体	656	100.0%	821	100.0%	163	100.0%	1,640	100.0%

＜平成18年度のみ＞ 退院先の見通し(「悪化して転院・転棟・死亡する見通し」の回答者)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=39)		医療区分2 (n=72)		医療区分3 (n=140)		合計 (n=251)	
1. 自宅(家族等との同居も含む)	2	5.1%	0	0.0%	4	2.9%	6	2.4%
2. グループホーム	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	0.4%
3. 有料老人ホーム	1	2.6%	1	1.4%	5	3.6%	7	2.8%
4. ケアハウス(軽費老人ホーム含む)	0	0.0%	1	1.4%	1	0.7%	2	0.8%
5. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	2	5.1%	1	1.4%	0	0.0%	3	1.2%
6. 介護老人保健施設	1	2.6%	2	2.8%	2	1.4%	5	2.0%
7. 他の医療機関の一般病床	7	17.9%	16	22.2%	17	12.1%	40	15.9%
8. 他の医療機関の療養病床	0	0.0%	5	6.9%	8	5.7%	13	5.2%
9. 他の医療機関のその他の病床	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	3	1.2%
10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟	1	2.6%	0	0.0%	1	0.7%	2	0.8%
11. 自院の一般病床(10.の病棟を除く)	6	15.4%	17	23.6%	18	12.9%	41	16.3%
12. 自院のその他の病床	7	17.9%	11	15.3%	12	8.6%	30	12.0%
13. その他	11	28.2%	16	22.2%	66	47.1%	93	37.1%
無回答	1	2.6%	2	2.8%	2	1.4%	5	2.0%
全体	39	100.0%	72	100.0%	140	100.0%	251	100.0%

#### 4 その他の患者状態像（医療区分採用項目以外）

疾患(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
糖尿病	224	12.8%	442	16.0%	140	12.8%	806	14.4%
不整脈	98	5.6%	150	5.4%	71	6.5%	319	5.7%
うっ血性心不全	<b>58</b>	<b>3.3%</b>	<b>93</b>	<b>3.4%</b>	<b>79</b>	<b>7.2%</b>	<b>230</b>	<b>4.1%</b> ↓
高血圧症	399	22.8%	533	19.3%	179	16.3%	1,111	19.8%
虚血性心疾患	90	5.1%	147	5.3%	48	4.4%	285	5.1%
大腿骨頸部骨折	135	7.7%	164	5.9%	51	4.6%	350	6.2%
脊椎圧迫骨折	49	2.8%	83	3.0%	22	2.0%	154	2.7%
その他の骨折	79	4.5%	88	3.2%	32	2.9%	199	3.5%
関節リウマチ	36	2.1%	70	2.5%	11	1.0%	117	2.1%
アルツハイマー病	76	4.3%	105	3.8%	48	4.4%	229	4.1%
* 失語症	<b>139</b>	<b>8.0%</b>	<b>243</b>	<b>8.8%</b>	<b>96</b>	<b>8.7%</b>	<b>478</b>	<b>8.5%</b> ↑
脳性麻痺	12	0.7%	23	0.8%	7	0.6%	42	0.7%
* 脳梗塞	696	39.8%	980	35.5%	420	38.3%	2,096	37.4%
脳出血	326	18.6%	464	16.8%	181	16.5%	971	17.3%
アルツハイマー病以外の認知症	<b>304</b>	<b>17.4%</b>	<b>529</b>	<b>19.2%</b>	<b>175</b>	<b>15.9%</b>	<b>1,008</b>	<b>18.0%</b> ↑
片側不全麻痺	305	17.4%	345	12.5%	101	9.2%	751	13.4%
* 四肢麻痺	<b>82</b>	<b>4.7%</b>	<b>287</b>	<b>10.4%</b>	<b>122</b>	<b>11.1%</b>	<b>491</b>	<b>8.8%</b> ↑
脊髄損傷	32	1.8%	84	3.0%	6	0.5%	122	2.2%
喘息	38	2.2%	65	2.4%	55	5.0%	158	2.8%
腎不全	82	4.7%	170	6.2%	49	4.5%	301	5.4%
がん(悪性腫瘍)	91	5.2%	150	5.4%	111	10.1%	352	6.3%
腸閉塞(イレウス) <新規>	9	0.5%	28	1.0%	31	2.8%	68	1.2%
肝不全<新規>	9	0.5%	26	0.9%	16	1.5%	51	0.9%
急性心不全<新規>	5	0.3%	5	0.2%	13	1.2%	23	0.4%
慢性心不全<新規>	145	8.3%	200	7.2%	148	13.5%	493	8.8%
仮性球麻痺<新規>	251	14.4%	423	15.3%	205	18.7%	879	15.7%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

疾患(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
糖尿病	1,529	13.6%	1,228	14.9%	218	11.2%	2,975	13.9%
不整脈	517	4.6%	419	5.1%	114	5.8%	1,050	4.9%
うっ血性心不全	970	8.6%	685	8.3%	256	13.1%	1,911	8.9%
高血圧症	2,777	24.7%	1,696	20.6%	321	16.4%	4,794	22.4%
虚血性心疾患	839	7.5%	525	6.4%	127	6.5%	1,491	7.0%
大腿骨頸部骨折	913	8.1%	534	6.5%	71	3.6%	1,518	7.1%
脊椎圧迫骨折	421	3.8%	255	3.1%	24	1.2%	700	3.3%
その他の骨折	526	4.7%	295	3.6%	47	2.4%	868	4.1%
関節リウマチ	305	2.7%	183	2.2%	51	2.6%	539	2.5%
アルツハイマー病	395	3.5%	316	3.8%	50	2.6%	761	3.6%
失語症	477	4.3%	441	5.3%	111	5.7%	1,029	4.8%
脳性麻痺	123	1.1%	73	0.9%	17	0.9%	213	1.0%
脳梗塞	4,353	38.8%	2,849	34.5%	695	35.6%	7,897	36.9%
脳出血	1,619	14.4%	1,177	14.3%	312	16.0%	3,108	14.5%
アルツハイマー病以外の認知症	1,717	15.3%	1,207	14.6%	245	12.6%	3,169	14.8%
片側不全麻痺	1,643	14.6%	888	10.8%	176	9.0%	2,707	12.6%
四肢麻痺	368	3.3%	643	7.8%	221	11.3%	1,232	5.8%
脊髄損傷	111	1.0%	154	1.9%	24	1.2%	289	1.3%
喘息	244	2.2%	219	2.7%	102	5.2%	565	2.6%
腎不全	320	2.9%	581	7.0%	78	4.0%	979	4.6%
がん(悪性腫瘍)	515	4.6%	498	6.0%	163	8.4%	1,176	5.5%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

感染症(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	19	1.1%	83	3.0%	92	8.4%	194	3.5%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
上気道感染	17	1.0%	71	2.6%	36	3.3%	124	2.2%
敗血症	1	0.1%	4	0.1%	10	0.9%	15	0.3%
多剤耐性結核	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
上記以外の結核	2	0.1%	4	0.1%	1	0.1%	7	0.1%
ウイルス性肝炎	14	0.8%	15	0.5%	5	0.5%	34	0.6%
皮膚の感染症	11	0.6%	39	1.4%	19	1.7%	69	1.2%
急性胆嚢炎 <新規>	7	0.4%	14	0.5%	11	1.0%	32	0.6%
急性腹膜炎 <新規>	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
急性膵炎 <新規>	0	0.0%	2	0.1%	2	0.2%	4	0.1%
全 体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

感染症(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	108	1.0%	246	3.0%	180	9.2%	534	2.5%
後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	4	0.0%	1	0.0%	1	0.1%	6	0.0%
上気道感染	72	0.6%	172	2.1%	71	3.6%	315	1.5%
敗血症	9	0.1%	22	0.3%	13	0.7%	44	0.2%
多剤耐性結核	1	0.0%	9	0.1%	3	0.2%	13	0.1%
上記以外の結核	18	0.2%	20	0.2%	16	0.8%	54	0.3%
ウイルス性肝炎	102	0.9%	84	1.0%	20	1.0%	206	1.0%
皮膚の感染症	83	0.7%	161	2.0%	43	2.2%	287	1.3%
全 体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

問題状況(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
妄想	54	3.1%	185	6.7%	32	2.9%	271	4.8%
発熱	<b>49</b>	<b>2.8%</b>	<b>364</b>	<b>13.2%</b>	<b>473</b>	<b>43.1%</b>	<b>886</b>	<b>15.8%</b>
幻覚	33	1.9%	103	3.7%	23	2.1%	159	2.8%
嘔吐	0	0.0%	75	2.7%	41	3.7%	116	2.1%
胸水 <新規>	2	0.1%	25	0.9%	66	6.0%	93	1.7%
腹水 <新規>	0	0.0%	9	0.3%	22	2.0%	31	0.6%
高カルシウム血症(10.5mg/dl以上) <新規>	0	0.0%	4	0.1%	2	0.2%	6	0.1%
悪疫質(癌を伴う) <新規>	3	0.2%	9	0.3%	22	2.0%	34	0.6%
消化管の通過障害(癌を伴う) <新規>	3	0.2%	7	0.3%	17	1.5%	27	0.5%
全 体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

問題状況(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
妄想	236	2.1%	292	3.5%	60	3.1%	588	2.7%
発熱	199	1.8%	886	10.7%	733	37.6%	1,818	8.5%
幻覚	118	1.1%	209	2.5%	34	1.7%	361	1.7%
嘔吐	0	0.0%	190	2.3%	76	3.9%	266	1.2%
全 体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

処置・治療(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
抗がん剤療法	6	0.3%	7	0.3%	4	0.4%	17	0.3%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	<b>201</b>	<b>11.5%</b>	<b>705</b>	<b>25.5%</b>	<b>300</b>	<b>27.3%</b>	<b>1,206</b>	<b>21.5%</b> ↑
放射線治療	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.0%
吸引(1日1~7回)	<b>89</b>	<b>5.1%</b>	<b>209</b>	<b>7.6%</b>	<b>170</b>	<b>15.5%</b>	<b>468</b>	<b>8.3%</b> ↓
輸血	1	0.1%	4	0.1%	12	1.1%	17	0.3%
緩和ケア	5	0.3%	19	0.7%	16	1.5%	40	0.7%
疼痛コントロール	42	2.4%	105	3.8%	39	3.6%	186	3.3%
膀胱留置カテーテル	<b>93</b>	<b>5.3%</b>	<b>327</b>	<b>11.8%</b>	<b>360</b>	<b>32.8%</b>	<b>780</b>	<b>13.9%</b> ↑
血糖チェック(週1回~1日2回)	57	3.3%	104	3.8%	92	8.4%	253	4.5%
インスリン皮下注射	46	2.6%	171	6.2%	61	5.6%	278	5.0%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

処置・治療(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
抗がん剤療法	21	0.2%	16	0.2%	5	0.3%	42	0.2%
胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	955	8.5%	1,666	20.2%	487	24.9%	3,108	14.5%
放射線治療	3	0.0%	4	0.0%	5	0.3%	12	0.1%
吸引(1日1~7回)	916	8.2%	1,188	14.4%	399	20.4%	2,503	11.7%
輸血	8	0.1%	7	0.1%	6	0.3%	21	0.1%
緩和ケア	122	1.1%	148	1.8%	52	2.7%	322	1.5%
疼痛コントロール	452	4.0%	419	5.1%	89	4.6%	960	4.5%
膀胱留置カテーテル	484	4.3%	924	11.2%	596	30.5%	2,004	9.4%
血糖チェック(週1回~1日2回)	590	5.3%	420	5.1%	106	5.4%	1,116	5.2%
インスリン皮下注射	330	2.9%	398	4.8%	52	2.7%	780	3.6%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

状態の安定性(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
個室における管理が必要	7	0.4%	42	1.5%	94	8.6%	143	2.5%
*急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	<b>39</b>	<b>2.2%</b>	<b>225</b>	<b>8.1%</b>	<b>238</b>	<b>21.7%</b>	<b>502</b>	<b>9.0%</b> ↑
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	11	0.6%	18	0.7%	74	6.7%	103	1.8%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

状態の安定性(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
絶対安静	55	0.5%	157	1.9%	256	13.1%	468	2.2%
個室における管理が必要	62	0.6%	142	1.7%	199	10.2%	403	1.9%
急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	210	1.9%	500	6.1%	393	20.1%	1,103	5.1%
末期の疾患であり余命が6ヶ月以下である	35	0.3%	91	1.1%	126	6.5%	252	1.2%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

栄養摂取の方法(複数回答)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	364	33.2%	364	6.5% ↑
末梢静脈栄養	21	1.2%	101	3.7%	206	18.8%	328	5.8%
経管栄養	346	19.8%	1,235	44.7%	486	44.3%	2,067	36.9% ↑
いずれか1つ以上該当	364	20.8%	1,310	47.4%	908	82.7%	2,582	46.0% ↑
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

栄養摂取の方法(複数回答)	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
中心静脈栄養	0	0.0%	0	0.0%	335	17.2%	335	1.6%
末梢静脈栄養	120	1.1%	228	2.8%	371	19.0%	719	3.4%
経管栄養	1,816	16.2%	3,128	37.9%	907	46.5%	5,851	27.3%
いずれか1つ以上該当	1,925	17.2%	3,312	40.1%	1,409	72.2%	6,646	31.0%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,232)		医療区分2 (n=1,824)		医療区分3 (n=604)		合計 (n=3,660)	
14日以下	0	0.0%	37	2.0%	17	2.8%	54	1.5%
15日から30日以下	0	0.0%	93	5.1%	11	1.8%	104	2.8%
31日から90日以下	146	11.9%	170	9.3%	71	11.8%	387	10.6%
91日から180日以下	168	13.6%	202	11.1%	77	12.7%	447	12.2%
*181日以上	910	73.9%	1,314	72.0%	420	69.5%	2,644	72.2%
無回答	8	0.6%	8	0.4%	8	1.3%	24	0.7%
全体	1,232	100.0%	1,824	100.0%	604	100.0%	3,660	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

リハビリテーションを要す状態 発症してからの日数	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=7,844)		医療区分2 (n=5,500)		医療区分3 (n=929)		合計 (n=14,273)	
14日以下	0	0.0%	269	4.9%	19	2.0%	288	2.0%
15日から30日以下	0	0.0%	342	6.2%	27	2.9%	369	2.6%
31日から90日以下	986	12.6%	415	7.5%	87	9.4%	1,488	10.4%
91日から180日以下	1,094	13.9%	578	10.5%	93	10.0%	1,765	12.4%
181日以上	5,554	70.8%	3,774	68.6%	683	73.5%	10,011	70.1%
無回答	210	2.7%	122	2.2%	20	2.2%	352	2.5%
全体	7,844	100.0%	5,500	100.0%	929	100.0%	14,273	100.0%

日常の意思決定を行うための認知能力	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=1,748)		医療区分2 (n=2,762)		医療区分3 (n=1,098)		合計 (n=5,608)	
自立	365	20.9%	356	12.9%	71	6.5%	792	14.1% ↓
限定的な自立	277	15.8%	295	10.7%	70	6.4%	642	11.4%
軽度の障害	190	10.9%	244	8.8%	48	4.4%	482	8.6%
中程度の障害	334	19.1%	468	16.9%	140	12.8%	942	16.8%
重度の障害	377	21.6%	739	26.8%	373	34.0%	1,489	26.6% ↑
*意識障害者	192	11.0%	634	23.0%	388	35.3%	1,214	21.6% ↑
無回答	13	0.7%	26	0.9%	8	0.7%	47	0.8%
全体	1,748	100.0%	2,762	100.0%	1,098	100.0%	5,608	100.0%

(注)平成18年度集計表の、↑は平成17年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの  
左端に\*のついた項目は、共通病院での比較と傾向の違いが見られたもの(矢印の向き又は矢印の有無について)

日常の意思決定を行うための認知能力	平成17年度調査							
	医療区分1 (n=11,223)		医療区分2 (n=8,250)		医療区分3 (n=1,952)		合計 (n=21,425)	
自立	2,955	26.3%	1,398	16.9%	255	13.1%	4,608	21.5%
限定的な自立	1,773	15.8%	951	11.5%	139	7.1%	2,863	13.4%
軽度の障害	1,121	10.0%	695	8.4%	96	4.9%	1,912	8.9%
中程度の障害	1,940	17.3%	1,310	15.9%	205	10.5%	3,455	16.1%
重度の障害	2,194	19.5%	1,980	24.0%	424	21.7%	4,598	21.5%
意識障害者	1,158	10.3%	1,872	22.7%	822	42.1%	3,852	18.0%
無回答	82	0.7%	44	0.5%	11	0.6%	137	0.6%
全体	11,223	100.0%	8,250	100.0%	1,952	100.0%	21,425	100.0%



## 5 詳細条件該当状況（平成18年度調査のみ）

### VI.1 疾患 e. 慢性心不全

NYHA Ⅲ度/Ⅳ度	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=145)		医療区分2 (n=200)		医療区分3 (n=148)		合計 (n=493)	
1. Ⅲ度未満	91	62.8%	99	49.5%	65	43.9%	255	51.7%
2. Ⅲ度	25	17.2%	43	21.5%	28	18.9%	96	19.5%
3. Ⅳ度	7	4.8%	32	16.0%	44	29.7%	83	16.8%
(再掲) Ⅲ度+Ⅳ度	32	22.1%	75	37.5%	72	48.6%	179	36.3%
無回答	22	15.2%	26	13.0%	11	7.4%	59	12.0%
全体	145	100.0%	200	100.0%	148	100.0%	493	100.0%

### VI.1 疾患 a b. 肺気腫／慢性閉塞性肺疾患（COPD）

Hugh Jones Ⅳ度/Ⅴ度の状態	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=104)		医療区分3 (n=112)		合計 (n=216)	
1. Ⅳ度未満	0	-	40	38.5%	15	13.4%	55	25.5%
2. Ⅳ度	0	-	14	13.5%	22	19.6%	36	16.7%
3. Ⅴ度	0	-	45	43.3%	64	57.1%	109	50.5%
(再掲) Ⅳ度+Ⅴ度	0	-	59	56.7%	86	76.8%	145	67.1%
無回答	0	-	5	4.8%	11	9.8%	16	7.4%
全体	0	-	104	100.0%	112	100.0%	216	100.0%

### VI.1 疾患 a e. 腎不全

高クレアチニン血症2.0mg/dℓ以上	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=82)		医療区分2 (n=170)		医療区分3 (n=49)		合計 (n=301)	
0. なし	51	62.2%	57	33.5%	20	40.8%	128	42.5%
1. あり	28	34.1%	108	63.5%	25	51.0%	161	53.5%
無回答	3	3.7%	5	2.9%	4	8.2%	12	4.0%
全体	82	100.0%	170	100.0%	49	100.0%	301	100.0%

VI.1 疾患 a f. 肝不全

(1)ビリルビン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. <2	4	44.4%	13	50.0%	8	50.0%	25	49.0%
2. 2~3	2	22.2%	2	7.7%	5	31.3%	9	17.6%
3. >3	1	11.1%	3	11.5%	0	0.0%	4	7.8%
無回答	2	22.2%	8	30.8%	3	18.8%	13	25.5%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

(2)アルブミン	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. >3.5	0	0.0%	6	23.1%	1	6.3%	7	13.7%
2. 2.8~3.5	4	44.4%	8	30.8%	2	12.5%	14	27.5%
3. <2.8	3	33.3%	7	26.9%	10	62.5%	20	39.2%
無回答	2	22.2%	5	19.2%	3	18.8%	10	19.6%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

(3)PT(%)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. >80	0	0.0%	3	11.5%	4	25.0%	7	13.7%
2. 60~80	4	44.4%	4	15.4%	3	18.8%	11	21.6%
3. <60	1	11.1%	2	7.7%	4	25.0%	7	13.7%
無回答	4	44.4%	17	65.4%	5	31.3%	26	51.0%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

(4)腹水	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. なし	5	55.6%	17	65.4%	4	25.0%	26	51.0%
2. 軽度	3	33.3%	2	7.7%	2	12.5%	7	13.7%
3. 中等度	0	0.0%	3	11.5%	8	50.0%	11	21.6%
無回答	1	11.1%	4	15.4%	2	12.5%	7	13.7%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

(5)脳症	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. なし	6	66.7%	17	65.4%	11	68.8%	34	66.7%
2. Grade1-2	1	11.1%	2	7.7%	2	12.5%	5	9.8%
3. Grade3-4	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	2	3.9%
無回答	2	22.2%	5	19.2%	3	18.8%	10	19.6%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

Child-Pugh分類 (上記5項目の合計スコア)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=9)		医療区分2 (n=26)		医療区分3 (n=16)		合計 (n=51)	
1. Class A (5-6点)	0	0.0%	3	11.5%	1	6.3%	4	7.8%
2. Class B (7-9点)	4	44.4%	5	19.2%	4	25.0%	13	25.5%
3. Class C (10-15点)	1	11.1%	1	3.8%	6	37.5%	8	15.7%
無回答	4	44.4%	17	65.4%	5	31.3%	26	51.0%
全体	9	100.0%	26	100.0%	16	100.0%	51	100.0%

VI.2 感染症 h. 尿路感染症

(1)細菌尿/白血球尿(>10/HPF)の該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=288)		医療区分3 (n=121)		合計 (n=409)	
1. 両方該当なし	0	-	15	5.2%	10	8.3%	25	6.1%
2. 細菌尿のみ該当	0	-	22	7.6%	5	4.1%	27	6.6%
3. 白血球尿(>10/HPF)のみ該当	0	-	19	6.6%	4	3.3%	23	5.6%
4. 両方該当	0	-	222	77.1%	93	76.9%	315	77.0%
無回答	0	-	10	3.5%	9	7.4%	19	4.6%
全体	0	-	288	100.0%	121	100.0%	409	100.0%

VII.1 問題状況 a. 脱水

(1)舌の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=182)		医療区分3 (n=133)		合計 (n=315)	
0. なし	0	-	66	36.3%	42	31.6%	108	34.3%
1. あり	0	-	115	63.2%	90	67.7%	205	65.1%
無回答	0	-	1	0.5%	1	0.8%	2	0.6%
全体	0	-	182	100.0%	133	100.0%	315	100.0%

(2)皮膚の乾燥 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=182)		医療区分3 (n=133)		合計 (n=315)	
0. なし	0	-	29	15.9%	25	18.8%	54	17.1%
1. あり	0	-	151	83.0%	107	80.5%	258	81.9%
無回答	0	-	2	1.1%	1	0.8%	3	1.0%
全体	0	-	182	100.0%	133	100.0%	315	100.0%

(3)尿量減少 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=182)		医療区分3 (n=133)		合計 (n=315)	
0. なし	0	-	104	57.1%	64	48.1%	168	53.3%
1. あり	0	-	76	41.8%	63	47.4%	139	44.1%
無回答	0	-	2	1.1%	6	4.5%	8	2.5%
全体	0	-	182	100.0%	133	100.0%	315	100.0%

(4)BUN/Cre比の上昇 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=182)		医療区分3 (n=133)		合計 (n=315)	
0. なし	0	-	135	74.2%	70	52.6%	205	65.1%
1. あり	0	-	45	24.7%	57	42.9%	102	32.4%
無回答	0	-	2	1.1%	6	4.5%	8	2.5%
全体	0	-	182	100.0%	133	100.0%	315	100.0%

項目該当状況 (発症中に一度でも認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=182)		医療区分3 (n=133)		合計 (n=315)	
1. 0項目該当	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2. 1項目該当	0	-	48	26.4%	22	16.5%	70	22.2%
3. 2項目該当	0	-	78	42.9%	53	39.8%	131	41.6%
4. 3項目該当	0	-	34	18.7%	28	21.1%	62	19.7%
5. 4項目該当	0	-	20	11.0%	23	17.3%	43	13.7%
無回答	0	-	2	1.1%	7	5.3%	9	2.9%
全体	0	-	182	100.0%	133	100.0%	315	100.0%

VII.1 問題状況 f. 嘔吐

1日の間に繰り返しの嘔吐	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=75)		医療区分3 (n=41)		合計 (n=116)	
0. なし	0	-	56	74.7%	24	58.5%	80	69.0%
1. あり	0	-	18	24.0%	16	39.0%	34	29.3%
無回答	0	-	1	1.3%	1	2.4%	2	1.7%
全体	0	-	75	100.0%	41	100.0%	116	100.0%

VII.2 栄養摂取の方法 a. 中心静脈栄養

消化管異常、悪性腫瘍等により消化管からの栄養摂取が困難である	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=364)		合計 (n=364)	
0. なし	0	-	0	-	93	25.5%	93	25.5%
1. あり	0	-	0	-	219	60.2%	219	60.2%
無回答	0	-	0	-	52	14.3%	52	14.3%
全体	0	-	0	-	364	100.0%	364	100.0%

X.2 注射・点滴 e. 24時間の持続点滴

経口摂取が困難/体液の不均衡(電解質異常等)の状況 (点滴を行った際に認められたかどうか)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=526)		合計 (n=526)	
1. 両方該当なし	0	-	0	-	22	4.2%	22	4.2%
2. 経口摂取が困難のみ該当	0	-	0	-	204	38.8%	204	38.8%
3. 体液の不均衡(電解質異常等)のみ該当	0	-	0	-	15	2.9%	15	2.9%
4. 両方該当	0	-	0	-	233	44.3%	233	44.3%
無回答	0	-	0	-	52	9.9%	52	9.9%
全体	0	-	0	-	526	100.0%	526	100.0%

X II.1 処置・治療 e. 酸素療法

(1) 安静時でSaO <sub>2</sub> 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=521)		合計 (n=521)	
0. なし	0	-	0	-	151	29.0%	151	29.0%
1. あり	0	-	0	-	357	68.5%	357	68.5%
無回答	0	-	0	-	13	2.5%	13	2.5%
全 体	0	-	0	-	521	100.0%	521	100.0%

(2) 睡眠時でSaO <sub>2</sub> 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=521)		合計 (n=521)	
0. なし	0	-	0	-	203	39.0%	203	39.0%
1. あり	0	-	0	-	278	53.4%	278	53.4%
無回答	0	-	0	-	40	7.7%	40	7.7%
全 体	0	-	0	-	521	100.0%	521	100.0%

(3) 運動負荷時でSaO <sub>2</sub> 90%以下に該当	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=521)		合計 (n=521)	
0. なし	0	-	0	-	186	35.7%	186	35.7%
1. あり	0	-	0	-	277	53.2%	277	53.2%
無回答	0	-	0	-	58	11.1%	58	11.1%
全 体	0	-	0	-	521	100.0%	521	100.0%

3項目該当状況	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=0)		医療区分2 (n=0)		医療区分3 (n=521)		合計 (n=521)	
0. いずれも該当なし	0	-	0	-	90	17.3%	90	17.3%
1. 1つ以上に該当	0	-	0	-	371	71.2%	371	71.2%
無回答	0	-	0	-	60	11.5%	60	11.5%
全 体	0	-	0	-	521	100.0%	521	100.0%

X II.1 処置・治療 g. 吸引

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=89)		医療区分2 (n=984)		医療区分3 (n=692)		合計 (n=1,765)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	12	13.5%	18	1.8%	7	1.0%	37	2.1%
2回	10	11.2%	21	2.1%	10	1.4%	41	2.3%
3回	23	25.8%	50	5.1%	30	4.3%	103	5.8%
4回	8	9.0%	27	2.7%	31	4.5%	66	3.7%
5回	16	18.0%	39	4.0%	34	4.9%	89	5.0%
6回	13	14.6%	35	3.6%	37	5.3%	85	4.8%
7回	7	7.9%	19	1.9%	21	3.0%	47	2.7%
8回	0	0.0%	147	14.9%	83	12.0%	230	13.0%
9回	0	0.0%	50	5.1%	16	2.3%	66	3.7%
10回	0	0.0%	176	17.9%	97	14.0%	273	15.5%
11回	0	0.0%	24	2.4%	11	1.6%	35	2.0%
12回	0	0.0%	108	11.0%	78	11.3%	186	10.5%
13回	0	0.0%	37	3.8%	27	3.9%	64	3.6%
14回	0	0.0%	34	3.5%	29	4.2%	63	3.6%
15回	0	0.0%	61	6.2%	45	6.5%	106	6.0%
16回	0	0.0%	22	2.2%	14	2.0%	36	2.0%
17回	0	0.0%	9	0.9%	6	0.9%	15	0.8%
18回	0	0.0%	16	1.6%	8	1.2%	24	1.4%
19回	0	0.0%	3	0.3%	1	0.1%	4	0.2%
20回	0	0.0%	26	2.6%	36	5.2%	62	3.5%
21回以上	0	0.0%	54	5.5%	65	9.4%	119	6.7%
無回答	0	0.0%	8	0.8%	6	0.9%	14	0.8%
全体	89	100.0%	984	100.0%	692	100.0%	1,765	100.0%
平均値	3.8		10.8		11.7		10.8	
標準偏差	1.8		5.9		7.4		6.6	
最大値	7		56		97		97	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=89)		医療区分2 (n=984)		医療区分3 (n=692)		合計 (n=1,765)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	12	13.5%	18	1.8%	7	1.0%	37	2.1%
2回	22	24.7%	39	4.0%	17	2.5%	78	4.4%
3回	45	50.6%	89	9.0%	47	6.8%	181	10.3%
4回	53	59.6%	116	11.8%	78	11.3%	247	14.0%
5回	69	77.5%	155	15.8%	112	16.2%	336	19.0%
6回	82	92.1%	190	19.3%	149	21.5%	421	23.9%
7回	89	100.0%	209	21.2%	170	24.6%	468	26.5%
8回	89	100.0%	356	36.2%	253	36.6%	698	39.5%
9回	89	100.0%	406	41.3%	269	38.9%	764	43.3%
10回	89	100.0%	582	59.1%	366	52.9%	1,037	58.8%
11回	89	100.0%	606	61.6%	377	54.5%	1,072	60.7%
12回	89	100.0%	714	72.6%	455	65.8%	1,258	71.3%
13回	89	100.0%	751	76.3%	482	69.7%	1,322	74.9%
14回	89	100.0%	785	79.8%	511	73.8%	1,385	78.5%
15回	89	100.0%	846	86.0%	556	80.3%	1,491	84.5%
16回	89	100.0%	868	88.2%	570	82.4%	1,527	86.5%
17回	89	100.0%	877	89.1%	576	83.2%	1,542	87.4%
18回	89	100.0%	893	90.8%	584	84.4%	1,566	88.7%
19回	89	100.0%	896	91.1%	585	84.5%	1,570	89.0%
20回	89	100.0%	922	93.7%	621	89.7%	1,632	92.5%
21回以上	89	100.0%	976	99.2%	686	99.1%	1,751	99.2%
無回答	89	100.0%	984	100.0%	692	100.0%	1,765	100.0%
全体	89	100.0%	984	100.0%	692	100.0%	1,765	100.0%

X II.1 処置・治療 o. 血糖チェック

(1) 過去7日間のうち1日の最大回数 (回数毎患者数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=60)		医療区分2 (n=319)		医療区分3 (n=163)		合計 (n=542)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	41	68.3%	67	21.0%	53	32.5%	161	29.7%
2回	16	26.7%	37	11.6%	39	23.9%	92	17.0%
3回	0	0.0%	152	47.6%	43	26.4%	195	36.0%
4回	0	0.0%	33	10.3%	16	9.8%	49	9.0%
5回	0	0.0%	7	2.2%	4	2.5%	11	2.0%
6回以上	0	0.0%	17	5.3%	7	4.3%	24	4.4%
無回答	3	5.0%	6	1.9%	1	0.6%	10	1.8%
全体	60	100.0%	319	100.0%	163	100.0%	542	100.0%
平均値	1.3		2.9		2.6		2.7	
標準偏差	0.5		2.3		2.6		2.3	
最大値	2		30		23		30	
最小値	1		1		1		1	

(2) 過去7日間のうち1日の最大回数 (累積度数)	平成18年度調査							
	医療区分1 (n=60)		医療区分2 (n=319)		医療区分3 (n=163)		合計 (n=542)	
0回	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1回	41	68.3%	67	21.0%	53	32.5%	161	29.7%
2回	57	95.0%	104	32.6%	92	56.4%	253	46.7%
3回	57	95.0%	256	80.3%	135	82.8%	448	82.7%
4回	57	95.0%	289	90.6%	151	92.6%	497	91.7%
5回	57	95.0%	296	92.8%	155	95.1%	508	93.7%
6回以上	57	95.0%	313	98.1%	162	99.4%	532	98.2%
無回答	60	100.0%	319	100.0%	163	100.0%	542	100.0%
全体	60	100.0%	319	100.0%	163	100.0%	542	100.0%