

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| VI1w 疾患 スモン | 0 | | 0 | | 1 | 15.1 ↓ ↓ | 1 | 15.1 |
| VI1x 疾患 その他の神経難病 | 0 | | 67 | 42.0 | 29 | 62.2 | 96 | 48.1 |
| VI1y 疾患 神経難病以外の難病 | 0 | | 55 | 20.4 ↓ | 11 | 37.3 ↓ | 66 | 23.2 |
| VI1z 疾患 脊髄損傷 | 21 | 22.4 | 52 | 36.3 | 6 | 96.4 | 79 | 37.2 |
| VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 0 | | 21 | 36.9 | 3 | 83.1 | 24 | 42.7 |
| VI1aa 疾患 喘息 | 27 | 24.1 | 41 | 44.2 | 38 | 59.1 | 106 | 44.5 |
| VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0 | | 72 | 45.4 | 91 | 56.3 | 163 | 51.5 |
| VI1ab1 疾患 肺気腫 Hogh Jones IV+V | 0 | | 71 | 45.7 | 83 | 58.1 | 154 | 52.4 |
| VI1ab2 疾患 肺気腫 Hogh Jones V | 0 | | 71 | 45.7 | 83 | 58.1 | 154 | 52.4 |
| VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍) | 55 | 25.7 | 101 | 41.3 | 72 | 68.8 | 228 | 46.2 |
| VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要) | 0 | | 22 | 35.1 | 14 | 89.3 | 36 | 56.2 |
| VI1ad 疾患 腸閉塞 | 6 | 23.0 | 15 | 37.9 | 24 | 58.9 | 45 | 47.1 |
| VI1ae 疾患 腎不全 | 58 | 28.4 | 140 | 47.8 | 35 | 85.6 | 233 | 48.6 |
| VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上 | 55 | 28.9 | 135 | 47.8 | 31 | 87.3 | 221 | 48.7 |
| VI1af 疾患 肝不全 | 6 | 29.4 | 14 | 40.1 | 6 | 68.5 | 26 | 44.2 |
| VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上) | 7 | 23.2 | 17 | 34.8 | 5 | 37.3 ↓ | 29 | 32.4 |
| VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上) | 4 | 33.7 | 4 | 30.2 ↓ | 2 | 55.6 | 10 | 36.6 |
| VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上) | 0 | | 1 | 32.7 | 2 | 55.6 | 3 | 47.9 |
| VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA) | 8 | 25.4 | 53 | 52.8 | 74 | 76.2 | 135 | 64.0 |
| VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む) | 0 | | 0 | | 1 | 4.1 ↓ ↓ ↓ | 1 | 4.1 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 0 | | 160 | 59.0 | 188 | 71.2 | 348 | 65.6 |
| VI2d 感染症 上気道感染 | 10 | 49.1 ↑ ↑ | 43 | 49.5 | 22 | 67.1 | 75 | 54.6 |
| VI2e 感染症 敗血症 | 1 | 56.1 ↑ ↑ | 1 | 61.1 | 7 | 73.5 | 9 | 70.2 |
| VI2f 感染症 多剤耐性結核 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| VI2g 感染症 上記以外の結核 | 1 | 21.6 | 3 | 34.1 | 0 | | 4 | 31.0 |
| VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間) | 0 | | 182 | 39.7 | 77 | 65.6 | 259 | 47.4 |
| VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり | 0 | | 41 | 52.9 | 39 | 71.4 | 80 | 61.9 |
| VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり | 0 | | 177 | 39.7 | 71 | 65.6 | 248 | 47.1 |
| VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり | 0 | | 175 | 39.5 | 70 | 66.1 | 245 | 47.1 |
| VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当 | 0 | | 40 | 52.4 | 35 | 70.3 | 75 | 60.7 |
| VI2i 感染症 ウィルス性肝炎 | 10 | 28.6 | 12 | 39.8 | 1 | 15.6 ↓ ↓ | 23 | 33.9 |
| VI2j 感染症 急性胆嚢炎 | 6 | 44.8 ↑ ↑ | 9 | 60.5 | 10 | 57.7 | 25 | 55.6 |
| VI2k 感染症 急性腹膜炎 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| VI2l 感染症 急性膀胱炎 | 0 | | 2 | 46.6 | 1 | 55.0 | 3 | 49.4 |
| VI2m 感染症 創感染 | 0 | | 21 | 36.7 | 9 | 91.1 | 30 | 53.1 |
| VI2n 感染症 皮膚の感染症 | 6 | 59.5 ↑ ↑ | 33 | 52.9 | 15 | 107.9 | 54 | 68.9 |
| VII1a 問題状況 脱水 | 0 | | 191 | 44.6 | 108 | 59.8 | 299 | 50.1 |
| VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり | 2 | 50.1 ↑ ↑ | 198 | 45.8 | 114 | 61.6 | 314 | 51.6 |
| VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり | 3 | 40.9 | 196 | 45.8 | 114 | 61.2 | 313 | 51.4 |
| VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり | 3 | 40.9 | 198 | 46.0 | 110 | 62.1 | 311 | 51.6 |
| VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり | 3 | 40.9 | 188 | 45.2 | 109 | 61.8 | 300 | 51.2 |
| VII1b 問題状況 妄想 | 30 | 24.9 | 111 | 42.8 | 19 | 87.4 | 160 | 44.8 |
| VII1c 問題状況 発熱 | 30 | 37.3 | 226 | 49.9 | 321 | 63.9 | 577 | 57.1 |
| VII1d 問題状況 幻覚 | 18 | 19.7 | 67 | 46.9 | 18 | 69.1 | 103 | 46.1 |
| VII1e 問題状況 体内出血 | 0 | | 16 | 52.9 | 26 | 82.2 | 42 | 71.0 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 0 | | 53 | 43.5 | 24 | 68.9 | 77 | 51.4 |
| VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐) | 3 | 30.7 | 74 | 40.5 | 34 | 64.5 | 111 | 47.6 |
| VII1g 問題状況 胸水 | 2 | 66.1 ↑ ↑ | 20 | 70.3 ↑ | 35 | 49.4 | 57 | 57.3 |
| VII1h 問題状況 腹水 | 0 | | 6 | 79.4 ↑ | 16 | 71.3 | 22 | 73.5 |
| VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう | 0 | | 3 | 36.1 | 1 | 129.1 | 4 | 59.3 |
| VII1j 問題状況 悪疫質 | 1 | 33.6 | 5 | 32.4 | 14 | 87.8 | 20 | 71.3 |
| VII1k 問題状況 消化管の通過障害 | 1 | 13.6 | 4 | 26.8 ↓ | 11 | 88.9 | 16 | 68.7 |
| VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上) | 230 | 29.2 | 393 | 42.0 | 103 | 64.6 | 726 | 41.2 |
| VII2a 痛み 頻度(毎日) | 116 | 33.9 | 214 | 43.9 | 67 | 70.5 | 397 | 45.5 |
| VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上) | 86 | 28.9 | 181 | 42.3 | 54 | 67.5 | 321 | 43.0 |
| VII2b 痛み 程度(激しい痛み) | 13 | 33.3 | 22 | 59.2 | 10 | 82.2 | 45 | 56.8 |
| VII3a 状態の安定性 個室管理 | 5 | 59.1 ↑ ↑ | 29 | 66.9 ↑ | 69 | 83.1 | 103 | 77.4 |
| VII3b 状態の安定性 急性症状発生 | 32 | 21.8 | 158 | 40.8 | 159 | 77.1 | 349 | 55.6 |
| VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下 | 8 | 34.7 | 9 | 69.7 ↑ | 38 | 82.0 | 55 | 73.1 |
| VIII1 体重の変化 | 88 | 26.6 | 185 | 42.0 | 120 | 63.5 | 393 | 45.1 |
| VIII2a 中心静脈栄養 | 0 | | 0 | | 251 | 64.1 | 251 | 64.1 |
| VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難) | 2 | 4.3 | 10 | 51.2 | 217 | 63.5 | 229 | 62.4 |
| VIII2b 末梢静脈栄養 | 16 | 50.7 ↑ ↑ | 63 | 60.2 | 128 | 75.8 | 207 | 69.1 |
| VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 172 | 41.2 | 794 | 51.9 | 317 | 60.7 | 1,283 | 52.6 |

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 61 | 49.8 ↑↑ | 377 | 50.7 | 170 | 59.8 | 608 | 53.2 |
| VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0 | | 144 | 50.2 | 168 | 60.3 | 312 | 55.7 |
| VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0 | | 32 | 45.8 | 15 | 80.0 | 47 | 56.7 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上 | 199 | 42.0 | 860 | 51.9 | 599 | 65.6 | 1,658 | 55.7 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上 | 194 | 41.7 | 838 | 51.8 | 573 | 65.2 | 1,605 | 55.4 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上 | 191 | 41.6 | 825 | 51.7 | 560 | 64.9 | 1,576 | 55.2 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上 | 180 | 42.6 | 810 | 51.8 | 533 | 64.4 | 1,523 | 55.1 |
| VII2 摂取水分量 1cc以上 | 203 | 42.8 | 883 | 51.5 | 610 | 65.1 | 1,696 | 55.3 |
| VII2 摂取水分量 501cc以上 | 195 | 42.7 | 850 | 51.5 | 580 | 65.5 | 1,625 | 55.5 |
| VII2 摂取水分量 1001cc以上 | 170 | 42.4 | 747 | 52.7 | 522 | 67.0 | 1,439 | 56.7 |
| VII2 摂取水分量 1501cc以上 | 76 | 47.0 ↑↑ | 372 | 53.8 | 277 | 63.6 | 725 | 56.8 |
| VII2 摂取水分量 2001cc以上 | 8 | 47.9 ↑↑ | 45 | 67.9 ↑ | 39 | 65.0 | 92 | 64.9 |
| VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上) | 8 | 48.8 ↑↑ | 41 | 56.2 | 335 | 68.3 | 384 | 66.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所 | 16 | 37.4 | 64 | 44.2 | 28 | 66.6 | 108 | 49.0 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所 | 0 | | 4 | 37.1 | 3 | 57.4 | 7 | 45.8 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上 | 0 | | 9 | 50.7 | 3 | 31.6 ↓↓ | 12 | 45.9 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所 | 4 | 38.2 | 117 | 47.2 | 62 | 64.9 | 183 | 53.0 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所 | 0 | | 24 | 54.2 | 12 | 68.0 | 36 | 58.8 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上 | 0 | | 11 | 81.1 ↑ | 7 | 59.1 | 18 | 72.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所 | 0 | | 89 | 50.3 | 56 | 70.4 | 145 | 58.0 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所 | 0 | | 14 | 70.9 ↑ | 5 | 91.0 | 19 | 76.2 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上 | 0 | | 7 | 77.6 ↑ | 8 | 91.1 | 15 | 84.8 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所 | 0 | | 26 | 52.3 | 20 | 72.2 | 46 | 61.0 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所 | 0 | | 4 | 92.6 ↑ | 4 | 78.5 | 8 | 85.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上 | 0 | | 2 | 118.6 ↑ | 2 | 59.1 | 4 | 88.8 |
| IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上 | 0 | | 97 | 57.1 | 58 | 71.6 | 155 | 62.5 |
| IX2a 褥瘡 1度 | 8 | 39.1 | 46 | 53.6 | 31 | 63.9 | 85 | 56.0 |
| IX2a 褥瘡 2度 | 0 | | 91 | 43.1 | 56 | 64.6 | 147 | 51.3 |
| IX2a 褥瘡 3度 | 0 | | 80 | 55.9 | 59 | 72.9 | 139 | 63.1 |
| IX2a 褥瘡 4度 | 0 | | 26 | 63.7 ↑ | 19 | 66.9 | 45 | 65.1 |
| IX2b うっ血性潰瘍 1度 | 0 | | 11 | 46.0 | 4 | 38.6 ↓ | 15 | 44.0 |
| IX2b うっ血性潰瘍 2度 | 0 | | 8 | 43.1 | 5 | 63.8 | 13 | 51.0 |
| IX2b うっ血性潰瘍 3度 | 0 | | 9 | 74.4 ↑ | 4 | 83.8 | 13 | 77.3 |
| IX2b うっ血性潰瘍 4度 | 0 | | 8 | 61.4 ↑ | 2 | 94.1 | 10 | 68.0 |
| IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血 | 19 | 43.0 | 89 | 53.9 | 38 | 69.0 | 146 | 56.4 |
| IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷 | 2 | 11.3 | 5 | 78.7 ↑ | 3 | 112.7 | 10 | 75.4 |
| IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創 | 3 | 27.7 | 52 | 57.5 | 24 | 77.1 | 79 | 62.3 |
| IX3d 皮膚他問題 発疹 | 85 | 26.7 | 225 | 46.8 | 99 | 62.1 | 409 | 46.3 |
| IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感 | 46 | 33.5 | 192 | 48.3 | 95 | 69.2 | 333 | 52.2 |
| IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外) | 4 | 32.2 | 31 | 47.7 | 7 | 69.1 | 42 | 49.8 |
| IX3g 皮膚他問題 手術創 | 3 | 33.7 | 26 | 41.4 | 11 | 87.1 | 40 | 53.4 |
| IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用 | 410 | 35.2 | 1,103 | 47.8 | 604 | 63.2 | 2,117 | 49.7 |
| IX4b 皮膚ケア 体位変換 | 457 | 35.3 | 1,198 | 47.8 | 637 | 63.3 | 2,292 | 49.6 |
| IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給 | 31 | 31.5 | 212 | 56.3 | 67 | 69.6 | 310 | 56.7 |
| IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア | 0 | | 153 | 50.6 | 81 | 63.3 | 234 | 55.0 |
| IX4e 皮膚ケア 手術創のケア | 0 | | 37 | 40.9 | 12 | 91.8 | 49 | 53.4 |
| IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら) | 0 | | 130 | 55.1 | 46 | 82.3 | 176 | 62.2 |
| IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外) | 148 | 29.4 | 432 | 48.4 | 194 | 66.4 | 774 | 49.2 |
| IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置 | 66 | 23.9 | 160 | 45.1 | 78 | 67.1 | 304 | 46.2 |
| IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外) | 99 | 39.3 | 396 | 51.2 | 165 | 63.5 | 660 | 52.5 |
| IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等 | 9 | 36.0 | 39 | 63.8 ↑ | 13 | 88.0 | 61 | 64.8 |
| IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等) | 0 | | 25 | 43.5 | 14 | 55.8 | 39 | 47.9 |
| IX5c 足の問題とケア 開放創 | 0 | | 13 | 59.7 | 3 | 50.5 | 16 | 58.0 |
| IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてい | 87 | 25.0 | 226 | 51.2 | 99 | 64.7 | 412 | 48.9 |
| IX5e 足の問題とケア 保護的なケア | 20 | 29.0 | 55 | 49.1 | 23 | 38.0 ↓ | 98 | 42.4 |
| IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置 | 0 | | 122 | 55.1 | 31 | 74.9 | 153 | 59.2 |
| X1 注射・点滴日数 1日 | 23 | 33.8 | 48 | 36.0 | 18 | 53.4 | 89 | 39.0 |
| X1 注射・点滴日数 2日 | 7 | 25.6 | 26 | 43.7 | 22 | 63.8 | 55 | 49.4 |
| X1 注射・点滴日数 3日 | 13 | 41.8 | 39 | 35.5 | 18 | 76.6 | 70 | 47.2 |
| X1 注射・点滴日数 4日 | 2 | 16.7 | 13 | 47.5 | 12 | 66.6 | 27 | 53.7 |
| X1 注射・点滴日数 5日 | 3 | 26.1 | 14 | 39.6 | 12 | 87.3 | 29 | 57.9 |
| X1 注射・点滴日数 6日 | 3 | 44.9 ↑↑ | 8 | 39.3 | 10 | 42.1 ↓ | 21 | 41.5 |
| X1 注射・点滴日数 7日以上 | 21 | 49.8 ↑↑ | 66 | 50.3 | 326 | 68.4 | 413 | 64.6 |
| X2a 注射・点滴 補液 | 51 | 37.3 | 138 | 46.2 | 279 | 71.8 | 468 | 60.5 |

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| X 2b 注射・点滴 抗生物質注射 | 24 | 52.9 ↑↑ | 98 | 52.7 | 230 | 77.6 | 352 | 68.9 |
| X 2c 注射・点滴 強心剤注射 | 0 | . | 0 | . | 12 | 30.5 ↓↓ | 12 | 30.5 |
| X 2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴 | 0 | . | 2 | 10.0 ↓ | 12 | 59.9 | 14 | 52.8 |
| X 2e 注射・点滴 24時間持続点滴 | 0 | . | 0 | . | 321 | 70.4 | 321 | 70.4 |
| X 2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難) | 11 | 38.5 | 36 | 65.3 ↑ | 343 | 68.7 | 390 | 67.6 |
| X 2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡) | 7 | 41.8 | 30 | 70.3 ↑ | 306 | 70.4 | 343 | 69.8 |
| X I 1リハ 維持的及び積極的なりハが必要な状態 | 728 | 30.8 | 1,177 | 41.1 | 397 | 55.3 | 2,302 | 40.3 |
| X I 1リハ 積極的なりハが必要な状態 | 185 | 27.2 | 244 | 38.6 | 45 | 47.3 | 474 | 35.0 |
| X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内 | 0 | . | 25 | 36.1 | 11 | 48.9 | 36 | 40.0 |
| X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日 | 0 | . | 69 | 44.0 | 9 | 46.2 | 78 | 44.3 |
| X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日 | 106 | 30.8 | 124 | 48.1 | 51 | 51.1 | 281 | 42.1 |
| X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日 | 126 | 26.5 | 144 | 41.2 | 49 | 58.5 | 319 | 38.1 |
| X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上 | 491 | 31.9 | 806 | 39.9 | 270 | 54.8 | 1,567 | 39.9 |
| X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が1日 | 302 | 25.9 | 534 | 42.2 | 149 | 54.1 | 985 | 39.0 |
| X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が2日 | 293 | 26.0 | 506 | 41.5 | 139 | 53.9 | 938 | 38.5 |
| X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が3日 | 282 | 26.2 | 492 | 41.4 | 128 | 53.6 | 902 | 38.4 |
| X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が4日 | 272 | 24.8 | 467 | 41.3 | 115 | 55.5 | 854 | 38.0 |
| X I 3a-eリハ 特別な看護の対応が5日以上 | 264 | 24.8 | 453 | 41.5 | 110 | 56.4 | 827 | 38.2 |
| X II 1a処置・治療 抗がん剤療法 | 4 | 16.8 | 4 | 41.4 | 4 | 88.7 | 12 | 49.0 |
| X II 1b処置・治療 透析 | 0 | . | 92 | 46.2 | 4 | 128.6 | 96 | 49.6 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 106 | 33.7 | 460 | 51.6 | 215 | 59.1 | 781 | 51.2 |
| X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腔腔洗浄 | 0 | . | 0 | . | 9 | 39.4 ↓ | 9 | 39.4 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 0 | . | 0 | . | 350 | 63.6 | 350 | 63.6 |
| X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下) | 8 | 30.4 | 26 | 62.4 ↑ | 366 | 65.2 | 400 | 64.3 |
| X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下) | 7 | 34.7 | 25 | 63.6 ↑ | 341 | 67.3 | 373 | 66.5 |
| X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下) | 7 | 34.7 | 26 | 65.0 ↑ | 327 | 68.3 | 360 | 67.4 |
| X II 1f処置・治療 放射線治療 | 0 | . | 0 | . | 1 | 21.1 ↓↓ | 1 | 21.1 |
| X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 0 | . | 503 | 56.6 | 337 | 65.9 | 840 | 60.3 |
| X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 34 | 45.4 ↑↑ | 132 | 48.7 | 114 | 65.0 | 280 | 54.9 |
| X II g1処置・治療 吸引(1日1回) | 8 | 34.6 | 7 | 64.6 ↑ | 5 | 49.0 | 20 | 48.7 |
| X II g2処置・治療 吸引(1日2回) | 5 | 51.7 ↑↑ | 15 | 31.8 ↓ | 7 | 93.3 | 27 | 51.4 |
| X II g3処置・治療 吸引(1日3回) | 9 | 60.6 ↑↑ | 30 | 53.0 | 24 | 71.7 | 63 | 61.2 |
| X II g4処置・治療 吸引(1日4回) | 2 | 6.1 | 16 | 46.3 | 16 | 73.9 | 34 | 56.9 |
| X II g5処置・治療 吸引(1日5回) | 1 | 6.1 | 27 | 54.2 | 19 | 59.5 | 47 | 55.3 |
| X II g6処置・治療 吸引(1日6回) | 4 | 58.3 ↑↑ | 25 | 35.9 | 28 | 60.5 | 57 | 49.5 |
| X II g7処置・治療 吸引(1日7回) | 5 | 42.7 | 12 | 67.6 ↑ | 15 | 52.1 | 32 | 56.5 |
| X II g8処置・治療 吸引(1日8回) | 0 | . | 95 | 53.7 | 55 | 48.0 | 150 | 51.6 |
| X II g9処置・治療 吸引(1日9回) | 0 | . | 26 | 52.4 | 12 | 57.4 | 38 | 54.0 |
| X II g10処置・治療 吸引(1日10回) | 0 | . | 117 | 50.1 | 66 | 55.3 | 183 | 52.0 |
| X II g11処置・治療 吸引(1日11回) | 0 | . | 17 | 69.6 ↑ | 6 | 103.4 | 23 | 78.4 |
| X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上) | 0 | . | 248 | 60.3 | 198 | 73.8 | 446 | 66.3 |
| X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 0 | . | 195 | 55.8 | 180 | 59.1 | 375 | 57.4 |
| X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア | 0 | . | 0 | . | 115 | 63.1 | 115 | 63.1 |
| X II 1i処置・治療 輸血 | 1 | 54.1 ↑↑ | 2 | 41.6 | 10 | 74.6 | 13 | 67.9 |
| X II 1j処置・治療 レスピレーター | 0 | . | 0 | . | 42 | 52.1 | 42 | 52.1 |
| X II 1k処置・治療 緩和ケア | 2 | 19.1 | 12 | 22.1 ↓ | 10 | 65.3 | 24 | 39.8 |
| X II 1l処置・治療 疼痛コントロール | 33 | 33.2 | 74 | 38.3 | 27 | 72.2 | 134 | 43.9 |
| X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 52 | 40.9 | 213 | 54.0 | 263 | 69.6 | 528 | 60.5 |
| X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア | 0 | . | 0 | . | 59 | 77.9 | 59 | 77.9 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0 | . | 143 | 44.6 | 52 | 57.5 | 195 | 48.1 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 34 | 30.7 | 74 | 43.8 | 50 | 62.4 | 158 | 46.9 |
| X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回) | 21 | 28.5 | 45 | 38.8 | 30 | 71.3 | 96 | 46.7 |
| X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回) | 13 | 34.2 | 29 | 51.7 | 20 | 49.0 | 62 | 47.2 |
| X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回) | 0 | . | 104 | 41.7 | 34 | 61.5 | 138 | 46.6 |
| X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回) | 0 | . | 22 | 54.2 | 10 | 42.6 ↓ | 32 | 50.6 |
| X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上) | 0 | . | 17 | 50.0 | 8 | 59.4 | 25 | 53.0 |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 35 | 31.8 | 127 | 43.2 | 43 | 59.5 | 205 | 44.7 |

■(再掲)評価項目に該当した患者に対する「准看護師」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| 全体 | 1,025 | 22.8 | 1,806 | 33.7 | 752 | 50.2 | 3,583 | 34.0 |
| I 31 医師医療提供頻度 指示ほとんどなし | 486 | 21.4 | 505 | 29.2 | 77 | 33.9 | 1,068 | 26.0 |
| I 32 医師医療提供頻度 週1回程度 | 410 | 23.5 | 812 | 33.7 | 261 | 42.7 | 1,483 | 32.5 |
| I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度 | 90 | 26.8 | 373 | 38.9 | 215 | 57.7 | 678 | 43.3 |
| I 34 医師医療提供頻度 毎日 | 14 | 34.5 ↑↑ | 80 | 41.4 | 137 | 52.7 | 231 | 47.7 |
| I 35 医師医療提供頻度 1日数回 | 2 | 26.9 | 5 | 33.7 | 20 | 66.3 | 27 | 57.3 |
| I 36 医師医療提供頻度 24時間体制 | 1 | 1.9 | 2 | 7.2 ↓ | 32 | 81.0 | 35 | 74.5 |
| I 41 看護提供頻度 定時の観察のみ | 585 | 20.4 | 531 | 27.3 | 78 | 30.6 ↓ | 1,194 | 24.1 |
| I 42 看護提供頻度 定時以外1日1回~数回 | 359 | 26.5 | 844 | 36.2 | 289 | 49.7 | 1,492 | 36.5 |
| I 43 看護提供頻度 頻回の観察 | 64 | 24.0 | 328 | 37.8 | 256 | 47.3 | 648 | 40.2 |
| I 44 看護提供頻度 24時間観察 | 13 | 21.4 | 97 | 35.1 | 125 | 69.6 | 235 | 52.7 |
| I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上 | 3 | 44.1 ↑↑ | 48 | 45.6 | 161 | 61.7 | 212 | 57.8 |
| I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上 | 0 | | 4 | 28.9 | 49 | 76.6 | 53 | 73.0 |
| I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上 | 0 | | 1 | 1.9 ↓ | 30 | 81.3 | 31 | 78.7 |
| I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察 | 2 | 58.1 ↑↑ | 11 | 51.0 ↑ | 84 | 74.7 | 97 | 71.7 |
| I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察 | 0 | | 1 | 43.8 | 39 | 79.9 | 40 | 79.0 |
| I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察 | 0 | | 0 | | 29 | 80.8 | 29 | 80.8 |
| II 1 意識障害者である | 101 | 29.1 | 432 | 39.5 | 261 | 51.3 | 794 | 42.0 |
| II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3) | 86 | 18.1 | 75 | 20.3 ↓ | 9 | 36.0 | 170 | 20.0 |
| II 4a-f せん妄の兆候がみられる | 0 | | 43 | 36.6 | 21 | 61.5 | 64 | 44.8 |
| IV 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上) | 222 | 23.3 | 523 | 30.0 | 124 | 50.6 | 869 | 31.2 |
| IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上) | 44 | 24.6 | 288 | 28.3 | 58 | 48.7 | 390 | 30.9 |
| IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上) | 28 | 25.0 | 292 | 28.2 | 40 | 33.6 ↓ | 360 | 28.5 |
| IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 0 | | 248 | 27.3 | 26 | 36.0 | 274 | 28.1 |
| IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上) | 0 | | 168 | 27.1 | 11 | 58.9 | 179 | 29.1 |
| IV 2a 問題行動 徘徊が毎日 | 11 | 21.2 | 48 | 24.7 | 1 | 66.2 | 60 | 24.7 |
| IV 2b 問題行動 暴言が毎日 | 9 | 28.9 | 69 | 28.7 | 15 | 42.1 | 93 | 30.9 |
| IV 2c 問題行動 暴行が毎日 | 0 | | 61 | 27.8 | 9 | 64.7 | 70 | 32.5 |
| IV 2d 問題行動 不相当行為が毎日 | 24 | 27.2 | 88 | 32.4 | 21 | 56.8 | 133 | 35.3 |
| IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日 | 23 | 30.0 | 104 | 32.5 | 32 | 61.6 | 159 | 38.0 |
| VI 1a 疾患 糖尿病 | 147 | 22.0 | 309 | 34.8 | 100 | 56.7 | 556 | 35.4 |
| VI 1b 疾患 不整脈 | 54 | 22.3 | 93 | 37.5 | 45 | 45.3 | 192 | 35.0 |
| VI 1c 疾患 うっ血性心不全 | 37 | 15.7 | 51 | 37.7 | 55 | 54.5 | 143 | 38.5 |
| VI 1d 疾患 急性心不全 | 4 | 20.4 | 3 | 30.7 | 9 | 37.8 | 16 | 32.1 |
| VI 1e 疾患 慢性心不全 | 93 | 23.3 | 140 | 29.3 | 109 | 54.3 | 342 | 35.6 |
| VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度 | 79 | 22.6 | 117 | 30.4 | 101 | 54.6 | 297 | 36.5 |
| VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度 | 78 | 22.8 | 117 | 30.4 | 100 | 54.2 | 295 | 36.5 |
| VI 1f 疾患 高血圧症 | 238 | 22.2 | 365 | 35.4 | 115 | 46.2 | 718 | 32.7 |
| VI 1g 疾患 虚血性心疾患 | 52 | 21.6 | 92 | 29.5 | 32 | 45.0 | 176 | 30.0 |
| VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折 | 80 | 23.3 | 115 | 32.1 | 26 | 55.7 | 221 | 31.7 |
| VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折 | 22 | 16.7 | 57 | 35.5 | 17 | 54.1 | 96 | 34.5 |
| VI 1j 疾患 その他の骨折 | 42 | 23.2 | 64 | 31.4 | 17 | 55.4 | 123 | 31.9 |
| VI 1k 疾患 関節リウマチ | 19 | 29.1 | 43 | 23.5 | 8 | 71.0 | 70 | 30.4 |
| VI 1l 疾患 アルツハイマー病 | 30 | 25.7 | 65 | 32.5 | 38 | 55.4 | 133 | 37.5 |
| VI 1m 疾患 失語症 | 70 | 23.6 | 144 | 34.5 | 57 | 54.0 | 271 | 35.8 |
| VI 1n 疾患 脳性麻痺 | 8 | 13.9 | 15 | 43.8 | 5 | 44.0 | 28 | 35.3 |
| VI 1o 疾患 脳梗塞 | 397 | 23.5 | 641 | 33.7 | 281 | 53.8 | 1,319 | 34.9 |
| VI 1p 疾患 脳出血 | 185 | 26.3 | 294 | 36.8 | 118 | 48.0 | 597 | 35.7 |
| VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症 | 174 | 24.1 | 358 | 35.1 | 111 | 53.4 | 643 | 35.3 |
| VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺 | 177 | 20.4 | 210 | 31.9 | 64 | 45.3 | 451 | 29.3 |
| VI 1s 疾患 多発性硬化症 | 0 | | 8 | 30.7 | 2 | 63.4 | 10 | 37.2 |
| VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患 | 0 | | 264 | 28.9 | 52 | 61.8 | 316 | 34.3 |
| VI 1u 疾患 四肢麻痺 | 38 | 28.4 | 169 | 37.6 | 76 | 49.8 | 283 | 39.6 |
| VI 1v 疾患 仮性球麻痺 | 105 | 32.1 | 235 | 36.5 | 123 | 60.9 | 463 | 42.0 |

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| VI1w 疾患 スモン | 0 | | 0 | | 1 | 109.0 | 1 | 109.0 |
| VI1x 疾患 その他の神経難病 | 0 | | 67 | 37.9 | 29 | 57.6 | 96 | 43.9 |
| VI1y 疾患 神経難病以外の難病 | 0 | | 55 | 40.3 | 11 | 65.3 | 66 | 44.4 |
| VI1z 疾患 脊髄損傷 | 21 | 27.8 | 52 | 32.3 | 6 | 86.6 | 79 | 35.2 |
| VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 0 | | 21 | 30.4 | 3 | 109.6 | 24 | 40.3 |
| VI1aa 疾患 喘息 | 27 | 28.4 | 41 | 33.3 | 38 | 37.7 | 106 | 33.6 |
| VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0 | | 72 | 30.7 | 91 | 38.2 | 163 | 34.9 |
| VI1ab1 疾患 肺気腫 hugh Jones IV+V | 0 | | 71 | 31.5 | 83 | 41.3 | 154 | 36.8 |
| VI1ab2 疾患 肺気腫 hugh Jones V | 0 | | 71 | 31.5 | 83 | 41.3 | 154 | 36.8 |
| VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍) | 55 | 20.7 | 101 | 33.3 | 72 | 50.0 | 228 | 35.5 |
| VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要) | 0 | | 22 | 37.6 | 14 | 45.6 | 36 | 40.7 |
| VI1ad 疾患 腸閉塞 | 6 | 30.9 | 15 | 30.5 | 24 | 47.9 | 45 | 39.9 |
| VI1ae 疾患 腎不全 | 58 | 23.4 | 140 | 41.9 | 35 | 49.6 | 233 | 38.4 |
| VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上 | 55 | 22.9 | 135 | 42.0 | 31 | 50.8 | 221 | 38.5 |
| VI1af 疾患 肝不全 | 6 | 15.3 | 14 | 47.6 | 6 | 33.3 ↓ | 26 | 36.9 |
| VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上) | 7 | 13.6 | 17 | 44.4 | 5 | 35.8 | 29 | 35.4 |
| VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上) | 4 | 9.7 | 4 | 52.4 ↑ | 2 | 28.3 ↓ | 10 | 30.5 |
| VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上) | 0 | | 1 | 52.1 ↑ | 2 | 28.3 ↓ | 3 | 36.2 |
| VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA) | 8 | 71.4 ↑↑ | 53 | 52.8 ↑ | 74 | 48.9 | 135 | 51.8 |
| VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む) | 0 | | 0 | | 1 | 129.5 | 1 | 129.5 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 0 | | 160 | 37.1 | 188 | 51.9 | 348 | 45.1 |
| VI2d 感染症 上気道感染 | 10 | 28.6 | 43 | 38.6 | 22 | 53.8 | 75 | 41.7 |
| VI2e 感染症 敗血症 | 1 | 42.0 ↑↑ | 1 | 78.6 ↑ | 7 | 57.8 | 9 | 58.4 |
| VI2f 感染症 多剤耐性結核 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| VI2g 感染症 上記以外の結核 | 1 | 10.9 | 3 | 23.3 | 0 | | 4 | 20.2 |
| VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間) | 0 | | 182 | 41.3 | 77 | 63.7 | 259 | 48.0 |
| VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり | 0 | | 41 | 49.8 | 39 | 59.9 | 80 | 54.7 |
| VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり | 0 | | 177 | 41.3 | 71 | 66.1 | 248 | 48.4 |
| VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり | 0 | | 175 | 41.5 | 70 | 67.0 | 245 | 48.8 |
| VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当 | 0 | | 40 | 51.0 ↑ | 35 | 64.7 | 75 | 57.4 |
| VI2i 感染症 ウィルス性肝炎 | 10 | 16.9 | 12 | 39.6 | 1 | 11.8 ↓↓ | 23 | 28.5 |
| VI2j 感染症 急性胆嚢炎 | 6 | 20.2 | 9 | 36.1 | 10 | 55.5 | 25 | 40.0 |
| VI2k 感染症 急性腹膜炎 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| VI2l 感染症 急性膵炎 | 0 | | 2 | 43.8 | 1 | 45.5 | 3 | 44.4 |
| VI2m 感染症 創感染 | 0 | | 21 | 34.5 | 9 | 50.5 | 30 | 39.3 |
| VI2n 感染症 皮膚の感染症 | 6 | 26.7 | 33 | 38.6 | 15 | 53.5 | 54 | 41.4 |
| VII1a 問題状況 脱水 | 0 | | 191 | 29.9 | 108 | 54.4 | 299 | 38.8 |
| VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり | 2 | 18.8 | 198 | 31.1 | 114 | 54.6 | 314 | 39.6 |
| VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり | 3 | 33.7 ↑↑ | 196 | 31.4 | 114 | 55.0 | 313 | 40.0 |
| VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり | 3 | 33.7 ↑↑ | 198 | 31.1 | 110 | 55.0 | 311 | 39.5 |
| VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり | 3 | 33.7 ↑↑ | 188 | 31.0 | 109 | 55.1 | 300 | 39.8 |
| VII1b 問題状況 妄想 | 30 | 30.1 | 111 | 24.8 | 19 | 58.4 | 160 | 29.8 |
| VII1c 問題状況 発熱 | 30 | 35.4 ↑↑ | 226 | 43.8 | 321 | 58.3 | 577 | 51.4 |
| VII1d 問題状況 幻覚 | 18 | 32.0 | 67 | 24.1 | 18 | 46.4 | 103 | 29.3 |
| VII1e 問題状況 体内出血 | 0 | | 16 | 41.4 | 26 | 64.8 | 42 | 55.9 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 0 | | 53 | 36.8 | 24 | 56.9 | 77 | 43.0 |
| VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐) | 3 | 15.4 | 74 | 36.6 | 34 | 64.3 | 111 | 44.5 |
| VII1g 問題状況 胸水 | 2 | 32.2 | 20 | 35.5 | 35 | 59.2 | 57 | 49.9 |
| VII1h 問題状況 腹水 | 0 | | 6 | 40.3 | 16 | 53.1 | 22 | 49.6 |
| VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう | 0 | | 3 | 22.1 ↓ | 1 | 9.9 ↓↓ | 4 | 19.1 |
| VII1j 問題状況 悪疫質 | 1 | 1.9 | 5 | 14.9 ↓ | 14 | 56.2 | 20 | 43.2 |
| VII1k 問題状況 消化管の通過障害 | 1 | 10.9 | 4 | 22.9 | 11 | 64.4 | 16 | 50.7 |
| VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上) | 230 | 21.4 | 393 | 32.9 | 103 | 52.4 | 726 | 32.1 |
| VII2a 痛み 頻度(毎日) | 116 | 19.3 | 214 | 33.1 | 67 | 56.1 | 397 | 32.9 |
| VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上) | 86 | 20.9 | 181 | 33.1 | 54 | 54.6 | 321 | 33.5 |
| VII2b 痛み 程度(激しい痛み) | 13 | 20.3 | 22 | 24.6 | 10 | 50.2 | 45 | 29.0 |
| VII3a 状態の安定性 個室管理 | 5 | 36.3 ↑↑ | 29 | 45.2 | 69 | 61.5 | 103 | 55.7 |
| VII3b 状態の安定性 急性症状発生 | 32 | 23.7 | 158 | 40.9 | 159 | 57.3 | 349 | 46.8 |
| VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下 | 8 | 35.0 ↑↑ | 9 | 53.3 ↑ | 38 | 63.9 | 55 | 58.0 |
| VIII1 体重の変化 | 88 | 27.9 | 185 | 31.7 | 120 | 55.0 | 393 | 38.0 |
| VIII2a 中心静脈栄養 | 0 | | 0 | | 251 | 51.9 | 251 | 51.9 |
| VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難) | 2 | 27.3 | 10 | 21.8 ↓ | 217 | 51.5 | 229 | 50.0 |
| VIII2b 末梢静脈栄養 | 16 | 45.6 ↑↑ | 63 | 48.5 | 128 | 58.2 | 207 | 54.3 |
| VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 172 | 35.5 ↑↑ | 794 | 40.2 | 317 | 57.0 | 1,283 | 43.7 |

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 61 | 30.9 | 377 | 40.6 | 170 | 52.6 | 608 | 43.0 |
| VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0 | | 144 | 46.7 | 168 | 63.4 | 312 | 55.7 |
| VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 0 | | 32 | 42.8 | 15 | 50.3 | 47 | 45.2 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上 | 199 | 35.3 ↑↑ | 860 | 40.6 | 599 | 54.5 | 1,658 | 45.0 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上 | 194 | 35.6 ↑↑ | 838 | 40.3 | 573 | 54.6 | 1,605 | 44.9 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上 | 191 | 35.7 ↑↑ | 825 | 40.5 | 560 | 54.4 | 1,576 | 44.8 |
| VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上 | 180 | 35.7 ↑↑ | 810 | 40.3 | 533 | 54.6 | 1,523 | 44.8 |
| VII2 摂取水分量 1cc以上 | 203 | 36.2 ↑↑ | 883 | 40.2 | 610 | 54.2 | 1,696 | 44.7 |
| VII2 摂取水分量 501cc以上 | 195 | 36.7 ↑↑ | 850 | 40.4 | 580 | 54.4 | 1,625 | 45.0 |
| VII2 摂取水分量 1001cc以上 | 170 | 36.6 ↑↑ | 747 | 39.8 | 522 | 54.9 | 1,439 | 44.9 |
| VII2 摂取水分量 1501cc以上 | 76 | 32.0 | 372 | 40.0 | 277 | 55.6 | 725 | 45.1 |
| VII2 摂取水分量 2001cc以上 | 8 | 44.6 ↑↑ | 45 | 35.2 | 39 | 52.1 | 92 | 43.2 |
| VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上) | 8 | 47.2 ↑↑ | 41 | 50.8 ↑ | 335 | 55.2 | 384 | 54.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所 | 16 | 32.2 | 64 | 41.8 | 28 | 51.1 | 108 | 42.8 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所 | 0 | | 4 | 21.9 ↓ | 3 | 69.4 | 7 | 42.3 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上 | 0 | | 9 | 19.9 ↓ | 3 | 59.0 | 12 | 29.7 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所 | 4 | 18.8 | 117 | 39.0 | 62 | 59.2 | 183 | 45.4 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所 | 0 | | 24 | 31.8 | 12 | 70.2 | 36 | 44.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上 | 0 | | 11 | 45.1 | 7 | 85.2 | 18 | 60.7 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所 | 0 | | 89 | 36.0 | 56 | 65.9 | 145 | 47.6 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所 | 0 | | 14 | 34.0 | 5 | 107.6 | 19 | 53.4 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上 | 0 | | 7 | 21.6 ↓ | 8 | 71.2 | 15 | 48.1 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所 | 0 | | 26 | 47.0 | 20 | 85.0 | 46 | 63.5 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所 | 0 | | 4 | 25.3 | 4 | 71.0 | 8 | 48.2 |
| IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上 | 0 | | 2 | 34.9 | 2 | 26.4 ↓ | 4 | 30.6 |
| IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上 | 0 | | 97 | 37.8 | 58 | 72.2 | 155 | 50.7 |
| IX2a 褥瘡 1度 | 8 | 32.2 | 46 | 32.3 | 31 | 57.4 | 85 | 41.5 |
| IX2a 褥瘡 2度 | 0 | | 91 | 38.3 | 56 | 49.5 | 147 | 42.5 |
| IX2a 褥瘡 3度 | 0 | | 80 | 36.1 | 59 | 73.2 | 139 | 51.9 |
| IX2a 褥瘡 4度 | 0 | | 26 | 48.7 | 19 | 75.9 | 45 | 60.2 |
| IX2b うっ血性潰瘍 1度 | 0 | | 11 | 38.4 | 4 | 116.1 | 15 | 59.1 |
| IX2b うっ血性潰瘍 2度 | 0 | | 8 | 52.5 ↑ | 5 | 96.8 | 13 | 69.6 |
| IX2b うっ血性潰瘍 3度 | 0 | | 9 | 29.8 | 4 | 75.2 | 13 | 43.8 |
| IX2b うっ血性潰瘍 4度 | 0 | | 8 | 34.8 | 2 | 34.9 | 10 | 34.8 |
| IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血 | 19 | 32.3 | 89 | 36.8 | 38 | 66.6 | 146 | 43.9 |
| IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷 | 2 | 20.2 | 5 | 60.3 ↑ | 3 | 105.1 | 10 | 65.7 |
| IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創 | 3 | 38.5 ↑↑ | 52 | 38.1 | 24 | 72.3 | 79 | 48.5 |
| IX3d 皮膚他問題 発疹 | 85 | 26.0 | 225 | 38.7 | 99 | 48.3 | 409 | 38.4 |
| IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感 | 46 | 23.5 | 192 | 39.4 | 95 | 61.6 | 333 | 43.5 |
| IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外) | 4 | 44.1 ↑↑ | 31 | 45.0 | 7 | 99.0 | 42 | 53.9 |
| IX3g 皮膚他問題 手術創 | 3 | 32.2 | 26 | 32.0 | 11 | 53.5 | 40 | 37.9 |
| IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用 | 410 | 28.5 | 1,103 | 38.3 | 604 | 54.2 | 2,117 | 41.0 |
| IX4b 皮膚ケア 体位変換 | 457 | 28.3 | 1,198 | 37.6 | 637 | 52.7 | 2,292 | 39.9 |
| IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給 | 31 | 35.8 ↑↑ | 212 | 36.2 | 67 | 54.8 | 310 | 40.2 |
| IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア | 0 | | 153 | 37.3 | 81 | 67.1 | 234 | 47.7 |
| IX4e 皮膚ケア 手術創のケア | 0 | | 37 | 31.0 | 12 | 40.6 | 49 | 33.3 |
| IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわら) | 0 | | 130 | 41.2 | 46 | 58.3 | 176 | 45.7 |
| IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外) | 148 | 27.0 | 432 | 34.8 | 194 | 52.1 | 774 | 37.7 |
| IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置 | 66 | 20.6 | 160 | 33.1 | 78 | 51.2 | 304 | 35.0 |
| IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外) | 99 | 30.0 | 396 | 36.9 | 165 | 65.3 | 660 | 43.0 |
| IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等 | 9 | 19.5 | 39 | 28.2 | 13 | 46.7 | 61 | 30.9 |
| IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等) | 0 | | 25 | 30.7 | 14 | 52.8 | 39 | 38.7 |
| IX5c 足の問題とケア 開放創 | 0 | | 13 | 40.7 | 3 | 132.7 | 16 | 57.9 |
| IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られてい | 87 | 21.9 | 226 | 33.5 | 99 | 54.0 | 412 | 36.0 |
| IX5e 足の問題とケア 保護的なケア | 20 | 36.2 ↑↑ | 55 | 40.8 | 23 | 61.8 | 98 | 44.8 |
| IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置 | 0 | | 122 | 34.5 | 31 | 52.2 | 153 | 38.0 |
| X1 注射・点滴日数 1日 | 23 | 16.3 | 48 | 31.0 | 18 | 59.9 | 89 | 33.0 |
| X1 注射・点滴日数 2日 | 7 | 8.3 | 26 | 36.4 | 22 | 57.5 | 55 | 41.3 |
| X1 注射・点滴日数 3日 | 13 | 34.9 ↑↑ | 39 | 45.0 | 18 | 36.6 | 70 | 41.0 |
| X1 注射・点滴日数 4日 | 2 | 35.8 ↑↑ | 13 | 48.7 | 12 | 40.4 | 27 | 44.0 |
| X1 注射・点滴日数 5日 | 3 | 19.0 | 14 | 41.6 | 12 | 44.2 | 29 | 40.3 |
| X1 注射・点滴日数 6日 | 3 | 22.7 | 8 | 40.8 | 10 | 77.1 | 21 | 55.5 |
| X1 注射・点滴日数 7日以上 | 21 | 48.9 ↑↑ | 66 | 56.9 ↑ | 326 | 57.0 | 413 | 56.6 |
| X2a 注射・点滴 補液 | 51 | 33.2 | 138 | 48.6 | 279 | 55.3 | 468 | 50.9 |

| | 医療区分1 | | 医療区分2 | | 医療区分3 | | 全体 | |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) | 患者数 | ケア時間(分) |
| X2b 注射・点滴 抗生物質注射 | 24 | 34.5 | 98 | 48.2 | 230 | 57.4 | 352 | 53.2 |
| X2c 注射・点滴 強心剤注射 | 0 | | 0 | | 12 | 87.1 | 12 | 87.1 |
| X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴 | 0 | | 2 | 42.2 | 12 | 65.3 | 14 | 62.0 |
| X2e 注射・点滴 24時間持続点滴 | 0 | | 0 | | 321 | 54.0 | 321 | 54.0 |
| X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難) | 11 | 20.3 | 36 | 42.1 | 343 | 52.9 | 390 | 50.9 |
| X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡) | 7 | 25.0 | 30 | 45.4 | 306 | 53.3 | 343 | 52.0 |
| X I 1リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態 | 728 | 22.9 | 1,177 | 34.3 | 397 | 55.5 | 2,302 | 34.3 |
| X I 1リハ 積極的なリハが必要な状態 | 185 | 18.9 | 244 | 28.3 | 45 | 53.9 | 474 | 27.1 |
| X I 11リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内 | 0 | | 25 | 36.4 | 11 | 57.0 | 36 | 42.7 |
| X I 12リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日 | 0 | | 69 | 29.5 | 9 | 48.7 | 78 | 31.7 |
| X I 13リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日 | 106 | 19.0 | 124 | 32.5 | 51 | 60.2 | 281 | 32.4 |
| X I 14リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日 | 126 | 22.4 | 144 | 30.1 | 49 | 37.0 | 319 | 28.1 |
| X I 15リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上 | 491 | 23.9 | 806 | 35.5 | 270 | 58.9 | 1,567 | 35.9 |
| X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日 | 302 | 22.5 | 534 | 32.0 | 149 | 49.0 | 985 | 31.7 |
| X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日 | 293 | 22.3 | 506 | 31.5 | 139 | 48.9 | 938 | 31.2 |
| X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日 | 282 | 22.5 | 492 | 31.9 | 128 | 49.0 | 902 | 31.4 |
| X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日 | 272 | 22.9 | 467 | 32.5 | 115 | 50.1 | 854 | 31.8 |
| X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上 | 264 | 23.1 | 453 | 32.6 | 110 | 50.2 | 827 | 31.9 |
| X II 1a処置・治療 抗がん剤療法 | 4 | 27.6 | 4 | 35.6 | 4 | 130.2 | 12 | 64.5 |
| X II 1b処置・治療 透析 | 0 | | 92 | 42.6 | 4 | 43.9 | 96 | 42.7 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 106 | 31.5 | 460 | 39.3 | 215 | 61.9 | 781 | 44.5 |
| X II 1d処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄 | 0 | | 0 | | 9 | 33.5 | 9 | 33.5 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 0 | | 0 | | 350 | 49.3 | 350 | 49.3 |
| X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下) | 8 | 26.1 | 26 | 31.5 | 366 | 50.1 | 400 | 48.4 |
| X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下) | 7 | 16.7 | 25 | 31.7 | 341 | 47.1 | 373 | 45.5 |
| X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下) | 7 | 16.7 | 26 | 31.5 | 327 | 46.8 | 360 | 45.1 |
| X II 1f処置・治療 放射線治療 | 0 | | 0 | | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 |
| X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 0 | | 503 | 42.0 | 337 | 58.9 | 840 | 48.8 |
| X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 34 | 33.1 | 132 | 42.0 | 114 | 51.9 | 280 | 44.9 |
| X II g1処置・治療 吸引(1日1回) | 8 | 21.2 | 7 | 33.6 | 5 | 24.4 | 20 | 26.3 |
| X II g2処置・治療 吸引(1日2回) | 5 | 45.6 | 15 | 43.4 | 7 | 37.7 | 27 | 42.3 |
| X II g3処置・治療 吸引(1日3回) | 9 | 29.3 | 30 | 36.3 | 24 | 46.5 | 63 | 39.2 |
| X II g4処置・治療 吸引(1日4回) | 2 | 49.6 | 16 | 54.3 | 16 | 74.8 | 34 | 63.7 |
| X II g5処置・治療 吸引(1日5回) | 1 | 42.0 | 27 | 45.8 | 19 | 52.2 | 47 | 48.3 |
| X II g6処置・治療 吸引(1日6回) | 4 | 41.8 | 25 | 41.8 | 28 | 56.5 | 57 | 49.0 |
| X II g7処置・治療 吸引(1日7回) | 5 | 31.1 | 12 | 35.3 | 15 | 42.6 | 32 | 38.1 |
| X II g8処置・治療 吸引(1日8回) | 0 | | 95 | 39.1 | 55 | 67.4 | 150 | 49.4 |
| X II g9処置・治療 吸引(1日9回) | 0 | | 26 | 39.9 | 12 | 66.0 | 38 | 48.2 |
| X II g10処置・治療 吸引(1日10回) | 0 | | 117 | 33.4 | 66 | 54.1 | 183 | 40.9 |
| X II g11処置・治療 吸引(1日11回) | 0 | | 17 | 36.4 | 6 | 53.3 | 23 | 40.8 |
| X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上) | 0 | | 248 | 47.7 | 198 | 57.8 | 446 | 52.2 |
| X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 0 | | 195 | 47.2 | 180 | 66.6 | 375 | 56.5 |
| X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア | 0 | | 0 | | 115 | 66.1 | 115 | 66.1 |
| X II i処置・治療 輸血 | 1 | 1.9 | 2 | 23.7 | 10 | 98.3 | 13 | 79.4 |
| X II ij処置・治療 レスプレーター | 0 | | 0 | | 42 | 76.7 | 42 | 76.7 |
| X II 1k処置・治療 緩和ケア | 2 | 10.4 | 12 | 43.3 | 10 | 51.3 | 24 | 43.9 |
| X II 1l処置・治療 疼痛コントロール | 33 | 15.7 | 74 | 35.7 | 27 | 54.8 | 134 | 34.6 |
| X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 52 | 31.3 | 213 | 46.3 | 263 | 56.5 | 528 | 49.9 |
| X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア | 0 | | 0 | | 59 | 44.8 | 59 | 44.8 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0 | | 143 | 35.4 | 52 | 63.4 | 195 | 42.9 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 34 | 18.1 | 74 | 39.7 | 50 | 63.8 | 158 | 42.7 |
| X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回) | 21 | 16.9 | 45 | 33.7 | 30 | 47.3 | 96 | 34.3 |
| X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回) | 13 | 20.0 | 29 | 48.9 | 20 | 88.7 | 62 | 55.7 |
| X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回) | 0 | | 104 | 34.1 | 34 | 57.6 | 138 | 39.9 |
| X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回) | 0 | | 22 | 30.1 | 10 | 88.8 | 32 | 48.5 |
| X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上) | 0 | | 17 | 50.3 | 8 | 56.6 | 25 | 52.3 |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 35 | 23.9 | 127 | 39.6 | 43 | 53.3 | 205 | 39.8 |

3 主要評価項目間の重複がない場合のケア時間

■主要評価項目において項目間の重複がない場合のケア時間 (主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

| | N数 | 人件費重み付けケア時間(職種別) | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------------------|------|------|------|-------|--------|-------|
| | | 全体 | 医師 | 看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | リハスタッフ | その他職種 |
| 全体 | 1,854 | 133.0 | 13.3 | 34.1 | 25.0 | 41.8 | 12.3 | 6.4 |
| VI1z 疾患 脊髄損傷 | 29 | 144.7 | 17.3 | 20.1 | 31.1 | 52.1 | 15.6 | 8.6 |
| VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 6 | 143.7 | 8.1 | 29.9 | 19.2 | 51.2 | 29.2 | 6.1 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 34 | 139.3 | 15.3 | 42.8 | 27.4 | 42.0 | 6.6 | 5.2 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 10 | 142.8 | 13.2 | 43.7 | 25.8 | 42.3 | 12.2 | 5.5 |
| IX2a 褥瘡 2度以上 | 22 | 163.2 | 21.3 | 42.2 | 38.7 | 46.8 | 8.3 | 6.0 |
| IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上 | 10 | 164.4 | 22.0 | 51.3 | 41.7 | 37.1 | 6.9 | 5.4 |
| IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上 | 28 | 156.8 | 19.1 | 40.6 | 38.3 | 44.6 | 8.1 | 6.1 |
| IX2b うつ血性潰瘍 2度以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 137 | 130.1 | 13.7 | 36.5 | 23.6 | 41.8 | 9.3 | 5.2 |
| VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養 | 24 | 162.6 | 15.7 | 38.2 | 42.1 | 51.9 | 8.4 | 6.3 |
| X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 14 | 136.4 | 13.3 | 30.3 | 23.0 | 53.0 | 10.8 | 6.1 |
| X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 9 | 141.8 | 7.2 | 52.0 | 25.4 | 40.8 | 10.9 | 5.5 |
| VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 157 | 146.6 | 13.1 | 49.1 | 32.9 | 39.3 | 7.9 | 4.3 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 26 | 147.3 | 13.7 | 30.9 | 31.4 | 44.4 | 20.4 | 6.4 |
| X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 5 | 135.8 | 8.6 | 14.9 | 32.8 | 43.1 | 27.6 | 8.8 |
| VIII2b 末梢静脈栄養 | 32 | 175.1 | 21.2 | 48.6 | 34.5 | 51.0 | 9.8 | 10.0 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 54 | 140.3 | 19.4 | 38.0 | 29.4 | 40.7 | 5.0 | 7.9 |
| I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察 | 3 | 126.6 | 7.5 | 25.9 | 20.0 | 60.3 | 3.3 | 9.6 |
| X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 58 | 145.3 | 16.1 | 40.5 | 32.9 | 43.4 | 7.8 | 4.6 |
| IX4-5 創傷処置 | 47 | 152.0 | 11.6 | 36.3 | 29.2 | 50.6 | 15.8 | 8.6 |
| X II 1o処置・治療 血糖子チェック(1日3回以上) | 33 | 141.7 | 13.3 | 31.8 | 32.1 | 39.7 | 16.2 | 8.6 |
| X II 1o処置・治療 血糖子チェック(1日2回以下) | 22 | 139.2 | 15.4 | 34.8 | 22.9 | 44.8 | 14.8 | 6.5 |
| IX4d 皮膚の潰瘍ケア | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 16 | 107.1 | 14.5 | 27.4 | 22.6 | 29.1 | 6.7 | 7.0 |

■(再掲)主要評価項目において項目間の重複がなく、且つ、ADL区分3の場合のケア時間
(ADL区分3で主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

| | N数 | 人件費重み付けケア時間(職種別) | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|------|------|------|-------|--------|-------|
| | | 全体 | 医師 | 看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | リハスタッフ | その他職種 |
| 全体 | 524 | 154.2 | 14.0 | 44.8 | 32.7 | 49.2 | 7.7 | 5.9 |
| VI1z 疾患 脊髄損傷 | 8 | 165.9 | 9.5 | 30.7 | 27.6 | 76.6 | 11.1 | 10.4 |
| VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 2 | 216.3 | 12.1 | 59.5 | 24.3 | 87.7 | 24.2 | 8.4 |
| VI2c 感染症 肺炎 | 11 | 165.3 | 16.7 | 65.6 | 37.4 | 38.3 | 2.7 | 4.6 |
| VII1f 問題状況 嘔吐 | 3 | 203.0 | 14.7 | 76.6 | 18.3 | 54.8 | 30.5 | 8.2 |
| IX2a 褥瘡 2度以上 | 16 | 168.1 | 23.0 | 44.5 | 41.8 | 45.9 | 7.4 | 5.6 |
| IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上 | 5 | 175.3 | 27.1 | 54.6 | 48.5 | 39.2 | 2.5 | 3.4 |
| IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上 | 18 | 159.8 | 20.8 | 41.4 | 42.3 | 43.8 | 6.6 | 5.1 |
| IX2b うっ血性潰瘍 2度以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 27 | 128.7 | 14.4 | 40.2 | 21.1 | 43.6 | 6.1 | 3.3 |
| VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養 | 23 | 163.2 | 15.3 | 38.5 | 43.3 | 53.3 | 6.1 | 6.6 |
| X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 9 | 142.4 | 17.2 | 32.1 | 22.9 | 58.5 | 5.2 | 6.5 |
| X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 9 | 141.8 | 7.2 | 52.0 | 25.4 | 40.8 | 10.9 | 5.5 |
| VII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等) | 144 | 145.4 | 13.1 | 48.2 | 33.5 | 39.9 | 6.3 | 4.4 |
| X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 10 | 174.9 | 14.4 | 44.0 | 42.3 | 51.0 | 13.4 | 9.8 |
| X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 1 | 107.9 | - | 15.1 | 21.5 | 68.9 | 2.5 | - |
| VIII2b 末梢静脈栄養 | 14 | 188.7 | 23.3 | 49.7 | 44.1 | 50.1 | 13.3 | 8.1 |
| X II 1e処置・治療 酸素療法 | 11 | 164.3 | 17.1 | 59.0 | 22.2 | 52.0 | 2.5 | 11.5 |
| I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察 | 1 | 122.8 | 9.4 | 16.1 | 22.4 | 57.8 | 9.9 | 7.3 |
| X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 28 | 157.4 | 19.8 | 40.1 | 40.4 | 45.8 | 6.5 | 4.8 |
| IX4-5 創傷処置 | 13 | 179.7 | 14.2 | 36.2 | 47.5 | 55.9 | 18.8 | 7.1 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 7 | 181.5 | 16.0 | 20.5 | 75.1 | 43.0 | 13.9 | 13.0 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 3 | 199.2 | 23.3 | 48.4 | 26.9 | 65.5 | 17.3 | 17.9 |
| IX4d 皮膚の潰瘍ケア | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 2 | 104.1 | 9.0 | 31.1 | 10.3 | 28.2 | 19.8 | 5.7 |

■「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間

単位:分

| | N数 | 人件費重み付けケア時間(職種別) | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|
| | | 全体 | 医師 | 看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | リハスタッフ | その他職種 | |
| 全体(経管栄養) | 468 | 147.2 | 13.0 | 44.9 | 36.5 | 39.0 | 8.9 | 4.9 | |
| 経管栄養との組み合わせ | VI1z 疾患 脊髄損傷 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | VI2c 感染症 肺炎 | 13 | 164.7 | 8.6 | 55.6 | 53.6 | 34.5 | 7.0 | 5.6 |
| | VII1f 問題状況 嘔吐 | 2 | 129.8 | - | 61.1 | 36.2 | 31.9 | - | 0.7 |
| | IX2a 褥瘡 2度以上 | 6 | 174.0 | 15.1 | 80.8 | 36.5 | 30.3 | 7.1 | 4.2 |
| | IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上 | 6 | 174.0 | 15.1 | 80.8 | 36.5 | 30.3 | 7.1 | 4.2 |
| | IX2b うっ血性潰瘍 2度以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 8 | 158.3 | 8.8 | 50.4 | 34.1 | 49.0 | 9.6 | 6.3 |
| | X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 34 | 138.3 | 14.8 | 37.7 | 34.7 | 41.5 | 4.9 | 4.8 |
| | X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 28 | 163.0 | 14.2 | 48.3 | 54.5 | 37.5 | 5.4 | 3.1 |
| | X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 157 | 139.8 | 12.1 | 36.7 | 35.1 | 38.2 | 12.0 | 5.7 |
| | X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 17 | 159.6 | 18.5 | 44.7 | 47.5 | 38.2 | 5.5 | 5.2 |
| | VIII2b 末梢静脈栄養 | 2 | 200.1 | 31.6 | 49.8 | 35.8 | 62.9 | 4.2 | 15.8 |
| | X II 1e処置・治療 酸素療法 | 6 | 147.5 | 9.1 | 57.4 | 38.3 | 32.8 | 5.3 | 4.7 |
| | I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 22 | 158.5 | 13.8 | 49.3 | 41.8 | 41.1 | 7.8 | 4.7 |
| | IX4-5 創傷処置 | 9 | 175.8 | 14.1 | 73.4 | 26.4 | 36.9 | 21.3 | 3.7 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 4 | 130.6 | 16.0 | 24.6 | 26.6 | 58.6 | 1.3 | 3.5 | |
| IX4d 皮膚の潰瘍ケア | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 3 | 118.2 | 13.5 | 38.4 | 22.7 | 28.3 | 7.5 | 7.8 | |

■(再掲)「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間(ADL区分3に該当する場合)

単位:分

| | N数 | 人件費重み付けケア時間(職種別) | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|
| | | 全体 | 医師 | 看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | リハスタッフ | その他職種 | |
| 全体(経管栄養) | 423 | 147.4 | 12.6 | 45.5 | 37.5 | 39.3 | 7.7 | 4.8 | |
| 経管栄養との組み合わせ | VI1z 疾患 脊髄損傷 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う) | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | VI2c 感染症 肺炎 | 13 | 164.7 | 8.6 | 55.6 | 53.6 | 34.5 | 7.0 | 5.6 |
| | VII1f 問題状況 嘔吐 | 2 | 129.8 | - | 61.1 | 36.2 | 31.9 | - | 0.7 |
| | IX2a 褥瘡 2度以上 | 6 | 174.0 | 15.1 | 80.8 | 36.5 | 30.3 | 7.1 | 4.2 |
| | IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上 | 6 | 174.0 | 15.1 | 80.8 | 36.5 | 30.3 | 7.1 | 4.2 |
| | IX2b うっ血性潰瘍 2度以上 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上) | 7 | 158.1 | 9.9 | 39.5 | 38.7 | 51.8 | 11.0 | 7.2 |
| | X II g処置・治療 吸引(1日1~7回) | 33 | 137.9 | 14.7 | 37.0 | 35.6 | 41.0 | 4.9 | 4.7 |
| | X II g処置・治療 吸引(1日8回以上) | 28 | 163.0 | 14.2 | 48.3 | 54.5 | 37.5 | 5.4 | 3.1 |
| | X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置 | 128 | 140.4 | 10.4 | 39.3 | 36.4 | 38.7 | 10.0 | 5.6 |
| | X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア | 17 | 159.6 | 18.5 | 44.7 | 47.5 | 38.2 | 5.5 | 5.2 |
| | VIII2b 末梢静脈栄養 | 1 | 219.2 | 52.0 | 23.6 | 52.8 | 74.2 | 4.2 | 12.4 |
| | X II 1e処置・治療 酸素療法 | 6 | 147.5 | 9.1 | 57.4 | 38.3 | 32.8 | 5.3 | 4.7 |
| | I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル | 22 | 158.5 | 13.8 | 49.3 | 41.8 | 41.1 | 7.8 | 4.7 |
| | IX4-5 創傷処置 | 9 | 175.8 | 14.1 | 73.4 | 26.4 | 36.9 | 21.3 | 3.7 |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下) | 4 | 130.6 | 16.0 | 24.6 | 26.6 | 58.6 | 1.3 | 3.5 | |
| IX4d 皮膚の潰瘍ケア | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く) | 3 | 118.2 | 13.5 | 38.4 | 22.7 | 28.3 | 7.5 | 7.8 | |