

(新聞発表用)

製造販売

1	販 売 名	エスタック鼻炎24 エスタック鼻炎錠24
2	一 般 名	エピナスチン塩酸塩
3	申 請 者 名	エスエス製薬株式会社
4	成 分 ・ 含 量	1日量 1錠中 エピナスチン塩酸塩 10mg
5	用 法 ・ 用 量	成人（15歳以上）1回1錠を1日1回就寝前に服用する。
6	効 能 ・ 効 果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
7	備 考	取扱い区分：新一般用成分医薬品 添付文書(案)を別紙として添付 本剤は、新一般用成分としてエピナスチン塩酸塩を配合したアレルギー用薬である。

この説明書は、本剤とともに保管し、
服用の際には、必ずお読みください。

エピナスチン塩酸塩製剤

アレルギー用薬

第1類医薬品

エスタック鼻炎24

エスタック鼻炎24は、エピナスチン塩酸塩を配合した製剤で、1日1回の服用ですぐれた効果をあらわします。

⚠ 【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。^{*}
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 次の診断を受けた人。
肝臓病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のアレルギー用薬（皮ふ疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

（眠気があらわれることがある。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 服用時は飲酒しないこと

^{*}本剤と同じ成分を含む医療用医薬品の添付文書では、妊婦への注意が次のようになっています。

「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。」

本剤を誤って妊娠中に服用しても過度に心配する必要はありません。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, はれ, かゆみ
消化器	悪心・嘔吐, 口内炎, 胃部不快感, 腹痛, 胃重感, 胃もたれ感, 腹部膨満感, 食欲不振
精神神経系	めまい, 不眠, 頭痛, 頭がぼーっとする, しびれ感
その他	むくみ, 排尿困難, 頻尿, 血尿, 蛋白尿, ほてり, 胸痛, 動悸, 痰がからむ, 息苦しい, 倦怠感, 鼻づまり, 月経異常, 苦味を感じる, 味覚が弱くなる

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ, 黄疸 (皮ふや白目が黄色くなる) 等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより, 鼻血, 歯ぐきからの出血, 青あざ等の出血症状があらわれる。

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

口のかわき, 便秘, 下痢, 眠気

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談すること

【 効能・効果 】

花粉, ハウスダスト (室内塵) などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
くしゃみ, 鼻みず, 鼻づまり

【用法・用量】


次の1回量を1日1回就寝前に服用する。

年齢	成人（15歳以上）	15歳未満
1回量	1錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3)錠剤の取り出し方。

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【成分】 1錠中

エピナスチン塩酸塩 10mg

添加物として、無水ケイ酸、ポビドン、ステアリン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒプロメロース、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、マクロゴール、タルク、酸化チタン、シリコーン樹脂を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり品質が変わることがある。）
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

【お問い合わせ先】

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4