

1. ドナーとレシピエントの体重差に関するレシピエント選定基準について

移植ネットワーク	選定基準	参考文献
UNOS	記載無し	HP
Australia & NZ	記載無し	HP
Eurotransplant	記載無し	HP

2. 分割移植 (Adult-to-adult)

	ドナー 適応	レシピ適応	ドナー・レシピ 体重差	症例数	Split GRWR	Whole GRWR	患者生存率	胆管合併症	国	参考文献
1	記載無し	記載無し	基準無し	316	記載無し	記載無し	MELDで層別化: 全肝移植 (20778例)と同様	記載無し	ドイツ	Nadalin, et al. Transplant Int 2009;22:702-706
2	50歳未満、ICU<5daysなど	記載無し	基準無し	80	1.78(0.9-3.8)	2.36(1.2-3.9)	1年83%、5年82%: 全肝移植89%、 80%(80例)と同様	33%: 全肝移植と同様	ドイツ	Takebe et al. Liver Transpl 2009;15:730-737
3	記載無し	GRWR0.7%<, PH軽度	基準無し	22	0.67-2.11	-	90%	4%	イタリア	Cescon et al. Transplantation 2009;88:1117-1122
4	記載無し	GRWR0.8%<	基準無し	31	記載無し	記載無し	3年74%: 全肝移植74% (284例)と同様	全肝移植と同様	US	Humar et al. 2008;85:1420-1424
5	50歳未満、ICU<1w、良好な グラフトなど	サイズマッチ(詳細記載無し) ・明らかなPH無し	基準無し	16	0.72-1.12	-	1年、3年、5年69%	25%	イタリア	Giaconomi A, et al. Liver Transpl 2008;14:999-1006
6	肉眼所見で特に問題なければ	全肝移植に同じ	基準無し	12	1.5	1.9	5年77%: 全肝移植84% (12例)と同様	17%	ベルギー	Barriga et al. Clin Transplant 2008;22:447-455
7	50歳未満、ICU<5daysなど	初回移植など	基準無し	70	記載無し	記載無し	2年86%、5年78%: 全肝移植 (70例)と同様	11%: 全肝移植と同様	ドイツ	Wilms et al. Ann Surg 2006;244:865-873

PH:Portal hypertension