


# 調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキの比較について

○平成20年と平成21年の自治体間の項目選択率のバラツキ(標準偏差)を比較※1

○対象:

見直し後の方式により、平成21年4・5月に判定を行った事例を認定支援ネットワークに6月17日までに100例以上報告した433自治体※2

○平成20年と平成21年のバラツキを比較して、74項目のうち、統計学的有意にバラツキが小さくなったのは33項目、有意にバラツキが大きくなったのは9項目(うち1項目は、明らかな基準の変更はない。)(有意水準0.05未満)



- 買い物
- 集団への不応
- 簡単な調理
- 座位保持
- 移動
- 拘縮(膝関節)
- ひどい物忘れ
- 麻痺(右一下肢)
- 麻痺(左一下肢)
- 麻痺(その他)
- 日常の意思決定
- 移乗
- 寝返り
- 視力
- 排尿
- 排便
- 金銭の管理
- 短期記憶
- 意思の伝達
- ズボン等の着脱
- つめ切り
- 上衣の着脱
- 片足での立位
- 感情が不安定
- 起き上がり
- 話がまとまらない
- えん下
- 両足での立位
- 自分勝手に行動する
- 洗身
- 同じ話をする
- 食事摂取
- 薬の内服
- 毎日の日課を理解
- 聴力
- 拘縮(肩関節)
- 昼夜逆転
- 整髪
- 拘縮(その他)
- 口腔清潔
- 介護に抵抗
- 洗顔
- 歩行
- 外出頻度
- 麻痺(右一下肢)
- 麻痺(左一下肢)
- 拘縮(股関節)
- 今の季節を理解
- 立ち上がり
- 場所の理解
- 生年月日をいう
- 大声をだす
- 作話
- 被害的
- 疼痛の看護
- 落ち着きなし
- 常時の徘徊
- 点滴の管理
- 自分の名前をいう
- 一人では出たがる
- 外出して戻れない
- カテーテル
- 収集癖
- 経管栄養
- じよくそのうの処置
- 酸素療法
- 物や衣類を壊す
- 透析
- モニター測定
- 中心静脈栄養
- 気管切開の処置
- レスピレーター