

副反応症例の内訳（性別・年齢別）

1. 性別

男	708 (31.2%)	
女	1552 (68.5%)	うち妊婦37
不明	6 (0.3%)	

2. 年齢別

(1) 報告数

年齢	副反応報告数	重篤報告数	死亡報告数
0～9歳	401	51	3
10～19歳	84	10	1
20～29歳	277	23	0
30～39歳	408	34	3
40～49歳	322	32	1
50～59歳	236	27	4
60～69歳	174	42	15
70～79歳	203	75	38
80歳以上	155	85	61
不明	6	0	0
合計	2266	379	126

(2) 接種期間別報告数

接種日 ※	10歳 未満	10歳 代	20歳 代	30歳 代	40歳 代	50歳 代	60歳 代	70歳 代	80歳 以上	不明	合計
10/19 - 10/25	0	1	58	94	90	53	19	2	3	2	322
10/26 - 11/1	0	2	80	122	98	55	17	3	1	0	378
11/2 - 11/8	3	5	41	72	40	30	10	2	5	1	209
11/9 - 11/15	20	4	24	30	25	20	9	10	7	0	149
11/16 - 11/29	115	26	35	44	34	37	53	88	62	0	494
11/30 - 12/6	60	3	10	7	7	11	11	21	14	1	145
12/7 - 12/13	85	4	8	7	6	9	15	20	19	1	174
12/14 - 12/20	52	6	5	7	4	7	10	17	10	0	118
12/21 - 12/27	24	7	5	7	9	4	7	9	11	0	83
12/28 - 1/10	17	14	4	5	1	4	5	6	6	0	62
1/11 - 1/17	13	5	3	5	3	1	1	9	1	0	41
1/18 - 1/24	9	3	2	3	2	2	4	8	4	1	38
1/25 - 1/31	2	3	0	5	3	1	9	6	9	0	38
2/1 - 2/8	1	1	2	0	0	2	4	2	3	0	15
合計	401	84	277	408	322	236	174	203	155	6	2266
	17.7%	3.7%	12.2%	18.0%	14.2%	10.4%	7.7%	9.0%	6.8%	0.3%	

3. 報告された重篤副反応名（2件以上、件数上位順）

季節性ワクチンと新型ワクチンの比較

MedDRA/J Ver. 12.1 で副反応名をコード化したもの

2006～2008 年度 3 年間合計 季節性インフルエンザワクチン		A 型インフルエンザ H1N1 ワクチン	
副反応症例数	349	378	副反応症例数
副反応件数	503	547	副反応件数
	件数	件数	
発熱	43	64	発熱
急性散在性脳脊髄炎	41	50	アナフィラキシー反応
ギラン・バレー症候群	23	25	痙攣
アナフィラキシーショック	18	14	肝機能異常
痙攣	17	14	蕁麻疹
ショック	16	12	急性呼吸不全
肝機能異常	12	12	間質性肺疾患
注射部位腫脹	10	11	嘔吐
注射部位紅斑	8	10	心肺停止
* 肺炎	8	9	肺炎
* 顔面神経麻痺	8	9	意識変容状態
* 間質性肺疾患	8	9	頭痛
アナフィラキシー反応	7	9	喘息
発疹	7	7	呼吸困難
アナフィラキシー様反応	6	7	呼吸不全
* 脳症	6	6	悪心
* 特発性血小板減少性紫斑病	5	6	浮動性めまい
* 脳炎	5	6	脳症
意識消失	5	6	ギラン・バレー症候群
紅斑	5	6	感覚鈍麻
* 蜂巣炎	4	6	失神寸前の状態
筋力低下	4	5	急性心不全
頭痛	4	5	下痢
* 末梢性ニューロパチー	4	5	血圧低下
喘息	4	5	急性散在性脳脊髄炎
悪心	3	4	動悸

	注射部位疼痛	3	4	心筋梗塞	*
	倦怠感	3	4	腹痛	*
*	末梢性浮腫	3	4	倦怠感	
	急性肝炎	3	4	脳出血	*
	黄疸	3	4	呼吸停止	*
	血圧低下	3	4	喘鳴	*
*	多発性脳神経麻痺	3	4	全身性皮疹	
*	脳血管炎	3	4	ショック	
	呼吸困難	3	3	血小板減少性紫斑病	*
	喉頭浮腫	3	3	心不全	*
*	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	3	3	異常感	
	蕁麻疹	3	3	無力症	
	中毒性皮疹	3	3	アナフィラキシーショック	
*	貧血	2	3	インフルエンザ	
*	白血球減少症	2	2	心停止	
	リンパ節症	2	2	ブドウ膜炎	*
	回転性めまい	2	2	高熱	
*	ブドウ膜炎	2	2	心突然死	
*	角膜落屑	2	2	アナフィラキシー様反応	
*	腹痛	2	2	プロトロンビン時間延長	
	下痢	2	2	酸素飽和度低下	
	嘔吐	2	2	血小板数減少	*
*	胸痛	2	2	関節痛	
*	全身性浮腫	2	2	背部痛	
*	腫脹	2	2	筋力低下	
	肝炎	2	2	筋肉痛(※筋痛として報告)	
	肝障害	2	2	四肢痛	*
*	細気管支炎	2	2	脳炎	*
*	注射部位膿瘍	2	2	顔面神経麻痺	*
*	髄膜炎	2	2	傾眠	
*	無菌性髄膜炎	2	2	末梢性ニューロパチー	*
*	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	2	アレルギー性肉芽腫性血管炎	
*	C-反応性蛋白増加	2	2	鼻漏	
*	血小板数減少	2	2	頻呼吸	

*	白血球数減少	2	2	循環虚脱
	関節痛	2		
*	多発性関節炎	2		
*	リウマチ性多発筋痛	2		
*	横紋筋融解	2		
	意識変容状態	2		
*	健忘	2		
*	小脳性運動失調	2		
	意識レベルの低下	2		
	熱性痙攣	2		
	脊髄炎	2		
*	神経痛性筋萎縮症	2		
*	ミラー・フィッシャー症候群	2		
*	複合性局所疼痛症候群	2		
*	異常行動	2		
*	ネフローゼ症候群	2		
*	胸水	2		
	呼吸不全	2		
	薬疹	2		
	多形紅斑	2		
*	白血球破碎性血管炎	2		
*	血管性紫斑病	2		
*	側頭動脈炎	2		