

表3 期別ワクチン別接種後有害事象調査結果(2010年3月21日時点中間報告)

有害事象	1期追加	2期相当(1期を乾燥細胞培養ワクチン:ジエービックV ^R で接種)	2期相当(1期をマウス脳由来ワクチンで接種)	計
無し	25	22	62	109
有り	15	9	50	74
合計	40	31	112	183

4週追加接種4^{se}6週以内の有害事象内容(2010年3月21日時点中間報告)

年齢	有害事象名	症状の程度	処置	重篤性	転帰	本剤との関連性
4	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	未回復	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
	腹痛	いつもとほぼ変わりなく生活	浣腸、内服	非重篤	回復	関連無し
4	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	無し	非重篤	回復	明らかに関連有り
4	頭痛	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
6	嘔吐下痢症	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
6	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
6	尋麻疹	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
6	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
6	発熱	38.0℃(接種後20日目)	無し	非重篤	回復	関連無し
6	咳嗽	未記入	未記入	未記入	未記入	関連無し
6	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
7	嘔吐	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連があるかもしれない
7	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
7	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
	下痢	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連があるかもしれない
7	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
7	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
7	鼻汁(時期を離れて2回)	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し



表5 2期相当(1期ジェービックV^R)接種4-6週以内の有害事象内容(2010年3月21日時点中間報告)

年齢	有害事象名	症状の程度	処置	重篤性	転帰	本剤との関連性
8	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	無し	非重篤	回復	明らかに関連有り
9	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
9	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	軽快	関連無し
9	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	無し	非重篤	回復	明らかに関連有り
9	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	未記入	非重篤	回復	明らかに関連有り
	接種部位の腫脹	直径1cm~5cm未満	未記入	非重篤	回復	明らかに関連有り
9	上気道炎	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
9	接種部位の腫脹	直径1cm~5cm未満	無し	非重篤	回復	明らかに関連有り
10	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	未記入	非重篤	軽快	関連不明
	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	未記入	非重篤	軽快	関連無し
10	発熱	38.8℃(接種後19日目)	無し	非重篤	回復	関連があるかもしれない

表6-1 2期相当(1期マウス脳由来)接種4-6週以内の有害事象内容1(2010年3月21日時点中間報告)

年齢	有害事象名	症状の程度	処置	重篤性	転帰	本剤との関連性
7	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
9	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	軽快	関連無し
	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	軽快	関連無し
9	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
9	鼻閉	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
9	鼻汁(時期を離れて2回)	いつもとほぼ変わりなく生活	無と内服	非重篤	回復	関連無し
	発熱	39.2℃(接種後19日目)	内服	非重篤	回復	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連無し
9	発熱	37.4℃(接種後15日目)	無し	非重篤	回復	関連無し
9	接種部位の発赤	直径1cm~5cm未満	未記入	非重篤	回復	明らかに関連有り
	接種部位の腫脹	直径1cm~5cm未満	未記入	非重篤	回復	明らかに関連有り
	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	未記入	非重篤	回復	関連無し
9	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	投薬中	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	内服、経皮剤	非重篤	投薬中	関連無し
9	発熱	未記入	無し	非重篤	回復	関連無し
	咳嗽	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
	鼻汁	いつもとほぼ変わりなく生活	無し	非重篤	回復	関連無し
9	咽頭痛	いつもとほぼ変わりなく生活	内服	非重篤	回復	関連があるかも不明
9	接種部位の腫脹	直径1cm~5cm未満	無し	非重篤	回復	明らかに関連有り