

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成20年4月1日から平成20年9月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成20年4月1日から平成20年9月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(薬効分類別)

薬効	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	急性腎不全	1
		痙攣	1
解熱鎮痛消炎剤	1包(0.8g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド120mg, カフェイン70mg	腎障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
解熱鎮痛消炎剤	3包中アセトアミノフェン690mg, エテンザミド690mg, カフェイン225mg, シャクヤクエキス(原生薬換算量600mg)150mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム450mg	低カリウム血症	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中エテンザミド500mg, アセトアミノフェン300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン26mg, ジベンゾイルチアミン10mg	肝障害	1
		急性腎不全	1
		代謝性アシドーシス	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中エテンザミド500mg, アセトアミノフェン300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン26mg, ジベンゾイルチアミン10mg	低リン酸血症	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	アナフィラキシーショック	1
		薬疹	2
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	中毒性表皮壊死融解症	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	急性肝炎	1
		多形紅斑	1
		頭痛	1
解熱鎮痛消炎剤	6錠中アセトアミノフェン900mg	アナフィラキシーショック	1
		意識変容状態	1
		肝機能異常	1
		薬物毒性	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イブプロフェン65mg, アセトアミノフェン65mg, 無水カフェイン40mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg	薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシー反応	1
		肝機能異常	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		白血球数減少	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		蕁麻疹	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
解熱鎮痛消炎剤	1カプセル中イブプロフェン・150mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	3包中トラネキサム酸750mg, アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム150mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, 無水カフェイン75mg	薬疹	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩酸プロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, アスコルビン酸カルシウム166.7mg, ビタミンB2 4mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, アスコルビン酸83.3mg, アスコルビン酸ナトリウム83.3mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス粉末96mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg	肝機能異常	2
総合感冒剤	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg, アンブロキシソール塩酸塩15mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg, 無水カフェイン25mg, チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)8mg, リボフラビン(ビタミンB2)4mg, アスコルビン酸(ビタミンC)166.7mg	アナフィラキシー様反応	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg), アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg, ビタミンB2 4mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	肝障害	1
		間質性肺疾患	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	呼吸抑制	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	3包(2.15g)中顆粒(アセトアミノフェン630mg, エテンザミド450mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 塩酸トリプロリジン3.6mg, ヒベンズ酸チペジン50mg, 無水カフェイン90mg), 丸剤9丸[ゴオウ6mg, 胆黄2号20mg, ニンジン乾燥エキス-A 60mg(ニンジン600mg)]	急性肝炎	1
総合感冒剤	1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg, グリシン60mg, ケイヒ末50mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	アナフィラキシー反応	1
		肝障害	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
総合感冒剤	9錠アセトアミノフェン900mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, グアイフェネシン240mg, 臭化水素酸デキストロトルファン48mg, ペンフォチアミン24mg, 無水カフェイン90mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩酸クロペラスチン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 甘草エキス末117mg	喘息	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	1
		間質性腎炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	1
		紅斑	1
		白血球数減少	1
		鼻閉	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	異常行動	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	白血球減少症	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(カ価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	2
		肝機能異常	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン270mg, エテンザミド1.05g, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, アスコルビン酸カルシウム500mg	中毒性表皮壊死融解症	1
		発疹	1
総合感冒剤	9錠中 アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	感情不安定	1
		衝動行為	1
		抑うつ気分	1
総合感冒剤	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペピジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン(ビタミンB1)12mg, リボフラビン(ビタミンB2)6mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロムヘキシシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチンとして1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩化メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン450mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, グアイフェネシン250mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン40mg	アナフィラキシーショック	1
		ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1
総合感冒剤	白色錠(4錠中)イブプロフェン300mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.89mg(0.67mg), 塩酸プロムヘキシシン8mg, リン酸ジヒドロコデイン14.67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン50mg 青色錠(2錠中)イブプロフェン150mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.45mg(0.33mg), 塩酸プロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン7.33mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	6カプセル中 アセトアミノフェン900mg, ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 塩酸ノスカピン48mg, グアイフェネシン150mg, 無水カフェイン75mg	黄疸	1
		薬疹	2
総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ5mg, ナンテンジツ乾燥エキス180mg, アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, ノスカピン48mg, 無水カフェイン150mg	アナフィラキシーショック	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	60mL中アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, キキョウ流エキス1mL(キキョウ1g), セネガ流エキス0.3mL(セネガ300mg), 無水カフェイン25mg	痙攣	1
眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム1%, マレイン酸クロルフェニラミン0.015%	アナフィラキシー反応	1
耳鼻科用剤	1日量(6錠中) d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 塩酸プソイドエフェドリン180mg, 塩化リゾチーム75mg, 無水カフェイン120mg	意識変容状態	1
耳鼻科用剤	2カプセル中 ケトチフェンマル酸塩2.76mg	傾眠	1
		喀血	1
		痙攣	1
耳鼻科用剤	4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン120mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン100mg, 塩化リゾチーム60mg(カ価)	アナフィラキシー反応	1
		意識変容状態	1
		急性汎発性発疹性膿疱症	1
耳鼻科用剤	3カプセル中塩酸プソイドエフェドリン90mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン120mg, 塩化リゾチーム60mg(カ価)	中毒性皮疹	1
耳鼻科用剤	100mL中 ケトチフェンマル酸塩75.6mg	意識レベルの低下	1
		紅斑性皮疹	1
血圧降下剤	3包(6g)中ケツメイシ末2.37g, トウキ末・センキュウ末・タクシャ末各0.3g, ブクリヨウ末・ビャクジュツ末・ヨクイニン末各0.22g, モッコウ末・コウカ末各0.15g, シャクヤク末・セキイ末0.89g	肝障害	1
健胃消化剤	4包(12g)中ガジュツ末1000mg, 真昆布末400mg	アナフィラキシー反応	1
健胃消化剤	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	アナフィラキシー様反応	1
下剤、浣腸剤	1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg)	低カリウム血症	1
		肺炎	1
下剤、浣腸剤	1錠中ピサコジル5mg, センノサイドカルシウム5mg, ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)10mg	腸閉塞	1
複合胃腸剤	3包中L-グルタミン405mg, アルジオキサ150mg, カンゾウ末225mg, ケイヒ末435mg, ニンジン末225mg, 炭酸水素ナトリウム1.8g, 炭酸マグネシウム450mg, 沈降炭酸カルシウム240mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム240mg, ロートエキス30mg, ピオチアスターゼ200090mg, プロザイム615mg, リパーゼAP660mg	劇症肝炎	1
複合胃腸剤	1個(1.75g)中酢酸プレドニゾロン1mg, リドカイン60mg, アラントイン20mg, 酢酸トコフェロール50mg	多形紅斑	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
外皮用殺菌消毒剤	0.3m2中ヨードホルム1.1g	昏睡	1
		治療薬毒性	1
鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤	100g中ブフェキサマク1g, グリチルレチン酸0.2g	接触性皮膚炎	1
鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤	1g中プレドニゾン2.5mg, グリチルレチン酸5mg, クロタミン50mg, ジブカイン2.5mg, 塩酸クロルヘキシジン2.5mg	接触性皮膚炎	1
その他の歯科口腔用薬	100mL中ヨウ素0.5g	アナフィラキシーショック	1
		急性呼吸不全	1
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	2錠中リン酸リポフラビンナトリウム38mg, 塩酸ピリドキシン24mg, 硝酸チアミン20mg, ニコチン酸アミド40mg, アスコルビン酸カルシウム125mg(アスコルビン酸103mg)	アナフィラキシーショック	1
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	4錠中ニンジンエキス180mg(ニンジン600mg), ビタミンE散20mg(酢酸トコフェロール10mg), ビスベンチアミン20mg, リポフラビン10mg, 塩酸ピリドキシン20mg, シアノコバラミン20μg, ニコチン酸アミド20mg, パントテン酸カルシウムS 30.8mg(パントテン酸カルシウム20mg), オキソアミチン末20mg	劇症肝炎	1
その他の滋養強壮薬	2mL中塩酸チアミン20mg, シアノコバラミン2μg, 肝臓分解エキス100mg, ニンニク抽出液1.73mL	血圧上昇	1
		血中ブドウ糖増加	1
		上腹部痛	1
		振戦	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		発熱	1
総合代謝性製剤	1瓶(20mL)中カンゾウエキス300mg, 塩酸ピリドキシン5mg, オロチン酸コリン35mg, パンテノール20mg, アミノエチルスルホン酸200mg	偽アルドステロン症	1
他に分類されない代謝性医薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	全身性皮疹	1
他に分類されない代謝性医薬品	3包(6g)中サイコ末・チヨレイ末・タクシャ末各0.86g, ハンゲ末・ショウキョウ末・カンゾウ末・ショウマ末・ダイオウ末・シャクヤク末・ケイヒ末・ボタンピ末各0.43g	肝障害	1
		発疹	1
その他のアレルギー用薬	2カプセル中 フマル酸ケトチフェン2.76mg	下痢	1
		過敏症	1
		傾眠	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血尿	1
		倦怠感	1
		多形紅斑	1
		頻尿	1

薬効	成分名	副作用名	報告件数
漢方製剤	2包(3.75g)中乾燥エキス2.0g(日局タクシャ1.5g, 日局チヨレイ1.5g, 日局ブクリヨウ1.5g, アキョウ1.5g, カッセキ1.5g)	肝機能異常	1
漢方製剤	12錠中防風通聖散料エキス粉末2850mg(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.0g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5g)	肝障害	1
		間質性肺疾患	1
漢方製剤	12錠中 トウキ0.6g, シャクヤク0.6g, センキュウ0.6g, サンシシ0.6g, レンギョウ0.6g, ハッカ0.6g, ショウキョウ0.2g, ケイガイ0.6g, ポウフウ0.6g, マオウ0.6g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ビャクジュツ1.0g, キキョウ1.0g, オウゴン1.0g, カンゾウ1.0g, セッコウ1.0g, カッセキ1.5g	肝機能異常	1
漢方製剤	12錠中八味地黄丸料エキス粉末M2600mg(ジオウ2.5g, サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリヨウ・ポタンピ各1.5g, ケイヒ・ブシ末各0.5g)	筋力低下	1
		低カリウム血症	1
漢方製剤	3錠 防風通聖散料乾燥エキス3.0g (キキョウ 1.2g, ビャクジュツ 1.2g, カンゾウ 1.2g, オウゴン 1.2g, セッコウ 1.2g, ダイオウ 0.9g, トウキ 0.72g, シャクヤク 0.72g, センキュウ 0.72g, サンシシ 0.72g, レンギョウ 0.72g, ハッカ 0.72g, ケイガイ 0.72g, ポウフウ 0.72g, マオウ 0.72g, ショウキョウ 0.24g, カッセキ 1.8g, ポウショウ 0.9g)	肝障害	1
漢方製剤	12錠中防風通聖散料乾燥エキス2.50g(<原生薬換算量>トウキ0.60g, マオウ0.60g, シャクヤク0.60g, ダイオウ0.75g, センキュウ0.60g, ビャクジュツ1.00g, サンシシ0.60g, キキョウ1.00g, レンギョウ0.60g, オウゴン1.00g, ハッカ0.60g, カンゾウ1.00g, ショウキョウ0.15g, セッコウ1.00g, ケイガイ0.60g, カッセキ1.50g, ポウフウ0.60g, 硫酸ナトリウム十水塩0.75g)	肝機能異常	5
		膀胱の良性新生物	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	3包(4.5g)中痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g, キョウニン・カンゾウ各0.5g, ヨクイニン1.3g, ポウイ2g, 動物胆0.1g), マオウ0.6g, ヨクイニン末1.4g, カンゾウ末0.4g, ポウイ末1.6g	急性肝炎	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンポウイ8g	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	20丸中ジオウ0.3g, ゴシツ・オウバク・ソウジュツ・シャクヤク・オウギ・ゴミシ・ニンジン・ビャクジュツ・サンヤク・クコシ・トウキ・トチュウ・ホコツシ・トシシ・ホウブシ・キバン各0.2g, ポウイ・ポウフウ・キョウカツ各0.1g	肝機能異常	1

薬効	成分名	副作用名	報告 件数
他に分類されない治療を主 目的としない医薬品	1枚(20cm ²)中ニコチン35mg	アナフィラキシー様反応	1
		アレルギー性皮膚炎	1
		ショック	1
		そう痒症	1
		眼瞼浮腫	1
		顔面腫脹	1
		血圧低下	1
		倦怠感	1
		幻覚	1
		呼吸困難	1
		収縮期血圧低下	1
		心筋梗塞	1
		体位性めまい	1
		低血圧	1
		適用部位そう痒感	1
		適用部位紅斑	1
		適用部位小水疱	1
		適用部位発疹	1
		適用部位皮膚炎	1
		動悸	1
浮動性めまい	1		
末梢性浮腫	1		
無力症	1		
薬疹	1		
薬物過敏症	1		