

					エナント酸テストステロン	2461	注-1	注射薬	1回100mg、7～10日間ごとに又は1回250mg、2～4週間ごとに筋注	局方、★再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血
前立腺肥大症	前立腺重量抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	オキサンドロン	2479	注-1	注射薬	軽症には週1回200mg、中等症以上には週400mg1～2回で殿筋注	
					カブロン酸ゲストノロン	2479	注-1	注射薬	1週1回200mg殿筋注	
視床下部性腺機能低下症	ゴナドトロピン分泌促進作用	下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH-RH)	酢酸ゴナドレリン	249、722	注-1	注射薬	1日12回(2時間間隔)皮下注	★下垂体LH分泌機能検査
中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体down regulation)		ペプチド(LH-RH誘導体)	酢酸リュープロレリン	249	注-1	注射用(徐放製剤)	4週1回30ug/kg皮下注	★子宮内膜炎、子宮筋腫。閉経前乳癌、前立腺癌(3.75注のみ)
更年期障害、乳汁分泌不全	細胞呼吸促進作用／創傷治癒促進作用				胎盤抽出物	325	注-1	注射薬	1日1回、毎日又は隔日皮下注	
更年期障害	ホルモン補充作用	卵胞ホルモン作用＋アンドロゲン作用		配合剤	エストラジオール／テストステロン(1)	2481	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	
					エストラジオール／テストステロン(2)	2481	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	★骨粗鬆症
					エストラジオール／テストステロン	2481	注-1	注射薬	1日1回又は隔日に1回1～2mL、筋注又は皮下注	
					甘草酸エストラジオール／エナント酸テストステロン	2481	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	★卵巣欠落症状、骨粗鬆症
無月経	ホルモン補充作用	黄体ホルモン作用＋卵胞ホルモン作用		配合剤	プロゲステロン／安息香酸エストラジオール	2482	注-1	注射薬	1日1回1mL筋注	
					カブロン酸ヒドロキシプロゲステロン／プロピオン酸エストラジオール	2482	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	★機能性子宮出血
機能性子宮出血	止血作用	毛細血管相織強化作用		ステロイド	結合型エストロゲン	2479、3329	注-1	注射薬	1回20mg、小児5～10mg静注又は筋注	★術中・前後の出血、鼻出血
	ホルモン補充作用	黄体ホルモン作用＋卵胞ホルモン作用		配合剤	カブロン酸ヒドロキシプロゲステロン／安息香酸エストラジオール(2)	2482	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き			
2	ホルモン・抗ホルモン剤	卵巣機能低下	卵胞ホルモン作用			ステロイド(エストロジオール系)	安患香酸エストラジオール	2473	注-1	注射薬(懸濁)	1回 0.1~5mg、隔日又は毎日1回筋注又は皮下注	局方、★乳汁分泌抑制				
							プロピオン酸エストラジオール	2473	注-1	注射薬(油性)	1回 1~10mg、1週~1カ月ごとに筋注					
							吉草酸エストラジオール	2473	注-1	注射薬	1回 5~10mg、1~4週間ごとに筋注					
						ステロイド(エストリオール系)	安患香酸酢酸エストリオール	2475	注-1	注射薬(油性)	1回 5~10mg、1~2週間ごとに筋注					
							トリプロピオン酸エストリオール	2475	注-1	注射薬	1回 5~10mg、7~10日ごとに皮下又は筋注					
							エストリオール	2475	注-1	注射薬(懸濁)	1回 5~10mg、7~10日ごとに皮下又は筋注					
						ステロイド(エストロゲン前駆体)	プラステロン硫酸ナトリウム	2459	注-1	注射薬	1回 100~200mg、週2~3回静注	★妊娠末期子宮頸管熟化不全				
		月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン作用				ステロイド(プロゲステロン系)	プロゲステロン	2477	注-1	注射薬	1日10~50mg、1~2回に分け筋注	局方			
						カブロン酸ヒドロキシプロゲステロン		2477	注-1	注射薬	1週1回65~125mg筋注					
		乳腺症、女性化乳房	エストロゲン受容体拮抗作用				ステロイド	エピチオスタノール	249	注-1	注射薬	1回10mg週1回4~8週間筋注				
		排卵誘発	卵胞成熟作用	卵胞ホルモン作用			ペプチド	下垂体性性腺刺激ホルモン	2413	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75~150IUを連続筋注				
								精製下垂体性性腺刺激ホルモン	2413	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75~150IUを連続皮下注又は筋注				
							卵胞ホルモン作用/黄体形成ホルモン作用	黄体形成ホルモン作用		ペプチド	注射用血清性性腺刺激ホルモン	2413	注-1	注射薬	1日1回1000~3000単位、連日3~10日間筋注	局方、★男子不妊症
											注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	2413	注-1	注射薬	1日3000~5000単位を筋注	局方、★思春期遅発症、停留嚢丸、男子性腺機能不全症 ★嚢丸・卵巣機能検査
子宮内膜症	下垂体反応性低下作用/ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体受容体刺激作用			ペプチド(LH-RH誘導体)	酢酸リュープロレリン	249	注-1	注射薬(徐放製剤)	4週に1回 皮下注	★子宮筋腫、★中枢性思春期早発症(ハイアル)、★閉経前乳癌、前立腺癌(3.75注のみ)					
							249	注-2	キット(徐放製剤)	4週に1回 皮下注	★閉経前乳癌、前立腺癌(3.75キットのみ)					
						酢酸ブセレリン	249	注-2	キット	4週に1回 皮下投与						
						酢酸ゴセレリン	249	注-2	キット(徐放製剤)	4週ごとに前腹部皮下投与	★前立腺がん、閉経前乳がん(3.6mgのみ)					
末梢循環障害	循環改善作用	キニンノーゲン分解作用/キニン遊離作用		糖蛋白	カリジノゲナーゼ	249	注-1	注射薬	1日1回筋注							

											注射液	重症の循環障害に1回40IUを添付の溶解液に溶解し、毎日又は隔日に筋注	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------------------------------	--

241-249 ホルモン・抗ホルモン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形 区分	剤形	用法	備考	線引き
3	ホルモン・抗 ホルモン剤	中枢性尿崩症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン; バソプレシン様(腎 尿細管水再吸収促 進)作用		ペプチド(バソプレシ ン誘導体)	酢酸デスマプレシ ン	2419	外-2	噴霧剤 (点鼻液)	1日1~2回鼻 腔内に投与		
		夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン; バソプレシン様(腎 尿細管水再吸収促 進)作用		ペプチド(バソプレシ ン誘導体)	酢酸デスマプレシ ン	2419	外-2	噴霧剤 (鼻腔内)	1日1~2回鼻 腔内に投与		
		局所出血、鼻粘膜の充血、局 所麻酔薬の作用延長、気管支 けいれん	末梢血管収縮/ 気管支拡張作用	交感神経 α , β 受容 体刺激作用		カテコールアミン	エピネフリン	2451	外-1	液剤	希釈し吸入、直 接塗布、点鼻 など	局方	
		中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分 泌抑制作用	持続的下垂体前葉 刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導 体)	酢酸ブセレリン	2499	外-2	噴霧剤 (鼻腔内)	1日3~6回	★子宮内 膜炎、子宮 筋腫	
		更年期障害、卵巣欠落症状(ホ ルモン補充療法)	卵胞ホルモン補 充作用	ステロイドレセプター結 合作用/特異的蛋 白生成促進作用		ステロイド	エストラジオール	2473	外-5	貼付剤	1枚を下腹部、 背部のいずれ かに貼付、2日 ごとにはりかえ る 1枚を下腹部、 殿部のいずれ かに貼付、2日 ごとにはりかえ る 4.33mgを3~4 日ごとに1回 (週2回)下腹 部に貼付		
		子宮内膜炎、子宮筋腫	ゴナドトロピン分 泌抑制作用	持続的下垂体前葉 刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導 体)	酢酸ブセレリン	2499	外-2	噴霧剤 (鼻腔内)	月経周期1~2 日目から1日3 回	★中枢性思 春期早発症	
							酢酸ナファレリン	2499	外-2	噴霧剤 (鼻腔内)	月経周期1~2 日目から1日2 回		
		妊娠末期子宮頸管熟化不全	エストラジオー ル補充作用	ステロイドレセプター結 合作用/特異的蛋 白生成促進作用		ステロイド(エストラジオー ル前駆体)	プラステロン硫酸ナトリ ウム	2459	外-6	腔坐剤	1日1回、週2 回腔深部に挿 入		

251 泌尿器用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
1	泌尿器用剤	前立腺肥大に伴う排尿障害	前立腺肥大の腺組織・周囲組織の浮腫性腫脹の消退			配合剤	グルタミン酸/アラニン/アミノ酢酸	251	内-1	カプセル剤	1日3回				
			前立腺腫縮合組織膨腫改善作用+膀胱頸部周辺のうっ血・炎症消退作用+膀胱排尿筋収縮力増強作用			配合剤	オオウメガサソウエキス/ハコヤナギエキス/セイヨウオキナグサエキス/スギナエキス/コムギ胚芽油(1)	259	内-1	錠剤	1日3回				
			前立腺に対する消炎作用				セルニチンポーレンエキス	259	内-1	錠剤	1日2~3回	★慢性前立腺炎			
			α1受容体遮断作用				塩酸タムスロシン	259	内-1	カプセル剤	1日1回				
							ナフトピジル	259	内-1	錠剤	1日1回				
							ウラピジル	214,259	内-1	カプセル剤	1日2回	★本態性高血圧症、腎性高血圧症、褐色細胞腫による高血圧症			
		神経因性膀胱、不安定膀胱における頻尿・尿失禁 / 神経性頻尿、慢性前立腺炎・慢性膀胱炎に伴う頻尿・残尿感	膀胱平滑筋弛緩作用(抗ムスカリン作用)/膀胱運動抑制作用				塩酸オキシブチニン	259	内-1	錠剤	1日3回	★原意切迫感			
			膀胱平滑筋弛緩作用(平滑筋直接作用、抗コリン作用)/排尿運動抑制作用			ベンジル酸誘導体	塩酸プロピベリン	259	内-1	錠剤	1日1回				
			膀胱平滑筋弛緩作用/膀胱充滿時律動収縮抑制作用				塩酸フラボキサート	259	内-1 内-2	錠剤 顆粒	1日3回 1日3回				
		腹圧性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(β2受容体刺激作用)/尿道括約筋収縮作用				塩酸クレンブテロール	225,259	内-1 内-2	錠剤 顆粒	1日2回 1日2回	★気管支喘息、慢性気管支炎、肺炎腫、急性気管支炎の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難などの症状の緩解			
				尿路結石	尿路結石生成の要因を抑制+排泄促進及び症状の緩解			配合剤	ピネン/カンフェン	251	内-1	カプセル剤	1日3~4回		
												ウラジロガシエキス	259	内-1	カプセル剤
3	泌尿器用剤	前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手術時、その他泌尿器科手術時並びに術後の洗浄	尿道、膀胱の開存性の維持/内視鏡視野の確保/切除組織片・血液の除去				ローソルピトール	251	外-1	液剤(灌流)	手術など必要に応じて適量増減				
							配合剤	ローソルピトール/ローマンニトール	251	外-1	液剤	経尿道的に膀胱及び尿道を洗浄			

252 生殖器官用剤

内注外区分	分類名	主たる効能	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
3	生殖器官用剤	非特異性膣炎	自浄作用回復作用／ 膣粘膜細胞角化促進作用／ 炎症に対する膣抵抗増強作用				エストリオール	252	外-6	錠剤	1日1回0.5～1mg、膣内挿入	★子宮頸管炎、子宮膣部びらん			
							クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	252	外-6	錠剤	1日1回			
		ガンジダ起因膣炎、 外因膣炎	細胞質膜変性作用		細胞膜合成阻害作用			マクロライド系	ピマリシン	252	外-1	軟膏剤	1日数回塗布	★外陰膣カンジダ症、 次の皮膚カンジダ症： カンジダ性爪周囲炎、 カンジダ性指 間びらん症、 カンジダ性間擦疹、 乳児寄生菌性紅斑	
								アゾール系	クロトリマゾール	252	外-6	錠剤	1日1回、膣深部に挿入	★カンジダに起因する膣炎、 外陰膣炎	
								イミダゾール系	硝酸エコナゾール	252	外-6	膣坐剤	1日1回50mg、膣深部に挿入		
									硝酸オキシコナゾール	252	外-6	錠剤	1日1個、膣深部に挿入、 1日1回600mg 6日間継続		
									硝酸ミコナゾール	252	外-6	膣坐剤	1日1回1個、膣深部に挿入	★ガンジダに起因する膣炎、 外陰膣炎	
									硝酸イソコナゾール	252	外-6	錠剤	1日1個100mg、膣深部に挿入 6日間継続		
								ポリエーテル系	トリコマイシン	252	外-6	錠剤		経過措置	
								トリコモナス膣炎	抗原虫作用					チニダゾール	252
		メトロニダゾール	252	外-6	錠剤	1クールとして1日1回250mg、10～14日間膣内に挿入									

253 子宮収縮剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分名	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療(胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊娠中絶)	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血量減少作用(胎盤娩出期短縮)				マレイン酸メチルエルゴメトリン	253	内-1	錠剤	1日2~4回	局方	
		妊娠末期における陣痛誘発並びに陣痛促進	子宮頸管熟化作用／子宮収縮作用／分娩誘発作用			プロスタグランジンE2誘導体	ジノプロストン	249	内-1	錠剤	1時間ごとに6回		
							ジノプロストンベータデクス	249	内-1	錠剤	1時間ごとに6回		
2	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療(胎盤娩出前後、弛緩出血、子宮復古不全、帝王切開術、流産、人工妊娠中絶)	子宮平滑筋選択的収縮作用／出血量減少作用(胎盤娩出期短縮)				マレイン酸エルゴメトリン	253	注-1	注射薬	1回0.2mg、皮下注、筋注又は静注	局方	
							マレイン酸メチルエルゴメトリン	253	注-1	注射薬	1回0.1~0.2mg静注、又は1回0.2mg皮下注、筋注		
		子宮収縮の誘発、促進並びに子宮出血の治療(分娩誘発、微弱陣痛、弛緩出血、胎盤娩出前後、子宮復古不全、帝王切開術、流産、人工妊娠中絶)				ペプチド	オキシトシン	2414	注-1	注射薬	点滴静注	局方	
		分娩後の子宮弛緩、産褥時の出血	子宮収縮作用			プロスタグランジンF2α誘導体	ジノプロスト	249	注-1	注射薬	1回緩徐に静注		
		妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進、卵膜外投与(治療的流産)	子宮収縮作用／分娩誘発作用			プロスタグランジンF2α誘導体	ジノプロスト	249	注-1	注射薬	点滴静注／持続静注	★腸管ぜん動運動亢進	
						ジノプロストロメタミン	249	注-1	注射薬	静脈内に点滴又は持続注入			
3	子宮収縮剤	妊娠中期の治療的流産	子宮収縮作用／子宮頸管拡大作用			プロスタグランジンE1誘導体	ゲメプロスト	249	外-6	坐剤	3時間ごとに挿入		

255 痔疾用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	痔疾用剤	痔核の症状の緩解	血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作用／創傷治癒促進作用				トリベノシド	255	内-1	カプセル剤	1日3回		
			循環機能調節作用／線維素溶解作用／抗炎症抗浮腫作用／組織修復作用				静脈血管叢エキス(雑食動物)	255	内-1	舌下錠	1日3回		
			肉芽形成促進作用／消炎、鎮痛作用				メリロートエキス	255	内-1	錠剤	1日75～300mg、3回で	★外傷・手術に伴う軟部腫脹の緩解	
			血栓器質化作用＋緩下作用			配合剤	パラフレボン／センナ末	255	内-1	錠剤	1日3回		
			消炎作用／抗浮腫作用＋血管壁透過性抑制作用／末梢循環促進作用／抗凝血作用／組織修復促進作用			配合剤	プロメライン／酢酸トコフェロール	255	内-1	錠剤	1日3～4回		
			血管拡張と血流量増大作用／抗炎症作用＋血管壁脆弱性改善作用			配合剤	メリロートエキス／ルチン	255	内-1	錠剤	1日3～4回		
2	痔疾用剤	内痔核	上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作用／痔核の硬化萎縮作用				フェノール	255.261.732	注-1	注射薬	1回5mLを粘膜下に注射		
			炎症惹起作用／組織硬化作用／血流量減少作用			配合剤	硫酸アルミニウムカリウム／タンニン酸	255	注-1	注射薬	1つの痔核あたり2%溶液として9～10mL		
3	痔疾用剤	痔核・裂肛の症状の緩解	殺菌作用／局所の創傷治癒促進作用				大腸菌死菌	255	外-1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入		
			肉芽形成促進作用／抗炎症作用／抗菌作用＋鎮痛作用＋鎮痛作用＋抗ヒスタミン作用＋抗菌作用			配合剤	シコンエキス／アミノ安息香酸エチル／塩酸ジブカイン／塩酸ジフェンヒドラミン／セトリニド	255	外-1	軟膏剤	1日1～3回塗布		
									外-6	坐剤	1日1～3回肛門内に挿入		
									外-6	坐剤	1日1～3回肛門内に挿入		

	鎮痛作用+粘膜保護作用		配合剤	リドカイン/アミノ安息香酸エチル/次没食子酸ピスマス	255	外-6	坐剤	1日1個、1日1~3回肛門内に挿入	
	正常肉芽新生促進/消炎・鎮痛作用+鎮痛作用+殺菌作用		配合剤	エビジヒドロコレステリン/アミノ安息香酸エチル/スルファイソミジン	255	外-6	坐剤	1日1~3回肛門内に挿入	
	末梢血管収縮作用+局所収斂作用		配合剤	塩酸 2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)テトラヒドロ-1,4-オキサジン/乳酸アルミニ	255	外-6	坐剤	1日1~3回肛門内に挿入	
	局所感染防御作用/肉芽形成促進作用+抗炎症作用		配合剤	大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン	255	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日1~3回塗布又は注入 1日1~3回肛門内に挿入	
	抗炎症作用+殺菌作用+鎮痛作用+収斂、止血作用		配合剤	ヒドロコルチゾン/硫酸フラジオマイシン/塩酸ジブカイン/エスクロシド	255	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日1~3回塗布又は注入 1日1~3回、1回1個肛門内	
	抗炎症作用+鎮痛作用		配合剤	吉草酸ジフルコルトロン/リドカイン	255	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日2回肛門内に注入 1日2回肛門内に挿入	
	抗うっ血作用/血栓形成抑制作用/門脈血流量低下状態改善作用/浮腫抑制作用/血管透過性亢進抑制		配合剤	トリベノシド/リドカイン	255	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日2回 1日2回朝夕塗布又は注入	
肛門疾患における鎮痛・鎮痙、肛門のびらん・炎症	鎮けい作用/鎮痛作用+局所収斂作用/止血作用		配合剤	ロートエキス/タンニン酸	255	外-6	坐剤	1日1~3回肛門内に挿入	

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	その他の泌尿生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β2受容体刺激作用 ノオキシトシン誘発作用			塩酸リトドリン	259	内-1	錠剤	1日3回		
2	その他の泌尿生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋β2受容体刺激作用 ノオキシトシン誘発作用			塩酸リトドリン	259	注-1	注射薬	50mgを5%ブドウ糖注射液又は10%マルトース注射液500mLに希釈し、毎分50μgから点滴静注開始		

262 創傷保護剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
3	創傷保護剤	皮膚欠損創の創面保護等	創面保護作用/壊死組織進行抑制作用/肉芽組織新生促進作用			豚皮	滅菌凍結乾燥豚皮	2622	外-5	貼付剤			
						豚真皮	滅菌凍結乾燥豚真皮	2622	外-5	貼付剤			

263 化膿性疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
3	化膿性疾患用剤	膿皮症等/外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G+)に作用	蛋白合成阻害作用	マクロライド系	エリスロマイシン	2634	外-1	軟膏剤		★軟性下疳	
							フシジン酸ナトリウム	2634	外-1	軟膏剤			
								外-5	貼付剤				
						アミノグリコシド系	硫酸フラジオマイシン	2634	外-1	軟膏剤			
								外-5	散剤	外傷等の二次感染/予防のみ			
						外-5	貼付剤		外傷等の二次感染/予防のみ				
							散剤						
						配合剤	硫酸フラジオマイシン/トリアシン	2639	外-1	散剤			
						配合剤	硫酸フラジオマイシン/トリアシン	2639	外-1	散剤			
						配合剤	スルファジアジン	2633	外-1	軟膏剤			
						配合剤	塩酸テトラサイクリン	2634	外-1	軟膏剤		局方	
						配合剤	テトラサイクリン	2634	外-1	末剤		局方	
配合剤	クロラムフェニコール	2634	外-1	軟膏剤		局方							
配合剤	液剤												
配合剤	アミノグリコシド系	硫酸カナマイシン	2634	外-1	軟膏剤	膿瘍等のみ							
			2634	外-2	噴霧剤	外傷等による二次感染のみ							
配合剤	硫酸ゲンタマイシン	2634	外-1	軟膏剤									
配合剤	クリーム剤												
配合剤	硫酸ストレプトマイシン/塩酸ゲラミジンS	2639	外-1	軟膏剤									
配合剤	クロラムフェニコール/硫酸フラジオマイシン/プレドニゾン	2639	外-1	軟膏剤									
配合剤	バンシリン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-1	散剤		膿臭症							
配合剤	軟膏剤												
配合剤	細胞膜機能障害作用+蛋白合成阻害作用	配合剤	硫酸コリスチン/硫酸フラジオマイシン	2639	外-2	噴霧剤							
				2639	外-1	軟膏剤							
配合剤	硫酸ポリミキシンB/塩酸オキシテトラサイクリン	2634	外-1	末剤		局方★副鼻腔炎、膀胱炎等							
配合剤	ホリヘパド系	硫酸ポリミキシンB	2634	外-1	末剤								
配合剤	スルファジアジン銀	2633	外-1	クリーム剤									
配合剤	ヌーキノロン系	ナジフロキサシン	2639	外-1	クリーム剤								
配合剤	液剤												
配合剤	リンコマイシン系	リン酸クリンダマイシン	263	外-1	軟膏剤								
			2669	外-1	液剤	局方							
配合剤	イオウ+カンフル	2669	外-1	液剤									
配合剤	皮膚軟化/殺菌作用+鎮痛/消炎作用	角質-SH基縮合作用											

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き	
3	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	湿疹、皮膚炎群等	抗炎症/鎮痛/鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	プロピオン酸クロベタゾール	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬	主として頭部	
							酢酸ジフロラゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬		
							(very strong)	ステロイド	ジプロピオン酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬
									ジフルプレドナート	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬
									吉草酸ジフルコルトロン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~3回	乾癬
									フルオシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~3回	乾癬
									アムシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
									ブデメニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
									酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬
									酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
					フランカルボン酸モメタゾン	2646			外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬		
					プロピオン酸デキサメタゾン	2646			外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬		
					(strong)	ステロイド	ハルシノニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~3回	乾癬		
							吉草酸ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1~数回	乾癬		
							プロピオン酸ベクロメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	乾癬		
							吉草酸デキサメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬		
							吉草酸酢酸プレドニゾロン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬		
							フルオシノロンアセトニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1~数回	乾癬		

					外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤	12か24時間ごと 貼りかえ		
					2646	外-1 外-5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1~数回 12か24時間ごと 貼りかえ	乾癬
		(medium)	ステロイド	トリアムシロンアセトニド	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2~3回	乾癬
				ピバル酸フルメタゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
				酪酸ヒドロコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
				酪酸クロベタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				プロピオン酸アルクロメタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
		(weak)	ステロイド	デキサメタゾン	2646	外-1 外-2	軟膏剤 噴霧剤	1日2~3回	乾癬
				プレドニゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	
				酢酸ヒドロコルチゾン	2646	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2~3回	乾癬
				フルドロキシコルチド	2646	外-5	貼付剤	12か24時間ごと 貼りかえ	乾癬
				ベタメタゾン	2646	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
		(weak)	配合剤	デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
				デキサメタゾン/グリチルレチン酸	2649	外-1	クリーム剤	1日1~数回	
				酢酸ヒドロコルチゾン/グリチルレチン酸	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
	鎮痒作用	温覚刺激作用		クロタミトン	2649	外-1	軟膏剤		
		温覚刺激作用+ステロイド受容体と結合		配合剤	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等	プロピオン酸系	イブプロフェンピコノール	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回、帯状疱疹:1日1~2回。	帯状疱疹
				スプロフェン	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回、帯状疱疹:1日1~2回。	帯状疱疹
			アントラニル酸系	ウフェナマート	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	帯状疱疹
			非ステロイド	ブフェキサマク	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	局方、帯状疱疹
				グリチルレチン酸	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	
				塩酸イソチベンジル	2642	外-1	ゼリー	1日数回	
	抗炎症作用	抗ヒスタミン作用	ジフェンヒラミン系	ジフェンヒドラミン	2642	外-1	軟膏剤 液剤	1日数回	
				ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	2642	外-1	軟膏剤	1日数回	
		抗ヒスタミン作用+血管透過性亢進抑制作用	配合剤	ジフェンヒドラミン/脱脂大豆乾留タール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
	防腐/消毒/鎮痒作用+収斂/保護作用		配合剤	フェノール/亜鉛華リニメント	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)	局所感染防御/肉芽形成促進/抗炎症作用			混合死菌製剤	2649	外-1	軟膏剤		感染性湿疹様皮膚炎、湿疹様膿疱
	抗炎症/鎮痛/鎮痒作用+抗菌作用	ステロイド受容体と結合+蛋白合成阻害作用	(strong)	配合剤	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
				フルオシノロンアセトニド/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~数回	乾癬
				甘草酸ベタメタゾン/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤 液剤	1日1~数回	乾癬

			(medium)	配合剤	トリアムシ/ロンアセトニド/フラジオマイシン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	乾癬
					酢酸ヒドロコルチゾン/塩酸テトラサイクリン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					酢酸ヒドロコルチゾン/ジフェンヒドラミン/フラジオマイシン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					ヒドロコルチゾン/塩酸オキシテトラサイクリン	2647	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					プレドニゾン/硫酸フラジオマイシン	2647	外-2	噴霧剤	1日1~数回	
アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制/肥満細胞・好酸球脱粒抑制/抗原提示能抑制作用			タクロリムス水和物	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回	0.1%、0.03%外用
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用			ビタミンA油	2649	外-1	軟膏剤	1日2~3回	
	保護作用+皮膚血行促進作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進+微小循環系賦活作用		配合剤	ビタミンA/トコフェロール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	凍瘡他
	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合		活性型VD ₃	タカルシトール	2691	外-1	軟膏剤	1日1~2回	20μg/gは尋常性乾癬のみ
					カルシポトリオール	2691	外-1	軟膏剤	1日2回	尋常性乾癬のみ
					マキサカルシトール	269	外-1	軟膏剤	1日2回	
皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	2649	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	*267発毛促進
					トウガラシチンキ	2649	外-1	液剤	1日1~数回	局方、*267育毛
湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用				カラミン	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
	収斂/消炎/保護/防腐作用			無機塩類	酸化亜鉛	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
					硫酸亜鉛	2649	外-1	末剤		局方
					塩化亜鉛	2649	外-1	末剤		局方
					硫酸アルミニウムカリウム	2649	外-1	末剤	希釈塗布	局方
				配合剤	酸化亜鉛/豚脂	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
					亜鉛華	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
							外-5	貼付剤		
					アクリノール/チンク油	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	局方
					亜鉛華デンプン	2649	外-1	末剤	1日1~数回	局方
皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				タンニン酸	2649	外-1	末剤		局方、*261殺菌
	局所刺激作用			過酸化物系	過マンガン酸カリウム	2614	外-1	末剤		
筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症/鎮痛作用	プロスタグランジン生成阻害作用等		アリール酢酸系	インドメタシン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							外-5	クリーム剤 液剤 貼付剤	1日2回	
				プロピオン酸系	ケトプロフェン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
							外-5	クリーム剤 液剤 ゲル 貼付剤	1日1回、2回	
					フルルビプロフェン	2649	外-5	貼付剤	1日2回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
				オキシカム系	ピロキシカム	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
								クリーム剤		

			アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	2649	外-1	ゲル	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
				フェルピナク	2649	外-1	軟膏剤	1日数回	変形性関節症等の消炎・鎮痛
						外-5	クリーム剤 液剤 貼付剤	1日2回	
			配合剤	サリチル酸メチル	2641	外-1	液剤	局所塗布	
				サリチル酸メチル/グリチルレチン	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				サリチル酸メチル/ジフェンヒドラミン	2649	外-1 外-2	軟膏剤 噴霧剤	1日1~数回	
				サリチル酸メチル/メントール	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				サリチル酸メチル/カンフル/ハッカ油/ユーカリ油	2649	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
				サリチル酸メチル/メントール/カンフル/ジフェンヒドラミン等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
				サリチル酸グリコール/メントール	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
				サリチル酸メチル/メントール/カンフル/チモール/トウガラシエキス/ジフェンヒドラミン等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
				サリチル酸メチル/メントール/カンフル/ジフェンヒドラミン/ハッカ油/ニル酸ワニルアミド	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
				サリチル酸グリコール/ニル酸ワニルアミド/カンフル等	2649	外-5	貼付剤	1日1~2回	
		局所血管拡張作用		カンフル	2645	外-1	液剤	塗布又は塗擦	
				d-カンフル	2645	外-1	末剤	塗布又は塗擦	局方
				dl-カンフル	2645	外-1	末剤	塗布又は塗擦	
外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症/鎮痛/血流量増加作用等			ヘパリン類似物質	2649	外-1	ゲル	1日1~数回	
					3334	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		
			配合剤	ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎エキス	2649	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 ゲル	1日1~数回	
外傷等の鎮痛	局所麻酔作用			アミノ安息香酸エチル	2649	外-1	軟膏剤	適宜	
表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮/局所保護作用			酢酸鉛	2644	外-1	末剤	湿布	