

農作物 (試験部位)	試験 圃場数	試験条件			最大残留量 (ppm) 【6-CNA法】(*)	
		剤形	使用量・使用方法	回数	経過日数	
いちご (果実)	9	21.4%フロアブル +17.4%フロアブル	0.375 lb ai/A(0.42 kg ai/ha)土壌灌注 +0.044 lb ai/A (0.05kg ai/ha)散布	1+3	7	圃場A: 0.349
					6	圃場B: 0.138
					7	圃場C: 0.210
					7	圃場D: 0.147
					7	圃場E: 0.316
					0, 4, 7, 14	圃場F: 0.126 (14日)
					6	圃場G: 0.167
					7	圃場H: 0.124
					7	圃場I: 0.166
ラズベリー (果実)	2	21.4%フロアブル	0.5 lb ai/A (0.56kg ai/ha) 土壌灌注又は処理	1	7, 14, 28, 42, 56	圃場A: <0.050 (7日)
					7, 14, 28, 42, 56	圃場B: <0.050 (7日)
クランベリー (果実)	5	21.4%フロアブル	0.5 lb ai/A (0.56kg ai/ha) 散布後、灌水により薬剤を土壌に移行	1	30, 46	圃場A: <0.050 (30日)
					28, 43	圃場B: <0.050 (28日)
					28, 43	圃場C: <0.050 (28日)
					28, 43	圃場D: <0.050 (28日)
					32, 45	圃場E: <0.050 (32日)
ブルーベリー (果実)	5	21.4%フロアブル	0.5 lb ai/A (0.56 kg ai/ha) 土壌表面散布	1	7, 14, 28, 32	圃場A: <0.05 (7日)
					7, 15	圃場B: <0.05 (7日)
					7, 14, 28, 35	圃場C: <0.05 (7日)
					7, 14	圃場D: <0.05 (7日)
					7, 14	圃場E: 0.09 (7日)
ブルーベリー (果実)	7	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A (0.11 kg ai/ha) 散布	5	3	圃場A: 0.49
					3	圃場B: 0.52
					3	圃場C: 0.38
					2	圃場D: 2.219
					2	圃場E: 2.802
					4	圃場F: 0.894
					0, 3, 10, 14	圃場G: 1.125 (3日)
ブラックベリー (果実)	3	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha) 散布	3	2	圃場A: 0.38 (#)
					4	圃場B: 0.69
					2	圃場C: 0.70 (#)
ラズベリー (果実)	4	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha) 散布	3	3	圃場A: 0.59
					3	圃場B: 0.96
					3	圃場C: 0.48
					3	圃場D: 0.49
マリオンベリー (果実)	1	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha) 散布	3	3	圃場A: 1.7
ボイゼンベリー (果実)	1	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha) 散布	3	3	圃場A: 1.5
パパイヤ (果実)	3	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha)散布	5	5	圃場A: 0.22
					0, 6, 14, 21	圃場B: 0.59 (14日)
					7	圃場C: 0.19
アボカド (果実)	5	21.4%フロアブル	0.5 lb ai/A(0.56 kg ai/ha) 土壌表面散布	1	60, 88, 116	圃場A: <0.050 (60日)
					60	圃場B: <0.050
					59	圃場C: <0.050
					69	圃場D: <0.050
					50	圃場E: <0.050
グアバ (果実)	4	17.4%フロアブル	0.1 lb ai/A(0.11 kg ai/ha) 散布	5	14	圃場A: 0.266
					14	圃場B: 0.126
					15	圃場C: 0.400
					15	圃場D: 0.304

農作物 (試験部位)	試験 圃場数	試験条件			最大残留量 (ppm) 【6-CNA法】(*)	
		剤形	使用量・使用方法	回数	経過日数	
ひまわり (種子)	4	40.7%フロアブル	16.8 oz ai/cwt(100ポンド種子)、 (5.25 g ai/kg種子) 種子塗沫	1	129	圃場A : <0.05 (#)
					141	圃場B : <0.05 (#)
					143	圃場C : <0.05 (#)
					119	圃場D : <0.05 (#)
ひまわり (種子)	2	40.7%フロアブル	84.0 oz ai/cwt(26.25 g ai/kg種子)、 種子塗沫	1	131	圃場A : <0.05 (#)
					143	圃場B : <0.05 (#)
綿実 (種子)	6	21.4%フロアブル +21.4%フロアブル +21.4%フロアブル	250g ai/100kg種子 (2.5 g ai/kg種子)、種 子塗沫 +4.3~4.8 oz ai/A (0.27~0.30 lb ai/A) (0.301~0.336kg ai/ha) 畝処理 +3.8 oz ai/A (0.24 lb ai/A) (0.266kg ai/ha) 散布	1+1+2	7, 14, 21	圃場A : 0.22 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場B : 0.41 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場C : 0.20 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場D : 2.32 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場E : 0.20 (14日) (#)
綿実 (種子)	3	21.4%フロアブル +2.5%粒剤 +21.4%フロアブル	250g ai/100kg種子 (2.5 g ai/kg種子)、種 子塗沫 +4.3~4.8 oz ai/A (0.27~0.30 lb ai/A) (0.301~0.336kg ai/ha) 畝処理 +3.8 oz ai/A (0.24 lb ai/A) (0.266kg ai/ha) 散布	1+1+2	7, 14, 21	圃場A : 0.18 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場B : 0.36 (14日) (#)
					7, 14, 21	圃場C : 0.17 (21日) (#)
綿実 (種子)	7	21.4%フロアブル +2.5%粒剤 +21.4%フロアブル	250g ai/100kg種子 (2.5 g ai/kg種子)、種 子塗沫 +4.3~4.8 oz ai/A (0.27~0.30 lb ai/A) (0.301~0.336kg ai/ha) 畝処理 +3.8 oz ai/A (0.24 lb ai/A) (0.266kg ai/ha) 散布	1+1+2	8, 15, 22	圃場A : 2.00 (22日) (#)
					7, 14, 21	圃場B : 0.19 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場C : 0.44 (14日) (#)
					7, 13, 21	圃場D : 0.55 (13日) (#)
					7, 14, 21	圃場E : 0.21 (21日) (#)
					7, 14, 21	圃場F : 0.55 (14日) (#)
綿実 (種子)	3	21.4%フロアブル +21.4%フロアブル +21.4%フロアブル	250g ai/100kg種子 (2.5 g ai/kg種子)、種 子塗沫 +0.03 g ai/m (条) 畝処理 +7.5 fl oz 製剤/A(0.1131kg ai/ha) 散布	1+1+2	20	圃場A : <1.00
					13	圃場B : <1.00
					14	圃場C : <1.00
なたね (種子)	6	40.7%フロアブル	16 oz ai/cwt(10 g ai/kg種子)、 種子塗沫	1	199	圃場A : <0.05
					288	圃場B : <0.05
					277	圃場C : <0.05
					129	圃場D : <0.05
					112	圃場E : <0.05
					146	圃場F : <0.05

農作物 (試験部位)	試験 圃場数	試験条件			最大残留量 (ppm) 【6-CNA法】(*)	
		剤形	使用量・使用方法	回数	経過日数	
ペカン (果実)	7	21.4%フロアブル	0.5 lb ai/A (0.56 kg ai/ha) 土壌処理	1	150	圃場A : <0.05
					150	圃場B : <0.05
					109	圃場C : <0.05
					127	圃場D : <0.05
					115	圃場E : <0.05
					102	圃場F : <0.05
					99	圃場G : <0.05
ペカン (果実)	6	21.4%フロアブル	0.17 lb ai/A (0.19 kg ai/ha) 散布	2	31	圃場A : <0.05
					20	圃場B : <0.05
					4	圃場C : <0.05
					21	圃場D : <0.05
					17	圃場E : <0.05
					8	圃場F : <0.05
					0, 7, 14, 21	圃場A : <0.01 (7日)
ペカン (果実)	5	17.4%フロアブル	0.17~0.18 lb ai/A (0.19~0.20 kg ai/ha) 散布	2	7	圃場B : <0.01
					7	圃場C : <0.01
					7	圃場D : 0.01
					7	圃場E : <0.01
					0, 7, 14, 21	圃場A : <0.01 (7日)
アーモンド (果実)	5	17.4%フロアブル	0.17~0.18 lb ai/A (0.19~0.20 kg ai/ha) 散布	2	7	圃場B : <0.01
					7	圃場C : <0.01
					7	圃場D : <0.01
					7	圃場E : <0.01
					7	圃場E : <0.01
さとうきび (茎)	1	0.5%粒剤	3.75 g ai/100m	1	147	圃場A : <0.02
さとうきび (茎)	1	0.5%粒剤	7.50 g ai/100m	1	147	圃場A : <0.02
カカオ豆 (種実)	3	200g/L フロアブル	30 g ai/ha 散布	4	0, 1, 3	圃場A : 0.011 (3日)
					0, 1, 3	圃場B : 0.023 (3日)
					0, 1, 3, 7, 14, 20	圃場C : 0.030 (20日)
カカオ豆 (種実)	1	200g/L フロアブル	150 g ai/ha 散布	4	0, 1, 3, 7, 14, 20	圃場A : 0.044 (0日)
コーヒー豆 (種実)	5	17.4%フロアブル	0.10 lb ai/A (0.112 kg ai/ha) 散布	5	6	圃場A : 0.192
					7	圃場B : 0.482
					6	圃場C : 0.295
					7	圃場D : 0.353
					7	圃場E : 0.370

最大使用条件下の作物残留試験に、アンダーラインを付している。

(*) 6-クロロニコチル基を有するイミダクロプリド及び代謝物の総量。(カカオ豆を除く。)

(#) これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
米(玄米をいう)	1	0.2	申	0.05		<0.005, <0.005 / <0.005, <0.005(#) / 0.038, 0.018 / <0.005, 0.006 / 0.058, 0.036 / 0.076, 0.030 / 0.08, 0.02 / 0.04(#), 0.04(#) / 0.08 / 0.16, 0.09 / <0.01(#), <0.01(#) / 0.05(#), 0.03(#) / 0.22(#), 0.31(#)\$ / 0.26(#), 0.28(#) / 0.02, 0.02
小麦	0.05	0.05	○	0.05	0.05	アメリカ 0.013(#), <0.005 / 0.016(#), <0.005(#)
大麦	0.05	0.05		0.05	0.05	アメリカ
ライ麦	0.05	0.05		0.05	0.05	アメリカ
とうもろこし	0.05	0.1	○	0.05	0.05	アメリカ <0.01(#), <0.01(#)(乾燥 種子) <0.01(#), <0.01(#)(生食 用子実) <0.01(#), <0.01(#)(脱穀 種子) <0.01(#), <0.01(#)(生食 用子実)
そば	0.05	0.05		0.05		
その他の穀類	0.05	0.05	経	0.05	0.05	アメリカ
大豆	3.5	1	○		3.5	アメリカ 0.01(#), <0.01(#) 【0.029-2.04(n=24)(米国 大豆)】
小豆類(いんげん、ささげを含む)	4.0	4	○		4.0	アメリカ 0.05(#), 0.04(#) 【0.133-1.120(n=11)(米 国いんげん)】
えんどう	4.0	1	○		4.0	アメリカ 【0.138-1.030(n=6)(米国 えんどう)】
そらまめ	4.0	1	○		4.0	アメリカ 【米国いんげん、えんどう 参照】
らっかせい	0.2	1	○		0.45	アメリカ <0.05, <0.05
その他の豆類	4.0	1	○		4.0	アメリカ 【米国いんげん、えんどう 参照】
ばれいしょ	0.5	0.5	○	0.5	0.40	アメリカ 0.186(#), 0.020(#) / 0.02(#), 0.02(#) / <0.02, <0.02 / <0.02, <0.02 / 0.02, <0.01 【<0.05-0.28(n=25)(米国 ばれいしょ)】
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.1	○		0.40	アメリカ <0.01(#), <0.01(#)
かんしょ	0.05	0.1	○		0.40	アメリカ <0.01, <0.01 / <0.01(#), <0.01(#)
やまいも(長いもをいう)	0.05	0.1	○		0.40	アメリカ <0.01(#), <0.01(#)
こんにゃくいも	0.1	0.1	○			アメリカ <0.01(#), 0.02(#) 【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】
その他のいも類	0.4	0.1			0.40	アメリカ
てんさい	0.05	0.05	○	0.05	0.05	アメリカ <0.01(#), <0.01(#) / <0.01(#), <0.01(#) / <0.01(#), <0.01(#)
さとうきび	0.05	0.05			0.05	オーストラリア 【<0.02(n=2)(豪州さとうき び)】
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.1	0.1	○		0.40	アメリカ 0.014(\$), 0.011 / <0.01, <0.01 【<0.05-0.130(n=4)(米国 ラディッシュ)】
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	4.0	5	○		4.0	アメリカ 0.013, 0.022 / 0.20, 0.01 【0.534-2.744(n=4)(米国 ラディッシュの葉)】 【米国ビート葉参照】

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm	
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm		
かぶ類の根	0.4	0.1		0.40	アメリカ	【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】	
かぶ類の葉	4.0	5		4.0	アメリカ	【米国ビート葉参照】	
西洋わさび	0.4	0.1		0.40	アメリカ	【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】	
クレソン	3.5	5		3.5	アメリカ	【米国ほうれんそう参照】	
はくさい	0.5	0.5	○	3.5	アメリカ	0.06(#), 0.11(#) / 0.06, 0.06 / 0.05(#), 0.13(#)($\$$) 0.04(#), 0.21(#) / 0.02(#) / 0.16(#), 0.05(#) / 0.20(#), 0.07(#)	
キャベツ	0.5	0.5	○	0.5	3.5	アメリカ	<0.02, <0.02(芽キャベツ) <0.2, <0.2 / 0.5, <0.2 (非結球芽キャベツ)
芽キャベツ	0.5	0.5	○	0.5	3.5	アメリカ	
ケール	5	5	緊		3.5	アメリカ	
こまつな	5	5	緊		3.5	アメリカ	
きょうな	5	5	緊		3.5	アメリカ	1.36, 2.39 / 1.30, 2.20
チンゲンサイ	5	5	緊		3.5	アメリカ	
カリフラワー	0.5	5		0.5	3.5	アメリカ	
ブロッコリー	5	5	申	0.5	3.5	アメリカ	0.28(#), 1.94(#) / 0.40, 2.30($\$$) 0.04 / 0.25 / 0.38, 0.38, 0.75(細わさび) 2.30(#), 0.74(#) / 1.37(#), 0.27(#) / 0.2(#), 0.06(#)(わさび)
その他のあぶらな科野菜	5	5	緊		3.5	アメリカ	1.61, 0.46(なばな)
ごぼう	0.05	0.1	○	0.40	アメリカ	<0.01, <0.01 【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】	
サルシフィー	0.4	0.1		0.40	アメリカ		
アーティチョーク	2.5	5		2.5	アメリカ	【1.060-1.886(n=3)(米国 アーティチョーク)】	
チコリ	4.0	5		4.0	アメリカ	【米国ビート葉参照】	
エンダイブ	5	5	○	3.5	アメリカ	2.26, 2.21(#)	
しゅんぎく	5	5	経	3.5	アメリカ	0.08(#), 0.10(#) / 0.09, 0.08 / 0.46, 0.17 / 0.47(#), 0.19(#)(レタス) 0.4, 0.2(サラダ菜) 0.8, 0.2(リーフレタス) 【<0.05-2.13(n=19)(米国 レタス・外葉あり)】 【<0.05-0.72(n=19)(米国 レタス・外葉なし)】 【0.05-2.61(n=22)(米国 リーフレタス)】	
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	2	5	○	2	3.5	アメリカ	0.4, 2.6($\$$)(すいぜんじ な) 0.60, 1.14(葉ごぼう) 0.67, 0.22 / 0.72, 0.44(食用きく) 0.29, 0.22(きくの葉) 0.12, 0.08(ふき)
その他のきく科野菜	5	5	○	6.0	アメリカ		

農産物名	基準値案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
たまねぎ	0.1	0.1	○	0.1		<0.01, <0.01 / <0.01(#), <0.01(#)
ねぎ(リーキを含む)	0.7	1	○	0.05		0.16, <0.01(根深ねぎ) 0.04, 0.22(\$)(葉ねぎ)
にら	1	5	○			<0.4, <0.4
アスパラガス	0.7	5	申			0.14(#), 0.30(#)
わけぎ	2	5	○			0.7, 1.0
その他のゆり科野菜		5				
にんじん	0.1	0.1	○		0.40 アメカ	<0.01, 0.02 【<0.05-0.0896(n=6)(米 国にんじん)】 【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】
パースニップ	0.4	0.1			0.40 アメカ	
パセリ	3	5	○		3.5 アメカ	0.16 / 0.36 / 1.4, 1.3 【米国ほうれんそう参照】
セロリ	6.0	5	○		6.0 アメカ	0.30, 0.68 【0.13-5.62(n=12)(米国セ ロリ)】
みつば	5	5	申			2.77 / 2.50
その他のせり科野菜	6.0	5	○		6.0 アメカ	0.18, 0.10(はまぼうふう) 【米国セロリ参照】
トマト	2	1	○	0.5	1.0 アメカ	0.04, 0.12, 0.14 / 0.08 / 0.06 / 0.08 / 0.15 / 0.12, 0.13 / 0.26(#), 0.13(#)(トマト) 0.24(#), 0.52(#)(\$(ミニト マト)
ピーマン	3	3	○	1	1.0 アメカ	0.08, 0.01 / 1.20(\$), 0.60 / 0.8, 0.8
なす	0.5	0.5	○	0.2	1.0 アメカ	<0.005, <0.005 / 0.121(\$), 0.078 / 0.04, 0.12
その他のなす科野菜	5	5	○	1	1.0 アメカ	1.6(#)(\$, 1.2(#)(ししとう) 1.2(#), 1.5(#)(伏見甘長ど うがらし)
きゅうり(ガーキンを含む)	1	1	○	1	0.5 アメカ	0.010, <0.005 / 0.18, 0.12 / 0.04, 0.04 / 0.08(#), 0.20 / 0.42(#), 0.16(#)
かぼちゃ(スカッシュを含む)	1	1	○	1	0.5 アメカ	
しろり	1	1	緊		0.5 アメカ	
すいか	0.5	0.5	○	0.2	0.5 アメカ	<0.01(#), 0.04(#) / 0.11(#)(\$, 0.02(#)
メロン類果実	0.2	0.2	○	0.2	0.5 アメカ	0.01, 0.01 / 0.03, 0.03 / 0.03, 0.03 / 0.02, <0.01
まくわうり	0.2	0.5	○	0.2	0.5 アメカ	<0.02, <0.02
その他のうり科野菜	1	1	○・緊		0.5 アメカ	0.47(#), 0.85(#) / 0.16, 0.42(\$)(にかうり)
ほうれんそう	3.5	5	○		3.5 アメカ	0.03, 0.17 【2.84, 4.82(n=2)(米国ほ うれんそう)】
たけのこ		0.1				
オクラ	0.7	5	○		1.0 アメカ	0.18, 0.18 / 0.12, 0.21(\$) / 0.16
しょうが	0.4	0.1			0.40 アメカ	【米国ばれいしょ、ラ ディッシュ、にんじん参 照】
未成熟えんどう	0.5	0.5	○		4.0 アメカ	0.06, <0.05 / 0.20, 0.14 【0.195-3.849(n=4)(米国 えんどう(食用さや)】

農産物名	基準値案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
未成熟いんげん	2	2	○	2	4.0 アメカ	0.01, 0.05 / 0.18, 0.30 【<0.05-0.89(n=6)(米国未成熟いんげん)】
えだまめ	3.5	0.5	○		3.5 アメカ	<0.01, 0.16 / 0.10, 0.16 【米国大豆参照】
マッシュルーム		0.5			0.5 オーストラリア	
しいたけ		0.5			0.5 オーストラリア	
その他のきのこ類		0.5			0.5 オーストラリア	
その他の野菜	5	5	○・申	2	6.0 アメカ	1.70, 2.01(ふだんそう) 0.4, 1.0(モロヘイヤ) 0.80, 0.36(食用さくら) 0.48, 0.30 / 0.10, 0.24(さといも葉柄) 0.23, 0.18(食用ブリンラ) 0.11, 0.20(未成熟そらまめ) 0.06 / 0.16(じゆんさい) 0.06, <0.05(むかご) <0.05, <0.05(未成熟ささげ) <0.01, <0.01(くわい) <0.01, <0.01(うど) <0.01, <0.01(ヤングコーン) <0.01, <0.01 / <0.01, <0.01 / <0.01 / <0.01(#)(れんこん) 【<0.100-0.352(n=5)(米国ビート)】 【1.40-3.78(n=5)(米国ビート葉)】
みかん	1	1	○	1	2 オーストラリア	0.02, 0.06 / <0.01(#), <0.01(#)
なつみかんの果実全体	1	1	○	1	2 オーストラリア	0.15, 0.25 / 0.06(#)
レモン	1	1	○	1	2 オーストラリア	
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	1	1	○	1	2 オーストラリア	
グレープフルーツ	1	1	○	1	2 オーストラリア	
ライム	1	1	○	1	2 オーストラリア	
その他のかんきつ類果実	1	3	○	1	2 オーストラリア	0.07(#)(いよかん) 0.03 / 0.15(#)(すだち) 0.26 / 0.05(#)(かぼす)
りんご	0.5	0.5	○	0.5	0.5 アメカ	0.120, 0.029 / 0.20, 0.12 【<0.05-0.74(n=11)(米国りんご)】
日本なし	1	1	○	1	0.6 アメカ	0.197, 0.060 / 0.14(#), 0.19(#) / 0.08, 0.06 / 0.13, 0.12 / 0.15, 0.20(#)
西洋なし	1	1	○	1	0.6 アメカ	【0.25-0.53(n=7)(米国なし)】
マルメロ	0.6	1			0.6 アメカ	【米国なし参照】
びわ	0.5	0.5	○		0.6 アメカ	<0.02(有袋) / 0.05(有袋) / 0.18(\$)(有袋) / 2.54(無袋) / 0.19(無袋)
もも	0.5	0.5	○	0.5	3.0 アメカ	0.195, 0.140 / 0.12(#), 0.11(#) / 0.06, 0.07 / 0.16(#), 0.14(#)
ネクタリン	0.7	1	○	0.5	3.0 アメカ	0.28, 0.18
あんず(アプリコットを含む)	0.7	1	○	0.5	3.0 アメカ	0.29, 0.17
すもも(プルーンを含む)	0.2	0.2	○	0.2	3.0 アメカ	0.07(#), <0.01(#) / 0.04, <0.01
うめ	0.3	3	○			0.07, 0.06
おうとう(チェリーを含む)	3.0	3		0.5	3.0 アメカ	【0.929-2.544(n=4)(米国酸味おうとう)】 【0.243-0.630(n=8)(米国甘味おうとう)】

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現 行 ppm	登 録 有 無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm	
				国際 基準 ppm	外国 基準 値 ppm		
いちご	0.5	3	○		0.50	アメリカ	0.01(#), 0.03(#) / 0.81(#), 0.18(#) 【0.124-0.349(n=9)(米国 いちご)】
ラズベリー	2.5	3			2.5	アメリカ	【<0.050-0.96(n=6)(米国 ラズベリー)】
ブラックベリー	2.5	3			2.5	アメリカ	【0.38(#)-0.70(#)(n=3)(米 国ブラックベリー)】
ブルーベリー	3.5	3			3.5	アメリカ	【<0.05-2.802(n=12)(米 国ブルーベリー)】
クランベリー	0.05	3		0.05	0.05	アメリカ	【<0.050(n=5)(米国クラン ベリー)】
ハックルベリー	3.5	3			3.5	アメリカ	【米国ブルーベリー参照】
その他のベリー類果実	3.5	3			3.5	アメリカ	【米国ブルーベリー参照】 【1.7(n=1)(米国マリオン ベリー)】 【1.5(n=1)(米国ボイゼン ベリー)】
ぶどう	3	3	○	1	1.5	カナダ	1.338(\$), 0.256 / 0.16(#), 0.28(#) / 0.26, 0.06, 0.76, 0.72 / 0.59(#), 0.74(#) / 0.08(#), 0.08(#) / 0.06(#), 0.12(#) / 0.78, 0.41
かき	1	1	○		3.0	アメリカ	0.35, 0.28
バナナ	0.05	0.05		0.05	0.50	アメリカ	<0.05, <0.05
キウイ	0.2	0.5	○				【0.19-0.59(n=3)(米国パ パイヤ)】
パパイヤ	1.0	1			1.0	アメリカ	【<0.050(n=5)(米国アボカ ド)】 【米国パパイヤ参照】
アボカド	1.0	1			1.0	アメリカ	【0.126-0.400(n=4)(米国 グアバ)】
パイナップル	1.0	1					【0.126-0.400(n=4)(米国 グアバ)】
グアバ	1.0	1			1.0	アメリカ	0.49(#), 0.45(#)
マンゴー	1	1	○	0.2	1.0	アメリカ	0.15, 0.28 【米国グアバ参照】
パッションフルーツ	1.0	3	申		1.0	アメリカ	0.18(#), 0.30(#)(アセロラ) 0.26, 0.11(ピタヤ) 0.18 / <0.02(アテモヤ) 【米国おうとう参照】
なつめやし	1.0	3					【0.05(n=6)(米国ひまわ り)】 【米国ひまわり、なたね参 照】
その他の果実	3.0	3	○		3.0	アメリカ	【0.17-2.51(n=19)(米国 綿実)】 【<0.05(n=6)(米国なた ね)】 【米国ひまわり、なたね参 照】
ひまわりの種子	0.05	0.02			0.05	アメリカ	<0.005(#) / 0.01(#) <0.01, <0.01
べにばなの種子	0.05	0.05			0.05	アメリカ	【<0.01-<0.05(n=18)(米 国ペカン)】
綿実	5	3			6.0	アメリカ	【<0.01(n=5)(米国アーモ ンド)】
なたね	0.05	0.05		0.05	0.05	アメリカ	【米国ペカン、アーモンド 参照】
その他のオイルシード	0.05	2			0.05	アメリカ	【米国ペカン、アーモンド 参照】
ぎんなん	0.1	0.1	経				<0.005(#) / 0.01(#) <0.01, <0.01
くり	0.05	0.1	○		0.05	アメリカ	【<0.01-<0.05(n=18)(米 国ペカン)】
ペカン	0.05	0.05		0.05	0.05	アメリカ	【<0.01(n=5)(米国アーモ ンド)】
アーモンド	0.05	0.1			0.05	アメリカ	【米国ペカン、アーモンド 参照】
くるみ	0.05	0.1			0.05	アメリカ	【米国ペカン、アーモンド 参照】
その他のナッツ類	0.05	0.1			0.05	アメリカ	【米国ペカン、アーモンド 参照】

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
茶	10	10	○			2.30, 1.92 / 3.84, 3.98(荒茶) 1.85, 1.90 / 2.53, 3.31(浸出液)
コーヒー豆	0.8		IT		0.80 アメリカ	【0.192-0.482(n=5)(米 国コーヒー豆)】
カカオ豆	0.05	0.05			0.05 EU(オランダ)	【0.011-0.044(n=4)(カ カオ豆)】
ホップ	10	10		10	6.0 アメリカ	
その他のスパイス	5	5			0.05 アメリカ	1.08, 2.28 / 0.24(#), 0.22(#)(みかんの果皮)
その他のハーブ	5	5	○		8.0 アメリカ	2.4, 1.4(あさつき) 1.49, 1.07(コリアンダー) 0.70, 0.28 / 1.68, 0.18(しそ) <0.02 / <0.04(みょうが) <0.1, <0.1(さんしょう)
牛の筋肉	0.1	0.02		0.02	0.3 アメリカ	推:0.024
豚の筋肉	0.1	0.02		0.02	0.3 アメリカ	(牛の筋肉参照)
その他の陸棲哺乳類の筋肉	0.1	0.02		0.02	0.3 アメリカ	(牛の筋肉参照)
牛の脂肪	0.02	0.3			0.3 アメリカ	推:<0.02
豚の脂肪	0.02	0.3			0.3 アメリカ	(牛の脂肪参照)
その他の陸棲哺乳類の脂肪	0.02	0.3			0.3 アメリカ	(牛の脂肪参照)
牛の肝臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	推:0.089
豚の肝臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の肝臓参照)
その他の陸棲哺乳類の肝臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の肝臓参照)
牛の腎臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	推:0.053
豚の腎臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の腎臓参照)
その他の陸棲哺乳類の腎臓	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の腎臓参照)
牛の食用部分	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の肝臓、牛の腎臓参照)
豚の食用部分	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の肝臓、牛の腎臓参照)
その他の陸棲哺乳類の食用部分	0.2	0.05		0.05	0.3 アメリカ	(牛の肝臓、牛の腎臓参照)
乳	0.1	0.02		0.02	0.1 アメリカ	推:0.027
鶏の筋肉	0.02	0.02		0.02	0.05 アメリカ	推:<0.02
その他の家きんの筋肉	0.02	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の筋肉参照)
鶏の脂肪	0.02	0.05			0.05 アメリカ	推:<0.02
その他の家きんの脂肪	0.02	0.05			0.05 アメリカ	(鶏の脂肪参照)
鶏の肝臓	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	推:0.017
その他の家きんの肝臓	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の肝臓参照)
鶏の腎臓	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の肝臓参照)
その他の家きんの腎臓	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の肝臓参照)
鶏の食用部分	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の肝臓参照)
その他の家きんの食用部分	0.1	0.02		0.02	0.05 アメリカ	(鶏の肝臓参照)
鶏の卵	0.02	0.02		0.02	0.02 アメリカ	推:<0.02
その他の家きんの卵	0.02	0.02		0.02	0.02 アメリカ	(鶏の卵参照)
小麦粉(全粉粒を除く。)	0.03	0.03		0.03		
小麦ふすま	0.3	0.3		0.3		
とうがらし(乾燥させたもの)	10			10		

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。
 (\$)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
 (#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。
 「作物残留試験」欄に「推:」の記載のあるものは、推定残留量であることを示している。

イミダクロプリド推定摂取量 (単位: $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$)

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
米(玄米)	1	185.1	97.7	139.7	188.8
小麦	0.05	5.8	4.1	6.2	4.2
大麦	0.05	0.3	0.0	0.0	0.2
ライ麦	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
とうもろこし	0.05	0.1	0.2	0.1	0.0
そば	0.05	0.2	0.0	0.1	0.2
その他の穀類	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
大豆	3.5	196.4	118.0	159.3	205.8
小豆類	4.0	5.6	2.0	0.4	10.8
えんどう	4.0	1.2	0.4	1.2	1.6
そら豆	4.0	0.8	0.4	0.4	1.6
らつかせい	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
その他の豆類	4.0	0.4	0.4	0.4	0.4
ばれいしよ	0.5	18.3	10.7	19.9	13.5
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.6	0.3	0.4	0.9
かんしよ	0.05	0.8	0.9	0.7	0.8
やまいも(長いも)	0.05	0.1	0.0	0.1	0.2
こんにやくいも	0.1	1.3	0.6	1.1	1.3
その他のいも類	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2
てんさい	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2
さとうきび	0.05	0.7	0.6	0.5	0.6
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.1	4.5	1.9	2.9	5.9
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	4.0	8.8	2.0	3.6	13.6
かぶ類の根	0.4	1.0	0.3	0.3	1.7
かぶ類の葉	4.0	2.0	0.4	1.2	4.4
西洋わさび	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
クレソン	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4
はくさい	0.5	14.7	5.2	11.0	15.9
キャベツ	0.5	11.4	4.9	11.5	10.0
芽キャベツ	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
ケール	5	0.5	0.5	0.5	0.5
こまつな	5	21.5	10.0	8.0	29.5
きょうな	5	1.5	0.5	0.5	1.5
チンゲンサイ	5	7.0	1.5	5.0	9.5
カリフラワー	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2
ブロッコリー	5	22.5	14.0	23.5	20.5
その他のあぶらな科野菜	5	10.5	1.5	1.0	15.5
ごぼう	0.05	0.2	0.1	0.1	0.3
サルシフィー	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
アーティチョーク	2.5	0.3	0.3	0.3	0.3
チコリ	4.0	0.4	0.4	0.4	0.4
エンダイブ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
しゅんぎく	5	12.5	3.0	9.5	18.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	2	12.2	5.0	12.8	8.4
その他のきく科野菜	5	2.0	0.5	2.5	3.5
たまねぎ	0.1	3.0	1.9	3.3	2.3
ねぎ(リーキを含む)	0.7	7.9	3.2	5.7	9.5
にら	1	1.6	0.7	0.7	1.6
アスパラガス	0.7	0.6	0.2	0.3	0.5
わけぎ	2	0.4	0.2	0.2	0.6
にんじん	0.1	2.5	1.6	2.5	2.2
パースニップ	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
パセリ	3	0.3	0.3	0.3	0.3
セロリ	6.0	2.4	0.6	1.8	2.4
みつば	5	1.0	0.5	0.5	1.0
その他のせり科野菜	6.0	0.6	0.6	0.6	1.8

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
トマト	2	48.6	33.8	49.0	37.8
ピーマン	3	13.2	6.0	5.7	11.1
なす	0.5	2.0	0.5	1.7	2.9
その他のなす科野菜	5	1.0	0.5	0.5	1.5
きゅうり (ガーキンを含む)	1	16.3	8.2	10.1	16.6
かぼちや (スカッシュを含む)	1	9.4	5.8	6.9	11.5
しろうり	1	0.3	0.1	0.1	0.8
すいか	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
メロン類果実	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
まくわうり	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のうり科野菜	1	0.5	0.1	2.3	0.7
ほうれんそう	3.5	65.5	35.4	60.9	76.0
オクラ	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2
しょうが	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3
未成熟えんどう	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3
未成熟いんげん	2	3.8	2.4	3.6	3.6
えだまめ	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4
その他の野菜	5	63.0	48.5	48.0	61.0
みかん	1	41.6	35.4	45.8	42.6
なつみかんの果実全体	1	0.1	0.1	0.1	0.1
レモン	1	0.3	0.2	0.3	0.3
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	1	0.4	0.6	0.8	0.2
グレープフルーツ	1	1.2	0.4	2.1	0.8
ライム	1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のかんきつ類果実	1	0.4	0.1	0.1	0.6
りんご	0.5	17.7	18.1	15.0	17.8
日本なし	1	5.1	4.4	5.3	5.1
西洋なし	1	0.1	0.1	0.1	0.1
マルメロ	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1
びわ	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
もも	0.5	0.3	0.4	2.0	0.1
ネクタリン	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1
アンズ (アブリコットを含む)	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1
すもも (プルーンを含む)	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0
うめ	0.3	0.3	0.1	0.4	0.5
おうとう (チェリーを含む)	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
いちご	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
ラズベリー	2.5	0.3	0.3	0.3	0.3
ブラックベリー	2.5	0.3	0.3	0.3	0.3
ブルーベリー	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4
クランベリー	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
ハックルベリー	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4
その他のベリー類果実	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4
ぶどう	3	17.4	13.2	4.8	11.4
かき	1	31.4	8.0	21.5	49.6
バナナ	0.05	0.6	0.6	0.4	0.9
キウイ	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4
パパイヤ	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
アボカド	1.0	0.2	0.1	0.1	0.2
グアバ	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
マンゴー	1	0.1	0.1	0.1	0.1
パッションフルーツ	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の果実	3.0	11.7	17.7	4.2	5.1
ひまわりの種子	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
べにばなの種子	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
綿実	5	0.5	0.5	0.5	0.5
なたね	0.05	0.4	0.3	0.4	0.3
その他のオイルシード	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
ぎんなん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
くり	0.05	0.0	0.1	0.0	0.0
ペカン	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
くるみ	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のナッツ類	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	10	30.0	14.0	35.0	43.0
コーヒー豆	0.8	2.1	0.1	1.2	1.1
カカオ豆	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
ホップ	10	1.0	1.0	1.0	1.0
その他のスパイス	5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他のハーブ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
陸棲哺乳類の肉類	0.2	11.5	6.6	12.1	11.5
陸棲哺乳類の乳類	0.1	14.3	19.7	18.3	14.3
家禽の肉類	0.1	2.0	1.9	1.6	2.0
家禽の卵類	0.02	0.8	0.6	0.8	0.8
計		993.6	589.4	810.6	1053.1
ADI比 (%)		32.7	65.4	25.6	34.1

TMDI：理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者については畜産物、妊婦については家きんの卵類の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。

(参考)

これまでの経緯

- 平成18年 3月17日 農薬登録申請（稲に係る適用拡大申請）
平成18年 9月 4日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成18年 9月 7日 食品安全委員会（要請事項説明）
平成19年 2月 6日 第4回農薬専門調査会確認評価第一部会
平成19年 2月23日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
平成19年 3月 8日 食品安全委員会（要請事項説明）
平成19年 3月14日 第13回農薬専門調査会幹事会
平成19年 4月26日 食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表

平成19年 6月14日 食品安全委員会（報告）
平成19年 6月14日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知

平成21年 5月19日 薬事・食品衛生審議会へ諮問
平成21年 5月20日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- | | |
|---------|--|
| 青木 宙 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 |
| 生方 公子 | 北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授 |
| ○大野 泰雄 | 国立医薬品食品衛生研究所副所長 |
| 尾崎 博 | 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 |
| 加藤 保博 | 財団法人残留農薬研究所理事 |
| 斉藤 貢一 | 星薬科大学薬品分析化学教室准教授 |
| 佐々木 久美子 | 元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 |
| 志賀 正和 | 元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長 |
| 豊田 正武 | 実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授 |
| 松田 りえ子 | 国立医薬品食品衛生研究所食品部長 |
| 山内 明子 | 日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長 |
| 山添 康 | 東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授 |
| 吉池 信男 | 青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授 |
| 由田 克士 | 国立健康・栄養研究所栄養疫学プログラム国民健康・栄養調査プロジェクトリーダー |
| 鰐淵 英機 | 大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授 |

(○：部会長)

答申（案）

イミダクロプリド

食品名	残留基準値
	ppm
米	1
小麦	0.05
大麦	0.05
ライ麦	0.05
とうもろこし	0.05
そば	0.05
その他の穀類(注1)	0.05
大豆	3.5
小豆類	4.0
えんどう	4.0
そらまめ	4.0
らつかせい	0.2
その他の豆類(注2)	4.0
ばれいしよ	0.5
さといも類	0.05
かんしよ	0.05
やまいも	0.05
こんにやくいも	0.1
その他のいも類(注3)	0.4
てんさい	0.05
さとうきび	0.05
だいこん類の根	0.1
だいこん類の葉	4.0
かぶ類の根	0.4
かぶ類の葉	4.0
西洋わさび	0.4
クレソン	3.5
はくさい	0.5
キャベツ	0.5
芽キャベツ	0.5
ケール	5
こまつな	5
きょうな	5
チンゲンサイ	5
カリフラワー	0.5
ブロッコリー	5
その他のあぶらな科野菜(注4)	5
ごぼう	0.05
サルシフィー	0.4
アーティチョーク	2.5
チコリ	4.0
エンダイブ	5
しゅんぎく	5
レタス	2
その他のきく科野菜(注5)	5
たまねぎ	0.1
ねぎ	0.7
にら	1
アスパラガス	0.7
わけぎ	2

(注1)「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

(注2)「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

(注3)「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

(注4)「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

(注5)「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

食品名	残留基準値	
	ppm	
にんじん	0.1	
パースニップ	0.4	
パセリ	3	
セロリ	6.0	
みつば	5	
その他のせり科野菜(注6)	6.0	
トマト	2	
ピーマン	3	
なす	0.5	
その他のなす科野菜(注7)	5	
きゅうり	1	
かぼちや	1	
しろり	1	
すいか	0.5	
メロン類果実	0.2	
まくわうり	0.2	
その他のうり科野菜(注8)	1	
ほうれん草	3.5	
オクラ	0.7	
しょうが	0.4	
未成熟えんどう	0.5	
未成熟いんげん	2	
えだまめ	3.5	
その他の野菜(注9)	5	
みかん	1	
なつみかんの果実全体	1	
レモン	1	
オレンジ	1	
グレープフルーツ	1	
ライム	1	
その他のかんきつ類果実(注10)	1	
りんご	0.5	
日本なし	1	
西洋なし	1	
マルメロ	0.6	
びわ	0.5	
もも	0.5	
ネクタリン	0.7	
あんず	0.7	
すもも	0.2	
うめ	0.3	
おうとう	3.0	
いちご	0.5	
ラズベリー	2.5	
ブラックベリー	2.5	
ブルーベリー	3.5	
クランベリー	0.05	
ハックルベリー	3.5	
その他のベリー類果実(注11)	3.5	
ぶどう	3	
かき	1	

(注6)「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

(注7)「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

(注8)「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちや、しろり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

(注9)「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれん草、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

(注10)「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

(注11)「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

食品名	残留基準値
	ppm
バナナ	0.05
キウイ	0.2
パパイヤ	1.0
アボカド	1.0
グアバ	1.0
マンゴー	1
パッションフルーツ	1.0
その他の果実(注12)	3.0
ひまわりの種子	0.05
べにばなの種子	0.05
綿実	5
なたね	0.05
その他のオイルシード(注13)	0.05
ぎんなん	0.1
くり	0.05
ペカン	0.05
アーモンド	0.05
くるみ	0.05
その他のナッツ類(注14)	0.05
茶	10
コーヒー豆	0.8
カカオ豆	0.05
ホップ	10
その他のスパイス(注15)	5
その他のハーブ(注16)	5
牛の筋肉	0.1
豚の筋肉	0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物(注17)の筋肉	0.1
牛の脂肪	0.02
豚の脂肪	0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02
牛の肝臓	0.2
豚の肝臓	0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2
牛の腎臓	0.2
豚の腎臓	0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2
牛の食用部分	0.2
豚の食用部分	0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2
乳	0.1
鶏の筋肉	0.02
その他の家きん(注18)の筋肉	0.02
鶏の脂肪	0.02
その他の家きんの脂肪	0.02
鶏の肝臓	0.1
その他の家きんの肝臓	0.1
鶏の腎臓	0.1
その他の家きんの腎臓	0.1
鶏の食用部分	0.1
その他の家きんの食用部分	0.1
鶏の卵	0.02
その他の家きんの卵	0.02
小麦粉(全粉粒を除く。)	0.03
小麦ふすま	0.3
とうがらし(乾燥させたもの)	10

(注12)「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

(注13)「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

(注14)「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

(注15)「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

(注16)「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

(注17)「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

(注18)「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。