


## 介護療養型医療施設の現状等について

|   |    |
|---|----|
| 1. 入院患者の状態について                                | 1  |
| 2. サービス提供の状況について                              | 2  |
| 3. ケア環境について                                   | 4  |
| 4. 慢性期入院医療実態調査 結果概要（平成17年11月25日<br>中医協資料より抜粋） | 5  |
| 5. 慢性期入院医療について（平成17年11月30日中医協資料<br>より抜粋）      | 9  |
| 6. 介護保険適用と医療保険適用の療養病床の比較                      | 22 |
| 7. 療養病床における介護報酬と診療報酬                          | 23 |


# 1. 入院患者の状態について

## (1) 要介護度別総数



療養病床における医療提供体制に関する調査 (H16 年医療経済研究機構)


## (2) 平均在院日数・平均在所期間



|     | 医療保険療養病床 | 介護保険療養病床 | 介護老人保健施設 |
|-----|----------|----------|----------|
| 中央値 | 349.7 日  | 574.4 日  | 332.0 日  |
| 平均値 | 211.0 日  | 470.0 日  | 406.9 日  |

療養病床における医療提供体制に関する調査 (H16 年医療経済研究機構)


## (3) 要介護あるいは自立して在宅に戻った患者の割合



療養病床における医療提供体制に関する調査 (H16 年医療経済研究機構)

## 2. サービス提供の状況について

### (1) 実施すべきと考える医療処置



療養病床における医療・介護に関する調査(H17年医療経済研究機構)

### (2) 介護保険施設の在り所者のうち施設内で医療処置を受けた者


介護保険施設の在り所者のうち施設内で医療処置を受けた者(医療処置の種類)

|                     | 介護療養型医療施設  | 老人保健施設     | 介護老人福祉施設   |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 経管栄養                | 42.1%      | 10.7%      | 19.8%      |
| 喀痰吸引                | 30.6%      | 8.6%       | 14.6%      |
| その他                 | 19.8%      | 35.1%      | 30.3%      |
| 膀胱カテーテル             | 18.4%      | 8.1%       | 8.5%       |
| 点滴                  | 16.8%      | 10.9%      | 10.6%      |
| 疼痛管理                | 15.9%      | 32.4%      | 26.6%      |
| 褥瘡の処置(Ⅲ度以上)         | 10.9%      | 5.3%       | 6.3%       |
| ネブライザー              | 9.8%       | 3.7%       | 2.4%       |
| 酸素療法                | 5.9%       | 2.3%       | 3.6%       |
| モニター測定(心拍・血圧・酸素飽和度) | 5.6%       | 7.9%       | 8.9%       |
| 気管切開                | 4.1%       | 0.3%       | 0.5%       |
| 中心静脈栄養              | 1.8%       | 0.0%       | 0.2%       |
| 人工肛門                | 1.1%       | 1.8%       | 1.8%       |
| 透析                  | 0.8%       | 0.1%       | 0.0%       |
| ドレーン                | 0.4%       | 0.1%       | 0.2%       |
| 人工膀胱                | 0.2%       | 0.3%       | 0.2%       |
| 人工呼吸器               | 0.0%       | 0.0%       | 0.1%       |
|                     | n=48103(人) | n=46719(人) | n=64775(人) |

平成13年介護サービス施設・事業所調査

### (3) 入院期間の方針


入院期間の方針 (n=212)



療養病床における医療・介護に関する調査(H17年医療経済研究機構)

### (4) 一般病床の有無別 患者の死亡が予想される場合の基本方針


一般病床の有無別 患者の死亡が予想される場合の基本方針



療養病床における医療・介護に関する調査(H17年医療経済研究機構)

### (5) 終末期ケアのマニュアルの有無


終末期ケアのマニュアルの有無 (n=212)



療養病床における医療・介護に関する調査(H17年医療経済研究機構)

(6) 終末期ケアの勉強会等の実施状況


終末期ケアの勉強会等の実施状況 (n=212)



療養病床における医療・介護に関する調査(H17年医療経済研究機構)


3. ケア環境について

(1) 1人部屋の割合



療養病床における医療提供体制に関する調査(H16年医療経済研究機構)

(2) ユニットケアの取り組み



療養病床における医療提供体制に関する調査(H16年医療経済研究機構)

#### 4. 慢性期入院医療実態調査 結果概要

(平成17年11月25日中医協資料より抜粋)


■主な疾患および状態：複数回答（単位：％）

|                                | 医療療養<br>n=14,041 | 介護療養<br>n=6,198 | 特殊疾患療養<br>n=2,669 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 糖尿病                            | 14.3             | 11.8            | 12.5              |
| 不整脈                            | 5.3              | 3.9             | 3.8               |
| うっ血性心不全                        | 9.0              | 8.3             | 7.9               |
| 高血圧症                           | 23.0             | 20.6            | 18.9              |
| 虚血性心疾患                         | 7.0              | 7.1             | 5.6               |
| 大腿骨頸部骨折                        | 8.0              | 8.6             | 4.1               |
| 脊椎圧迫骨折                         | 4.0              | 2.4             | 1.9               |
| その他の骨折                         | 4.5              | 3.5             | 1.9               |
| 関節リウマチ                         | 2.9              | 1.9             | 1.6               |
| アルツハイマー病（アルツハイマー型痴呆）           | 3.7              | 6.2             | 3.1               |
| 失語症                            | 4.5              | 6.1             | 6.9               |
| 脳性麻痺                           | 1.3              | 0.3             | 0.5               |
| 脳梗塞                            | 38.1             | 48.4            | 39.0              |
| 脳出血                            | 13.8             | 15.0            | 19.6              |
| アルツハイマー病以外の痴呆症                 | 15.7             | 22.6            | 9.9               |
| 片側不全麻痺/片麻痺                     | 12.8             | 13.9            | 11.1              |
| 多発性硬化症                         | 0.3              | 0.4             | 0.3               |
| パーキンソン病関連疾患                    | 4.9              | 5.4             | 11.1              |
| 四肢麻痺                           | 4.6              | 5.3             | 10.8              |
| その他の神経難病                       | 1.0              | 0.6             | 4.6               |
| 神経難病以外の難病                      | 0.5              | 0.2             | 0.6               |
| 脊髄損傷                           | 1.2              | 0.5             | 2.1               |
| 喘息                             | 2.8              | 2.2             | 2.5               |
| 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患（COPD）             | 2.6              | 2.0             | 2.4               |
| 腎不全                            | 4.8              | 2.2             | 2.8               |
| がん                             | 5.6              | 3.9             | 4.0               |
| 肺炎                             | 6.4              | 5.1             | 6.7               |
| 尿路感染症                          | 2.8              | 2.8             | 3.3               |
| 創感染                            | 0.5              | 0.6             | 0.5               |
| 脱水                             | 1.6              | 1.5             | 0.9               |
| 体内出血                           | 0.5              | 0.5             | 0.6               |
| 嘔吐                             | 1.1              | 1.4             | 1.3               |
| 褥瘡（2度以上または2箇所以上）               | 6.8              | 6.9             | 7.6               |
| うっ血性潰瘍（末梢循環障害による下肢末端の開放創：2度以上） | 0.4              | 0.5             | 0.6               |
| 医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態  | 1.0              | 0.8             | 0.5               |
| リハビリテーションが必要となる疾患が発症してから30日以内  | 5.1              | 1.3             | 3.8               |
| せん妄の兆候                         | 1.8              | 1.7             | 1.8               |
| うつ状態                           | 6.0              | 5.9             | 5.3               |
| 暴行が毎日見られる状態                    | 1.2              | 2.0             | 1.7               |

■主な医療処置：複数回答（単位：％）


|                      | 医療療養<br>n=14,041 | 介護療養<br>n=6,198 | 特殊疾患療養<br>n=2,669 |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 抗がん剤療法               | 0.2              | 0.0             | 0.1               |
| 透析                   | 2.2              | 0.2             | 0.4               |
| 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻のケア    | 12.7             | 16.8            | 25.0              |
| ドレーン法・胸腹腔洗浄          | 0.3              | 0.3             | 0.2               |
| 酸素療法                 | 3.9              | 3.0             | 7.1               |
| 放射線治療                | 0.0              | 0.0             | 0.1               |
| 吸引（1日8回以上）           | 7.8              | 9.8             | 24.5              |
| 吸引（1日1～7回）           | 10.2             | 12.6            | 16.3              |
| 気管切開口・気管内挿管のケア       | 4.2              | 3.2             | 15.5              |
| 輸血                   | 0.1              | 0.1             | 0.1               |
| レスピレーター              | 0.2              | 0.0             | 2.3               |
| 緩和ケア                 | 0.9              | 1.4             | 1.0               |
| 疼痛コントロール             | 4.7              | 1.8             | 3.9               |
| 膀胱留置カテーテル            | 8.6              | 8.7             | 12.8              |
| 感染隔離病室におけるケア         | 0.8              | 0.8             | 1.0               |
| 血糖チェック（1日3回以上）       | 1.6              | 0.9             | 1.3               |
| 血糖チェック（週1回～1日2回）     | 5.3              | 3.9             | 5.1               |
| インスリン皮下注射            | 3.6              | 3.1             | 4.0               |
| 皮膚の潰瘍のケア             | 4.5              | 4.2             | 4.0               |
| 手術創のケア               | 1.2              | 0.4             | 0.7               |
| 創傷処置                 | 6.9              | 8.1             | 7.3               |
| 足のケア（開放創、蜂巣炎・膿等の感染症） | 1.0              | 0.8             | 1.1               |

## ■ADL自立度



注：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の4項目を対象に、各評価点を合計した（自立0点、準備のみ1点、観察2点、部分的な援助3点、広範な援助4点、最大の援助5点、全面依存、本動作は1回もなかったは6点で換算）


## ■CPS（Cognitive Performance Scale：認知機能尺度）



注：CPSの判定方法は最終ページの参考資料に掲載している。



## ■ 医師による直接医療提供頻度



## ■ 看護師による直接看護提供頻度

