

(参考資料4)

その他の項目

検査

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|------------|------------------------------------|---|
| B 001・2・注2 | 特定疾患治療管理料・特定薬剤治療管理料 | 同一患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は月1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。 |
| B 001・3・注1 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | 悪性腫瘍の患者に対して、 AFP, IAP 及び BTA に係る検査のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。 |
| B 001・3・注2 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | 悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査のうち、1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。 |
| D 001・15 | 尿中特殊物質定性定量検査(マイクロトランスフェリン精密測定(尿中)) | 3か月に1回に限り算定できる。 |
| D 001・16 | 尿中特殊物質定性定量検査(アルブミン定量精密測定) | 3か月に1回に限り算定できる。 |
| D 001・18 | 尿中特殊物質定性定量検査(IV型コラーゲン定量精密測定) | 3か月に1回に限り算定できる。 |
| D 004・8 | 穿刺液・採取液検査(羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP-A)) | 糖尿病を合併しない場合は妊娠満33週より前の時期において1回に限り算定でき、糖尿病を合併する場合は妊娠満32週より前の時期において1回に限り、満32週以降においては週1回に限り算定できる。 |
| D 005・10 | 血液形態・機能検査(ヘモグロビンA1c(HbA1c)) | 本検査、ヘモグロビンA1c(HbA1c)、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定するが、妊娠中の患者については、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。 |
| D 005・9 | 血液形態・機能検査(ヘモグロビンA1(HbA1)) | 本検査、ヘモグロビンA1c(HbA1c)、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定するが、妊娠中の患者については、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。 |
| D 006-2 | 血液細胞核酸增幅同定検査(造血器腫瘍核酸增幅同定検査) | 6月に1回を限度として算定できる。 |

| | | |
|---------|------------------------------------|--|
| D007・11 | 血液化学検査（フルクトサミン） | 本検査、ヘモグロビンA1c (HbA1c)、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定するが、妊娠中の患者については、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。 |
| D007・12 | 血液化学検査（マンガン） | 高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定できる。 |
| D007・19 | 血液化学検査（グリコアルブミン） | 本検査、ヘモグロビンA1c (HbA1c)、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定するが、妊娠中の患者については、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。 |
| D007・23 | 血液化学検査（1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)） | 本検査、ヘモグロビンA1c (HbA1c)、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定するが、妊娠中の患者については、フルクトサミン、グリコアルブミン又は1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。 |
| D007・24 | 血液化学検査（心筋トロポニンT定性） | 心筋梗塞の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。（すでに心筋梗塞の治療のために入院中の患者については算定できない） |
| D007・25 | 血液化学検査（ヘパリン） | 同一の患者につき1月以内に当該検査を2回以上行った場合、算定は1回とし、第1回の測定を行ったときに算定する。 |
| D007・29 | 血液化学検査（リポ蛋白(a)精密測定） | 3月に1回を限度として算定できる。 |
| D007・30 | 血液化学検査（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定） | 原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。 |
| D007・30 | 血液化学検査（尿中デオキシピリジノリン精密測定） | 原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。 |
| D007・34 | 血液化学検査（アセトアミノフェン精密測定） | 同一の患者につき1月以内に2回以上行った場合は、第1回の測定を行ったときに1回に限り算定する。 |
| D007・36 | 血液化学検査（心室筋ミオシン軽鎖I精密測定） | 同一の患者につき同日に2回以上行った場合は、1回のみ算定する。 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|---|
| D007・36 | 血液化学検査（レムナント様リポ蛋白（R L P）コレステロール） | 3月に1回を限度として算定できる。 |
| D007・48 | 血液化学検査（1,25ジヒドロキシビタミンD3（1,25(OH)2D3）） | 活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。 |
| D008・10 | 内分泌学的検査（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（B N P）精密測定） | 入院中の患者については急性心不全又は慢性心不全の急性増悪時の病態把握のため、入院中の患者以外の患者については心不全の病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。 |
| D009・7 | 腫瘍マーカー（P S A精密測定） | 前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転機の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、P S A精密検査の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。 |
| D009・注1 | 腫瘍マーカー（P S A精密測定を除く） | 悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用はB001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、B001・3悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。 |
| D012・10 | 感染症血清反応（ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定） | 除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。 ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。 |
| D012・16 | 感染症血清反応（H I V-1抗体価） | 輸血料（自己血輸血を除く）算定患者又は血漿成分製剤輸注患者に対して、当該輸血又は輸注の最終日から起算して概ね2か月後に行われた場合は、当該輸血又は輸注につき1回に限り算定できる。 |
| D012・17 | 感染症血清反応（H I V-1, 2抗体価） | 輸血料（自己血輸血を除く）算定患者又は血漿成分製剤輸注患者に対して、当該輸血又は輸注の最終日から起算して概ね2か月後に行われた場合は、当該輸血又は輸注につき1回に限り算定できる。 |

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| D012・9 | 感染症血清反応（ヘリコバクター・ピロリ抗体） | <p>除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 <p>除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> |
| D018・2 | 細菌培養同定検査等（消化管からの検体・ヘリコバクター・ピロリの培養法） | <p>除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 <p>除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> |
| D018・7 | 細菌培養同定検査等（迅速ウレアーゼ試験） | <p>除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 <p>除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再度除菌を実施した場合は、1回に限り再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用を算定することができる。</p> |

| | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| D018・8 | 細菌培養同定検査等（尿素呼気試験） | <p>除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 <p>除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> |
| D023・7 | 微生物核酸同定・定量検査（SARSコロナウィルス核酸増幅検査） | 診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。 |
| D101 | 病理組織顕微鏡検査 | 3臓器を限度として算定する。 |
| D101 | 病理組織顕微鏡検査（ヘリコバクター・ピロリの鏡検法） | <p>除菌前の感染診断については、内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に対し、次の5項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 迅速ウレアーゼ試験 ② 鏡検法 ③ 培養法 ④ 抗体測定 ⑤ 尿素呼気試験 <p>除菌後の感染診断については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。</p> |
| D207・2 | 体液量等測定（皮弁血流検査） | 1有茎弁につき2回までを限度として算定する。 |
| D207・2 | 体液量等測定（電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定） | 皮弁形成術及び四肢の血行再建術後1回を限度とする。 |
| D214・1 | 脈波図、心機図、ポリグラフ検査（脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料） | 種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高誘導数による。運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の100分の200を限度として算定する。 |
| D216-2 | 残尿測定検査 | 患者1人につき月2回に限り算定する。 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| D217 | 骨塩定量検査 | 4月に1回を限度とする。 |
| D219 | ノンストレステスト | 1週間につき1回に限り算定できる。 |
| D233 | 直腸肛門機能検査 | 患者1人につき月1回に限り算定する。 |
| D236-3 | 神経磁気診断 | 手術前1回のみ算定できる。 |
| D244-2 | 補聴器適合検査 | 患者1人につき月2回に限り算定する。 |
| D255-2 | 汎網膜硝子体検査 | 患者1人につき月1回に限り算定する。 |
| D256 | 眼底カメラ撮影（インスタントフィルムの費用） | 1回当たり16点を限度とする。 |
| D257 | 細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）（インスタントフィルムの費用） | D256の例により、1回当たり16点を限度とする。 |
| D257 | 細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部） | 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り算定する。 |
| D257・(通) | 細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）後生体染色再検査 | 再検査1回に限りD273により算定する。 |
| D265-2 | 角膜形状解析検査 | 患者1人につき、初期円錐角膜などの角膜変形患者については月1回に限り、角膜移植後患者については2か月に1回を限度とし、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。 |
| D273 | 細隙燈顕微鏡検査（前眼部）（インスタントフィルムの費用） | D256の例により、1回当たり16点を限度とする。 |
| D273 | 細隙燈顕微鏡検査（前眼部）後生体染色再検査 | 再検査1回に限り算定する。 |
| D324 | 血管内視鏡検査 | 患者1人につき月1回に限り算定する。 |

在宅医療

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|--------|--------------|--|
| C001 | 在宅患者訪問診療料 | 1日につき1回に限り週3回を限度（末期の悪性腫瘍の患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する場合を除く）として算定するが、患者の急性増悪等により頻回訪問診療を認める場合（末期の悪性腫瘍の患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する場合を除く）は1月に1回に限り、頻回訪問診療を認めた診療日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定できる。 |
| C005・1 | 在宅患者訪問看護・指導料 | 週3回を限度（厚生労働大臣が定める患者を除く）として算定するが、患者の急性増悪等により頻回訪問看護指導を認める場合（厚生労働大臣が定める患者を除く）は1月に1回に限り、頻回訪問看護を認めた診療日から14日以内に行った訪問看護については14日を限度として算定できる。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| C006 | 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 | 患者1人につき週3回を限度（末期の悪性腫瘍の患者を除く）とし、1日につき1回に限り算定する。 |
| C008 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 1月に2回を限度として算定できる。ただし、月2回算定する場合にあっては、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。 |
| C009 | 在宅患者訪問栄養食事指導料 | 月2回に限り算定する。 |

リハビリテーション

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|----------|-----------------------------|---|
| H・通則4 | リハビリテーション（理学療法・作業療法・言語聴覚療法） | 患者1人につき1日合計4単位（厚生労働大臣が定める患者については1日合計6単位）に限り算定する。 |
| H001・1・イ | 理学療法（個別療法） | 患者1人につき1日3単位に限り算定する。 |
| H001・1・ロ | 理学療法（集団療法） | 患者1人につき1日2単位、かつ、1月合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。 |
| H002・1・イ | 作業療法（個別療法） | 患者1人につき1日3単位に限り算定する。 |
| H002・1・ロ | 作業療法（集団療法） | 患者1人につき1日2単位、かつ、1月合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。 |
| H002-2 | リハビリテーション総合計画評価料（入院患者） | 入院初月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につき1月に1回を限度として算定する。 |
| H002-2 | リハビリテーション総合計画評価料（外来患者） | 理学療法又は作業療法を最初に算定した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につき1月に1回を限度として算定する。 |
| H003・1・イ | 言語聴覚療法（個別療法） | 患者1人につき1日3単位に限り算定する。 |
| H003・1・ロ | 言語聴覚療法（集団療法） | 患者1人につき1日2単位、かつ、1月合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。 |
| H004 | 摂食機能療法 | 1月に4回を限度として算定する。 |

精神科専門療法

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| I 001・1 | 入院精神療法（入院精神療法（I）） | 入院日から起算して3月以内の期間に限り週3回を限度として算定する。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| I 001・2 | 入院精神療法（入院精神療法（II）） | 入院日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、4週間超の期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定するが、重度精神障害者である患者で精神保健指定医が必要と認めた場合は入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する。 |
| I 002 | 通院精神療法 | 退院後4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、その他の場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。 |
| I 004・1 | 心身医学療法（入院患者） | 入院日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、4週間超の期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。 |
| I 004・2 | 心身医学療法（外来患者） | 初診日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、4週間超の期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。 |
| I 005 | 入院集団精神療法 | 入院日から起算して6月に限り週2回を限度として算定する。 |
| I 006 | 通院集団精神療法 | 開始日から6月に限り週2回を限度として算定する。 |
| I 008 | 入院生活技能訓練療法 | 週1回を限度として算定する。 |
| I 009 | 精神科デイ・ケア | 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を越える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。 |
| I 010 | 精神科ナイト・ケア | 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を越える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。 |
| I 010-2 | 精神科デイ・ナイト・ケア | 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を越える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。 |
| I 011-2 | 精神科退院前訪問指導料 | 当該入院中3回に限り算定する。 |
| I 012・1 | 精神科訪問看護・指導料 | 週3回に限り算定する。 |

処置

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|-----------|--|-----------------------------|
| J 038 | 人工腎臓 | 1月に15回目以降は算定できない。 |
| J 038・（通） | 持続緩徐式血液濾過術 (重症急性腎炎の患者) | 一連につきおおむね8回を限度として算定する。 |
| J 038・（通） | 持続緩徐式血液濾過術 (劇症肝炎、術後肝不全 又はこれらと同程度の急 性肝不全の患者) | 一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（多発性骨 髓腫、マクログロブリン 血症） | 一連につき週1回を限度として3月間に限って算定する。 |

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| J 039 | 血漿交換療法（劇症肝炎） | 一連につき概ね10回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（薬物中毒） | 一連につき概ね8回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（重症筋無力症） | 一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（悪性関節リウマチ） | 週1回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（全身性エリテマトーデス） | 月4回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（血栓性血小板減少性紫斑病） | 一連につき週3回を限度として3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（術後肝不全） | 一連につき概ね7回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（急性肝不全） | 一連につき概ね7回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（多発性硬化症、慢性炎症性脱髓性多発根神経炎） | 一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（ギラン・パレー症候群） | 一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（天疱瘡、類天疱瘡） | 一連につき週2回を限度として3月間に限って算定する。ただし、3月間治療を行った後であっても重症度が中等度以上（厚生省特定疾患調査研究班の天疱瘡スコア）の天疱瘡の患者については、さらに3月間に限って算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（巣状糸球体硬化症） | 一連につき3月間に限って12回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（家族性高コレステロール血症） | 維持療法としての実施回数は週1回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（閉塞性動脈硬化症） | 一連につき3月間に限って10回を限度として算定する。 |
| J 039 | 血漿交換療法（同種腎移植） | 一連につき術前は4回を限度とし、術後は2回を限度として算定する。 |
| J 041-2 | 血球成分除去療法（潰瘍性大腸炎） | 一連の治療につき2クールを限度として算定できるが、1クールにつき週1回を限度として5週間に限って算定する。ただし、劇症患者については、第1週目に限り週2回を限度として算定できる。 |
| J 041-2 | 血球成分除去療法（薬物療法抵抗する関節リウマチ） | 一連の治療につき1クールを限度として算定できるが、1クールにつき週1回を限度として5週間に限って算定する。 |
| J 044 | 救急処置としての体表面ペーシング法・食道ペーシング法 | 1日に1回を限度として算定する。 |

| | | |
|-------------|--|--|
| J 054-2・1・注 | 皮膚レーザー照射療法 (色素レーザー照射療法・照射面積加算) | 所定点数の100分の400を限度とする。 |
| J 054-2・2 | 皮膚レーザー照射療法 (Qスイッチ付レーザー照射療法・Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法) | 一連の治療終了後に再発した場合は、同一部位に対しては初回治療を含め2回を限度として算定する。 |
| J 065 | 間歇的導尿 | 3ヶ月間を限度として算定する。 |
| J 070・(通) | 冷却痔処置 | 1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10日間を限度として、1日につき1回算定できる。 |
| J 070-2 | 干渉低周波による膀胱等刺激法 | 治療開始時点においては3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。 |

手術

(1) 自動吻合器、自動縫合器等加算

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|----------|--|---|
| K 017 | 遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付きのもの） | 四肢（手、足、指（手、足）を含む）以外の部位において微小血管自動縫合器を使用した場合は、K 511・注2の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K 020 | 自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付きのもの） | 四肢（手、足、指（手、足）を含む）以外の部位において微小血管自動縫合器を使用した場合は、K 511・注の自動縫合器加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K 511・注 | 肺切除術（自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| (通) | 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術（自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K 514・注 | 肺悪性腫瘍手術（自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に6個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K 529・注 | 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に3個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K 531・注 | 食道切除後2次的再建術（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は3個を限度として加算する。 |
| K 655・注1 | 胃切除術（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は3個を限度として加算する。 |
| K 657・注1 | 胃全摘術（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ2個又は4個を限度として加算する。 |

| | | |
|----------|----------------------------|--|
| K716 | 小腸切除術 | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は3個を限度として加算する。 |
| K719・3・注 | 結腸切除術（自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K735・注 | 先天性巨大結腸症手術（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 「注」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて加算する。 |
| K740・注 | 直腸切除・切断術（自動吻合器又は自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は4個を限度として加算する。 |
| K803・注 | 膀胱悪性腫瘍手術（自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は5個を限度として加算する。 |
| K817・注 | 尿道悪性腫瘍摘出術（自動縫合器加算） | 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、それぞれ1個又は5個を限度として加算する。 |

(2) その他

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|----------|------------------|---|
| K022 | 組織拡張器による再建手術 | 1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。 |
| K047 | 難治性骨折電磁波電気治療法 | 1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後も継続して行っている場合であっても別に算定できない。 |
| K062・(通) | リーメンビューゲル法 | 1回に限り算定する。 |
| K131・注 | 椎弓切除術（椎間加算） | 1椎間を増すごとに100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算点数は所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。 |
| K132・注 | 椎弓形成手術（椎間加算） | 1椎間を増すごとに100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算点数は所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。 |
| K134・4 | 椎間板摘出術（経皮的髓核摘出術） | 1椎間につき2回を限度とする。 |
| K142・注 | 脊椎固定術（椎間加算） | 所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。 |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1日1回、週3回を限度として算定する。 |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 1日1回、週3回を限度として算定する。 |

麻酔

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|------|-----------------|-------------------------------|
| L101 | 神經ブロック（神經破壊剤使用） | 同一神經のブロックは、癌性疼痛を除き月1回に限り算定する。 |
| L104 | トリガーポイント注射 | 回数及び部位数にかかわらず、1日につき1回算定できる。 |

特定保険医療材料

| 名称 | 算定回数制限 |
|------------|--|
| 皮膚欠損用創傷被覆材 | 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。 |
| デキストラノマー | デキストラノマーは、下腿潰瘍、第Ⅱ度熱傷、第Ⅲ度熱傷若しくは消化管瘻周囲皮膚炎の浸出性創面、褥瘡又は術創に対して、2週間（改善傾向が明らかな場合は、3週間）を限度として算定できる。 |

ヘリコバクターピロリの除菌

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|----|---------------|---|
| | ヘリコバクター・ピロリ除菌 | 除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再度除菌を実施した場合は、1回に限り再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用を算定することができる。 |

調剤報酬

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|----|---------------|---|
| 15 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 月4回（がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ週8回）に限り算定する。 |

栄養食事指導料

| 区分 | 診療行為 | 算定回数制限 |
|------------|-----------|--|
| B 001・9・注 | 外来栄養食事指導料 | 医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 |
| B 001・10・注 | 入院栄養食事指導料 | 医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、入院中2回を限度として算定する。 |
| B 001・11・注 | 集団栄養食事指導料 | 医師の指示に基づき管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。入院患者は、入院期間中に2回を限度。 |