

49-80.

- 32) Ikeda M, Yoshimura T. Survival of patients. In: Kuratsune M, Yoshimura H, Hori Y, Okumura M, Masuda Y (eds) *Yusho: A human disaster caused by PCBs and related compounds*. Kyusyu University Press, Fukuoka 1996; 317-323.
- 33) Kociba RJ, Keyes DG, Beyer JE, et al. Results of a two-year chronic toxicity and oncogenicity study of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in rats. *Toxicol Appl Pharmacol* 1978; 46: 279-303.
- 34) Della PG, Dragan TA, Sozzi G. Carcinogenic effects of infantile and long-term 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin treatment in the mouse. *Tumori* 1987; 73: 99-107.
- 35) United States National Toxicology Program. Bioassay of a Mixture of 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin and 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin (CAS No. 57653-85-7 and CAS No. 19408-74-3) for Possible Carcinogenicity (Gavage Study) (Tech. Rep. Series No. 198; DHHS Publication No. (NIH) 80-1754). Bethesda, MD, National Cancer Institute. 1980a.
- 36) United States National Toxicology Program. Bioassay of a Mixture of 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin and 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin (CAS No. 57653-85-7 and CAS No. 19408-74-3) for Possible Carcinogenicity (Dermal Study) (Tech. Rep. Series No. 202; NIH Publication No. 80-1758). Bethesda, MD, National Cancer Institute. 1980b.
- 37) United States National Toxicology Program. Carcinogenesis Bioassay of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (CAS No. 1746-01-6) in Osborne-Mendel Rats and B6C3F1 Mice (Gavage Study) (Tech. Rep. Series No. 209; DHEW Publication No. (NIH) 82-1765). Research Triangle Park, NC. 1982a.
- 38) United States National Toxicology Program. Carcinogenesis Bioassay of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (CAS No. 1746-01-6) in Swiss-Webster Mice (Dermal Study) (Technical Report No. 201; DHEW Publication No. (NIH) 82-1757). Research Triangle Park, NC. 1982b.
- 39) Keenan RE, Paustenbach DJ, Wenning RJ, Parsons AH. Pathology reevaluation of the Kociba et al. (1978) bioassay of 2,3,7,8-TCDD: implications for risk assessment. *J Toxicol Environ Health* 1991; 34: 279-296.
- 40) Goodman DG, Sauer RM. Hepatotoxicity and carcinogenicity in female Sprague-Dawley rats treated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD): a pathology Working Group Reevaluation. *Regul Toxicol Pharmacol* 1992; 15: 245-252.
- 41) International Agency for Research on Cancer. Polychlorinated dibenzo-para-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. IARC Monogr Eval Carc Risk Hum 1997; 69: 324-330, 418-420.

発がん物質の過剰発がん生涯リスクレベルに 対応する評価暫定値（2000）の提案理由

平成12年4月25日

日本産業衛生学会
許容濃度等に関する委員会

石綿（アスベスト） [CAS No. 1332-21-4]

1. 石綿の種類、定義、用途と職業性石綿曝露の機会

1-1. 種類と定義

人類は大昔から天然に産出する纖維状鉱物のうち纖維をほぐすと綿のようにかさ高くなり糸や布に織れるものを石綿と総称して利用してきた。近代鉱物学による鉱物の分類は、結晶構造と化学組成によって行われている。最近まで工業的に使用されてきた石綿を鉱物学的に分類すると、表1の様に6種類の鉱物になる。一部の国やグループでは、この他、幾つかの鉱物も石綿（アスベスト、アミアントス）と呼んで利用していたことも分かっているが、現在、WHOや学会等の機関は石綿の鉱物学的種類として表1の6種類に限定している¹⁻⁴⁾。しかし、逆に表1の鉱物名欄にある6種類の鉱物がすべて石綿かというとそうではない。その中には肉眼的にも顕微鏡的にも纖維状を示さない鉱物もあるので、WHOや学会等の機関はそのうち顕微鏡レベルで長さと幅の比（アスペクト比）が3(3:1)以上の纖維状形態を呈するものを石綿と定義している。職場における石綿粉塵の許容濃度を考察するためには、上記の2つの定義、すなわち鉱物学的な種類と顕微鏡的に見たアスペクト比を用いればよい。

世界的にも日本においても過去に商工業的に用いられてきた石綿は4種類ある。そのうちクリソタイル(chrysotile)が全体の9割以上と最も多く、次いでアモサイト(amosite)、クロシドライト(crocidolite)の順に利用され、4番目のアンソフィライト(anthophyllite)はフィンランドでわずかに採掘されている。日本では、1930年代からクリソタイルをカナダや南アフリカから輸入していたが、第二次大戦とともに輸入が途絶えたため国内石綿の開発が進められ、北海道でクリソタイル、九州でアンソフィライトが採掘された。北米で使用されてきた3種類の石綿(chrysotile, amosite, crocidolite)のうち、95%はカナダ産のchrysotileであり、残りの5%が南アフリカから輸入されたamositeとcrocidoliteが占めていた。

石綿の6種類のうち、蛇紋石系鉱物(serpentine)に分類されるクリソタイルが圧倒的に使用量が多く、その

表 1. 石綿（アスペスト）の分類と名称、化学組成式など

鉱物名	石綿名	化学組成式
蛇紋石族 Serpentines	クリソタイル (chrysotile)	クリソタイル (白(温)石綿 chrysotile) $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$ 12001-29-5*
角閃石族 amphiboles	グリュネ閃石 (grunerite)	アモサイト (褐石綿 amosite) $(Mg, Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$ 12172-73-5*
	リーベック閃石 (曹閃石 riebeckite)	クロシドライト (青石綿 crocidolite) $Na_2Fe_3^{2+}Fe_2^{3+}Si_8O_{22}(OH)_2$ 12001-28-4*
	アンソフィライト (直閃石 anthophyllite)	アンソフィライト (anthophyllite) $Mg_7Si_8O_{22}(OH)_2$ 77536-67-5*
	トレモライト (透閃石 tremolite)	トレモライト (tremolite) $Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$ 77536-68-6*
	アクチノライト (陽起石 actinolite)	アクチノライト (actinolite) $Ca_2(Mg, Fe)_5Si_8O_{22}(OH)_2$ 77536-66-4*

*: CAS No. (Chemical Abstracts Number)

他の5種類はいずれも角閃石系鉱物 (amphibole) に分類されることに留意する必要がある。動物実験等でクロシドライト並みの発がん性があると指摘されているトレモライト (tremolite) は角閃石系鉱物の一種で、鉄分が多いとアクチノライト (actinolite) と呼ばれる。これらは、いずれも蛇紋岩中に認められることが多く、クリソタイルやタルクの不純物として存在する可能性があることに注意が必要である。

1-2. 物性と用途

石綿を特徴付ける物性には、木綿や羊毛と見間違うほどにしなやかで糸や布に織れる（紡織性）、引張りに強い（抗張力）、摩擦・磨耗に強い（耐摩擦性）、高熱に耐える（耐熱性）、熱や音を遮断する（断熱・防音性）、薬品や湿気・細菌に強い（耐薬品性・耐腐食性）などがあり、これらの優れた性質を一種類の物質が兼ね備えていることは石綿以外では極めて稀である。石綿纖維は、圧力をかけたときに縦に裂ける傾向のある平行な束として存在し、高いアスペクト比を保ったまま細い纖維状になり、吸入されやすいサイズとなる。クロシドライトとアモサイトは、クリソタイルよりしなやかさが乏しく、まっすぐで堅い (stiff, harsh) 繊維の傾向がある。

わが国での石綿の用途は、石綿セメント板や合成樹脂の補強材、断熱・防音のための吹付け材、ボイラー配管の保温材、ブレーキライニングのような摩擦材料、薬品・食品の濾過材、耐熱・耐薬品のシール材、などに広く使用してきた。過去にどこに使用されていたかを把握することは、石綿関連疾患の診断など臨床においてあるいは今後の作業者の曝露対策上にも極めて重要である。近年は用途の集約化が進み使用量の95%以上が石綿スレートを中心とする建材に使用されている。石綿の使用量は1990年頃までは年間20万トンを大きく超えていたが、1990年代は着実に減少し、1995年にはクリソ

タイル以外の石綿（アモサイトとクロシドライト）の使用が禁止された。1999年は11万7千トンまで減少し、2000年には10万トンを切る見込みである。

1-3. 石綿の有害性と物性

今までの多くの疫学、動物実験、物理化学的研究で、石綿を含む纖維状鉱物の発がん性は、纖維サイズと体内耐久性が重要な要因として広く認知されてきた。纖維サイズは、長さ5μm以上で幅3μm以下の吸入性纖維サイズのうち長く細いほど発がん性は強くなる。長さが5μm以下の短纖維は発がん性が弱いと見られている。一方、体内耐久性については、肺組織内で溶解・運搬されずに長く滞留する纖維ほど発がん性が高いと見られる。この考え方からして石綿の有害性を考えてみると、纖維サイズは同一種の石綿でも産地によって違いがあり、さらに使用方法や使用過程で変化するので、吸入性纖維サイズの全体に対する割合も様々に変化する。したがって、石綿の種類だけでは有害性の差を一概に特定できないことになる。実際に、同じ石綿を取扱った労働者の発がん率が職種ごとに差があるという疫学報告もある。体内耐久性も纖維サイズに一部は依存するが、一般に角閃石系石綿に比べて蛇紋石系のクリソタイルはやや低いと考えられる⁵⁾。

石綿取扱い職場の浮遊石綿纖維濃度は、メンプランフィルターに捕集した長さ5μm以上の纖維を位相差顕微鏡で計数して一定空気容量当たりの纖維数（纖維/ml）を計算して表現する。欧米では古くから1立方フィート中の浮遊粒子（particle）を100万粒子単位で表したmppcf (million particle per cubic foot) という単位で表すことが多く、1 mppcfが約37纖維/mlに相当する。現在は前記の様に粒子ではなく長さ5μm以上の纖維を計数しているので、相互の変換は直接的にはできないが、粒子数濃度と纖維数濃度の相関を見る場合などに意味が

ある。

1-4. 石綿曝露の機会

石綿は優れた工業材料として長い間様々な用途に使われてきたため、石綿を直接扱う石綿鉱山や石綿工場労働者のみならず石綿製品を扱う労働者や石綿製品が使用されている所で働く労働者、さらに一般住民にまで曝露の機会は広がっている⁴⁾。石綿を直接扱う石綿鉱山や石綿工場労働者以外で比較的曝露量が多い可能性のある職業は、造船業、倉庫業、港湾労働者、船員、ボイラーマン、断熱・保温・配管業、自動車修理業、鉄道車両修理、ビル建築（鉄骨・内装等）業、一般住宅大工・左官・内装業、ビル解体業、廃棄物処理業、ビルメンテナンス、エレベータ設置・メンテナンス、電気配線業、プラスチック成形、その他である。これらの多くの職業に関係する労働者は、過去に石綿取扱いの意識が無く働いていた場合が多く、肺疾患を来たした患者を医師が問診しても石綿職歴を特定できない場合が極めて多いのも事実である。

2. 実験的研究

1951年、Vorwaldら⁶⁾は、クリソタイルの吸入や気管内注入によって、モルモット、ウサギ、ラットに、ヒトの石綿肺で見られるものに類似した肺の気管支周囲線維症が起こることを示した。1974年、Wagnerら⁷⁾は、特定病原体未感染ラットにおけるアモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、クリソタイルの吸入投与試験により石綿肺、肺がん、中皮腫の発生を観察した。

以後、多くの報告でクリソタイルのラット長期吸入実験により線維化および発がん性が示されている。肺の線維化と肺・胸膜腫瘍の発生の間には多くの場合、関連性があると考えられている。肺の線維化と発がん性については吸入以外の曝露すなわち気管内、胸腔内および腹腔内投与によっても立証されている⁸⁾。

動物に対する長期吸入実験では、クリソタイルによる肺線維化病変、肺がん、中皮腫に関する曝露量・反応関係が十分に検討されていない。吸入実験では、主として100から数千纖維/ ml の空气中濃度で1回曝露による方法がとられている。いくつかの報告をまとめると、空气中纖維濃度と肺がんの発生には関連性が見られるようである。しかし、このような分析は実験条件が一定でないので、科学的妥当性に問題がある。

胸腔内および腹腔内投与など非吸入曝露では、クリソタイルの中皮腫発生に関する量反応関係は観察されている。Wagnerら⁹⁾はラットへの胸腔内注入により、クリソタイル、クロシドライトなどが同様の頻度で中皮腫を発生することを観察している。しかしこれらのデータは、ヒトでの吸入によるリスク評価には適していないと思われる。

クリソタイルに少量含有されるトレモライトも一回吸入実験と腹腔注入実験で発がん性と線維化作用が示され

ている。しかしトレモライトとクリソタイルの発がん性の強さを直接比較する曝露量・反応関係のデータは得られていない。

Stanton and Wrench¹⁰⁾およびStantonら^{11, 12)}によるラットでの胸腔内投与実験では、腫瘍の増殖が、長くて($> 8 \mu\text{m}$)細い($< 0.25 \mu\text{m}$)纖維（いわゆるStanton纖維）と最も密接に関連していることが示されている。線維化と発がん性は、纖維の長・短径比（アスペクト比）や耐久性（組織におけるbiopersistence）などの各纖維の個別的特徴に依存すると思われる。 $5 \mu\text{m}$ より短い纖維は、これより長い纖維に比べて、生物学的活性の弱いことが、実験で明らかにされている。しかし短纖維が何らかの重要な生物学的活性を持っているかどうかについては明らかでない。また普通、高齢の実験動物に石綿関連腫瘍が発生するので、纖維がどの程度の期間、肺に滞留すると前がん状態を生じるのか明らかでない。

クリソタイルなどの纖維の線維化および発がん性の機序は、完全に判明してはいない。線維化の機序は、纖維の曝露に伴うTNF- α や活性酸素種の生成により生じる慢性炎症反応が考えられている。実験動物や*in vitro*の実験で纖維曝露により、分子生物学的および形態学的变化が、細気管支および肺胞マクロファージ、上皮細胞、線維芽細胞に発現されることが観察されている。纖維による発がん性に関しては、いくつかの仮説が唱えられている。すなわち纖維による活性酸素種のDNA損傷作用、標的細胞と纖維間の物理的作用による直接的DNA損傷、纖維による細胞増殖の増進、ライソゾーム酵素、活性酸素種、サイトカイン、成長因子の放出を起こす纖維誘発慢性炎症の存在、補発がん剤あるいは標的組織への化学発がん因子の到達を可能にする纖維の作用などが挙げられる。これら全ての機序がクリソタイルの発がん性に関与している可能性もある。喫煙は纖維の排泄を阻害することにより、肺内纖維量を増加させ、サイトカインの産生や細胞傷害を引き起こし肺の線維化を助長すると考えられる¹³⁾。

3. ヒトへの影響

石綿によって生じる疾患としては、じん肺の一種類に分類されている石綿肺、肺がん、悪性中皮腫、および胸膜疾患があり、これらを総称して石綿関連疾患と呼んでいる¹⁴⁻¹⁶⁾。

3-1. 石綿肺

職業曝露により通常10年以上後に発生する疾患で、病理学的には、肺胞および呼吸細気管支に病変が起こり、次第に終末細気管支周囲の線維化から肺胞隔壁の線維化、更には肺胞隔壁の線維性肥厚へと進展していく、不可逆性のびまん性間質性肺線維症である。

石綿肺の自覚症状として最も早期に出現するのは、労

作時の息切れであり、階段、坂道や平地での急ぎ足の際に自覚される。この自覚症状は石綿曝露中止後も次第に進行し、呼吸困難を来たすようになる。咳や痰も主要な症状で、ことに執拗な空咳に悩まされることが多く、痰を伴った場合でも少量の粘性痰であることが多い。時に、頑固な咳とともに血痰がでることもあり、肺がんの合併にも注意が必要になる。

理学的所見として重要なのは、胸部聴診の捻髪様水泡音で、この所見は胸部X線でじん肺所見が認められる以前に出現することで知られている。

胸部X線所見では、珪肺とは異なり粒状影ではなく不整形陰影を主体とするもので、初期には両側肺下野、ことに肋横角付近に微細な線状・網状影として認められるが、進展するに従って両側下肺野から中肺野にわたって線状・網状影が広がりを増し、時に粒状影・小輪状影を伴うこともある。また、心陰影や横隔膜の境界も不鮮明となり、下肺野がガラスで覆われたようになったり、蜂窩状肺像を呈することもある。しばしば、囊胞やびまん性胸膜肥厚、石灰化を伴う限局性胸膜肥厚（プラク：胸膜肥厚斑）を伴う。

3-2. 肺がん

石綿曝露による肺がんと一般住民の肺がんとの間には臨床像に違いはみられない。通常、石綿曝露開始からの潜伏期間は20～40年であるが、10年後に発生した例も報告されている。原発部位は末梢型で下葉に多いとする報告もあるが、臨床的には、喫煙経験者であっても末梢型扁平上皮がんや腺がんの症例に遭遇した場合、職業歴を正確に把握することが肝要である。肺がんの最大要因は紙巻きタバコであるが、石綿と喫煙の両方を吸い込むと、著しく肺がんのリスクが高まることが知られており、この作用は相乗的であるといわれている。

3-3. 悪性中皮腫

悪性中皮腫は、胸膜、腹膜、心膜、睾丸固有鞘膜腔を覆う中皮表面およびその下層の組織から発生する腫瘍で、胸膜発生のものが大半である。発生頻度は年間100万人に数人の割合であるが、かつて石綿がよく使われていた造船所などの地域では、罹患率は10万人に数人程度であると推測される。通常、悪性中皮腫発生の石綿曝露開始からの潜伏期間は20～50年であるが、曝露開始より10年以内に発生した例も報告されている。

初発症状は、大阪中皮腫研究会での100例以上の症例検討の経験¹⁷⁾では、胸膜中皮腫の場合は胸痛が最も多く、次いで健康診断時に異常陰影として見つかったり、胸水貯留による呼吸困難も比較的みられる。腹膜中皮腫の場合は、腹部膨満、腹部腫瘍、腹水が主な初発症状で、胸膜中皮腫、腹膜中皮腫共に、経過中に必ずといってよいほど胸水や腹水が認められる。

胸膜中皮腫の胸部X線像で最も多い所見は胸水貯留

像であるが、胸膜に連なったような軟部組織様の腫瘍影、境界不規則な胸膜肥厚像、葉間裂に腫瘍影、また、まれにではあるが、多発性の結節性腫瘍影、孤立性腫瘍影を呈することもある。胸部CT検査で腫瘍の部位および広がりを確認することも肺がんとの鑑別に参考となる。腹膜中皮腫では腹部エコーと腹部CTが参考になるが、いずれも決め手は病理組織所見である。

3-4. 胸膜疾患

石綿に関連した胸膜疾患としては曝露開始から数年後から起こるとされる胸膜炎とその治癒後にみられるびまん性胸膜肥厚、および曝露開始後20年以上経過のち胸部X線でみられる胸膜プラク（限局性胸膜肥厚斑）がある。

これらのもののうち、胸部X線背腹像で把握されるものはごく一部であるが、最もよくみられるのは、側胸部および横隔膜に沿ってみられる胸膜プラク陰影である。側胸部にみられる陰影は、通常第IV肋骨から第IX肋骨付近に内側に突出した陰影を認めることが多く、通常、左右両側に限局性にみられ、しかもその形状は左右非対称性であることが特徴である。

胸膜炎およびびまん性胸膜肥厚は、胸部X線像のみでは他の疾患との鑑別は不可能であり、結核や肺がんを除外し、石綿による職業曝露歴があつて初めて診断される。石綿曝露開始から数年後に発症することもあれば、30～50年後に発症することもある。胸水の性状は血性のこともあり、はじめ一側に出現したのち、数か月～数年後に対側に出現することもまれでない。石綿肺を伴わない場合でも、長い経過中に繰り返し胸膜炎が起り、胸膜肥厚が進展すれば、呼吸機能障害が生じる。まれに胸膜炎の治癒過程で肺の辺縁が無気肺を起こして、胸部X線上腫瘍と紛らわしい陰影を呈することがあり、これを円形無気肺と呼んでいるが、石綿曝露以外でも生じることがある。

4. 石綿の発がんリスク評価

4-1. リスク評価のための基本的な考え方

評価値決定にあたって、①石綿肺の中から肺がんが生じるという考え方は今日否定的であるため、許容濃度の検討にあたっては従来の石綿肺ではなく、石綿の発がん（肺がんと悪性中皮腫）影響を問題にする、②低濃度曝露についての十分な疫学研究がない中、安全を重視し、石綿の発がん影響には閾値がないと想定する、③他の物質の例にならい、評価値を求めるレベルを1/1000 (10^{-3})と1/10000 (10^{-4})とする、④具体的な検討には多くの疫学データに適合度の高い量反応関係統計モデルを用いる、の4点を基本方針とした。

4-2. 評価値決定のための量反応関係統計モデル

石綿曝露と肺がんまたは中皮腫との量反応関係の検討には、本来はわが国独自の疫学調査に基づいた統計モ

表2. 評価値決定のための量反応関係モデル式

肺癌

$$R_E/R_O = K_L \times (f \times d_{t-p}) + 1 \dots \dots \dots \text{式 (1)}$$

中皮腫

$$\left. \begin{array}{ll} t \geq p + d & AR_M = K_M \times f \times ((t-p)^e - (t-p-d)^e) \\ p + d > t \geq p & AR_M = K_M \times f \times (t-p)^e \\ p > t & AR_M = 0 \end{array} \right\} \dots \dots \dots \text{式 (2)}$$

ただし

 R_E : 石綿曝露集団の肺がん死亡率, R_O : 石綿非曝露集団(標準集団)の肺がん死亡率 K_L : 従来の疫学調査結果から推定した石綿曝露濃度と肺がんの量反応直線の傾きに相当 f : 石綿濃度, d : 曝露年数, t : 石綿の初回曝露からの経過年数, p : 潜伏期間(年) AR_M : 中皮腫の死亡率 K_M : 石綿曝露濃度と中皮腫の量反応直線の傾きに相当 e : 指数項のべき乗、モデル式の適合性から求められた定数。

ルに従うことが望ましいが、モデルを構築できる情報がそろった疫学調査が皆無に近いことや、国際的な評価を得ているOSHAモデルが日本人に適用できないとする積極的な根拠は見あたらないため、OSHAが提唱したモデルを採用する。

OSHAは1985年前後までに発表された疫学調査結果に基づき、多くの疫学データに適合性が高い統計モデルとして、肺がんと中皮腫について表2に示す量反応関係式を提唱している¹⁸⁾。

1) 肺がんの量反応関係式

肺がんは石綿以外の原因によっても発症する比較的頻度の高い疾患であることから、過剰死亡の指標として相対リスクが用いられている。式(1)の左辺がそれで、石綿曝露集団の肺がん死亡リスク R_E を、一般集団(石綿非曝露集団)の肺がん死亡リスク R_O で割って求める。一方、式の右辺にある $(f \times d_{t-p})$ は石綿の累積曝露量の指標である。統計モデル的には相対リスクと直線関係にあることが疫学データに基づいて確認されており、曝露量がゼロの時に反応量である相対リスクは1となる(一般集団の肺がん死亡リスクに一致。右辺の定数項の1)。 d_{t-p} の添え字部分 $(t-p)$ は、死亡リスクに影響する曝露年数の計算に発がんに要する潜伏期間を考慮していることを意味する。具体的には、発がんに関与する石綿曝露年数は、初回曝露年齢から潜伏期間 p だけ平行移動した年齢から、曝露年数分加算された年齢まで、1歳あがるごとに曝露量(d_{t-p})が1年ずつ曝露年数分の年数だけ増え続けた年数とし、それ以上の年齢は曝露量(曝露年数)は一定になると仮定する。 K_L は数学的には回帰直線の傾きであるが、モデル上の意味は肺組織に対する石綿の発がん力とも呼ぶべきものである。発がん性が強ければ K_L の値は相対的に大きくなる。

K_L は、疫学調査で実際に観察されたいいくつかの累積曝露量とその曝露量を持つ集団における肺がんの相対リスクを、式(1)に従って直線回帰させることにより数

学的に求めることができる。利用可能な疫学調査結果ごとに K_L を逐一求めた上で、はづれ値の影響を小さくするためそれらの幾何平均値を K_L の代表値とすれば、石綿曝露量と肺がんの過剰死亡リスクとの量反応関係についての一般式が具体的に決まる。

2) 中皮腫の量反応関係式

一般集団中の中皮腫発生率は肺がんの場合と違って極めて低率であるため、OSHAモデルでは表2の式(2)のごとく、過剰死亡の指標として死亡率そのものを用いている。潜伏期間を考慮している点は肺がんの場合と同じであるが、実際の疫学データに対する適合性を考慮した結果、曝露期間の項を初回曝露からの期間(t)と潜伏期間(p)との関連で場合分けし、指数関数とした上で、石綿繊維濃度との積を累積曝露量としている。 K_M は中皮組織に対する石綿の発がん力を示す係数である。

この量反応関係式を具体的に決定するためには、実際の疫学データから得られた累積曝露量とそれに対する中皮腫の死亡率を式(2)に当てはめ K_M を求めることを、利用し得る疫学調査全てについて行い、 K_M の代表値を決めればよい。前述の肺がんの場合と同じ考え方である。しかし、問題は肺がんの場合ほど利用できるデータが多くはないため、安定した代表値が得られないことである。そこでOSHAは、石綿曝露集団における肺がんと中皮腫の発生率の比較から $K_M = K_L \times 10^{-6}$ の関係を導出し、疫学データがより豊富な肺がんについての肺がんモデルにおける K_L を先に求めたのち K_M を決定している。この結果、式(2)が具体的に決まる。

3) 評価値の決定手順

式(1)と式(2)に K_L と K_M および次に述べる前提条件と、石綿繊維濃度として 1 繊維/ml を代入し、肺がんと中皮腫に対する過剰死亡数をそれぞれ求める。両者の合計が、石綿曝露による発がんにかかる死亡数となる。合計死亡数から予め定めた過剰死亡リスクの大きさ(1/1000ないし 1/10000)に対応する石綿繊維濃度を逆

算して求め、得られた数値を丸めたものを評価値とする。

4-3. 評価値決定の前提条件

1) 生涯過剰死亡リスクについて

ある年齢から一定期間石綿に曝露された者が、現在の死亡状況が変化しないと仮定した場合に、平均寿命に到達するまでの間に石綿に起因する肺がんまたは中皮腫で死亡するリスクを、生涯過剰死亡リスクと呼ぶことにする。具体的には現在の死亡状況と平均寿命を決めるため、前者には確定人口が得られている最新の国勢調査年(1995年)における日本人男性の生命表を用い、後者には最新公表値(1997年)を四捨五入した値の77歳を用いることにした。なお、肺がんの過剰死亡数の算出には標準集団の5歳年齢階級別肺がん死亡率が必要となるが、これにも同じく日本人男性の1995年の結果を用いた。

厳密な過剰死亡リスクを得るために、全く均一の集団を2分し、一方は石綿に曝露させ、他方は曝露させないで発がん数を観察してその差を見ることが必要である。石綿曝露による発がんには、集団の遺伝特性や喫煙率をはじめとする様々な要因の影響を考え得るので、理想的には過剰死亡リスクは評価値を適用する集団ごとにこのような疫学調査(介入研究)を行わなければ結果が得られない。しかし、たとえ同じ集団であれ時代とともに集団特性も変化している可能性があるとともに、集団特性の関与の有無や程度については不明である。また、現実には用いる疫学研究は多くなく、結果の安定性を高めるためには異なる地域の複数の集団から得られた結果をまとめることが必要になる。そこでこうして得られたリスクを生物学的にヒトに対する普遍的な率として、評価値を適用する集団の死亡構造に当てはめるしか実際に可能な方法はない。一方年齢別の生存者数は、この推計結果が適用される集団のものが入手できるのであれば、それを用いない理由はない。そこで生涯過剰死亡リスクを求めるのに、最新の日本人の人口データを用いる。

2) 曝露期間について

想定し得る最長の曝露期間を設定して評価値を求ることにした。最も早い就労開始年齢は義務教育年限が終了する時点である。一方、就労終了年齢については、関連会社からも含め最終的な離職の時期を考え65歳とした。

3) 潜伏期間について

石綿の初回曝露から発がんにいたるまでの潜伏期間の長さについては、必ずしも一致した見解が得られているわけではない。最短の期間を肺がん、中皮腫ともに10年程度¹⁹⁾とするものがあることから、今回も潜伏期間として10年を採用することにした。

4) 喫煙の影響について

喫煙と石綿は肺がんに対して相乗的に作用することが

知られている。しかし評価値検討に当たり用いる疫学研究では、喫煙影響の取り扱いが一定せず、喫煙で区分すると十分な量の情報が得られない。ただOSHAが肺がんについて示したモデルは、表2の式(1)に見るよう相対リスクモデルである。従って石綿作業者の方が全人口集団より喫煙率が高い場合、石綿のリスクを過大評価する可能性があるが、安全性も考慮し直接判断に加えないで推計する。一方、中皮腫死亡については喫煙の影響を認めた報告はない。

5) 性差について

ここでは男性についてのみ論ずる。喫煙と石綿の相乗作用が知られている以上、喫煙率の低い女性を男性と同一に議論することは本来できない。しかし用いる疫学研究はほとんどが男性のものであり、女性についての十分な情報はない。また、喫煙は石綿のリスクを高める方向に働くので、男性の場合をもとに推計しておく方がより安全性に配慮した推計となる。

6) 石綿肺死亡について

今回の評価値の決定は悪性腫瘍に着目したものであり、また、通常、石綿肺死亡は高濃度曝露領域で生ずることが知られているため、石綿肺死亡は考慮外とした。

7) その他の悪性腫瘍について

肺がんと中皮腫以外の悪性腫瘍の死亡リスクが上昇することを認める報告もあるが、確立した見解が得られる段階には至っていないと思われる。従って、今回は考慮外とした。

4-4. 石綿の曝露と悪性腫瘍発生に関する疫学的研究の概要

石綿の曝露量とがんとの量的関連を明らかにするため、リスクの推計に用いた疫学論文及びそれ以外の纖維の種類、曝露量の記載が明確で一定の規模以上の集団を対象とした最近の疫学論文を中心に検討した。

フィンランドの推計²⁰⁾では、累積曝露25 繊維/ml・年で肺がんリスク(SMR)は概ね2倍となり K_L は0.04であった。悪性中皮腫は肺がん2に対し1としている。肺がんのSMRの増加に全死因中に占める肺がん発生率を掛け合わせ、生涯過剰死亡率の推定値とすると、許容生涯危険率0.001に対応する累積曝露量は0.25 繊維/ml・年となり、これを50年の曝露年数で割ると、0.005 繊維/mlという低値となる。

ケベックの鉱山作業者のコホートでの肺がんのリスクに関する報告²¹⁾では、鉱山並びに精錬作業者の場合のモデルで、SMRが1.27となる曝露300 mppcfを用いると $RR = 1 + 0.0009 \text{ mppcf 年}$ ($RR = 1 + 0.0003 \text{ 繊維/ml} \cdot \text{年}$)の式が導かれ、 K_L は0.0003であった。

McDonald JCらによる一連の研究²²⁻²⁴⁾で、鉱山労働者以外を対象とした報告からは、以下のような推計が出来る。肺がんのリスクでは、紡績工場の場合のモデル

で、Dement JM は $RR = 1 + 0.069 \times mppcf$ 年 ($RR = 1 + 0.023 \times 繊維/ml \cdot 年$)、McDonald JC は $RR = 1 + 0.051 \times mppcf$ 年 ($RR = 1 + 0.017 \times 繊維/ml \cdot 年$) を出している。この値は、鉱山作業者の場合の概ね 50 倍の高いリスクである。肺がん SMR が概ね 2 倍観察された条件の職場での悪性中皮腫の生涯発生は 500 例に 1 例という発生率である。McDonald, Dement とも概ね一致したモデル式と考えられ、 K_L は 0.02 であった。

肺がんについての予測モデルについての検証例をあげる²⁵⁾。本論文は EPA の肺がんモデル式に対して、式作成の根拠となったクリソタイル石綿採掘地域の職業的並びに非職業的曝露を受けた集団の実測例から検証を試みたもので、具体的に低いレベルへの外挿の矛盾点を指摘している。ここで EPA の K_L 値の 0.01 は、概ね 10 倍の過大評価としている。

石綿セメント製造作業者を対象とした研究²⁶⁾でも、長期曝露者では曝露量の増加とともに、一定の危険比 (HR : Hazard Ratio) の増加を認めている。この報告では全死亡及び呼吸器疾患によるものを計算している。雇用期間が最低 5 年以上のものでは、4 繊維/ml・年未満で $HR = 1.00$ 、4.9 繊維/ml・年で 1.06、10 繊維/ml・年以上で 1.35、呼吸器疾患では、4 繊維/ml・年未満で $HR = 1.00$ 、4.9 繊維/ml・年で 1.75、10 繊維/ml・年以上で 1.81 となっている。これを直接、肺がん及び中皮腫を対象疾患とした許容濃度設定に用いることは困難であるが、4.9 繊維/ml・年の呼吸器疾患の HR をあえて用いると、EPA の K_L を下回るものと推定され、0.02 繊維/ml 未満となる。

石綿摩擦材製造作業者を対象とした 4 つのコホート研究をまとめた Berry²⁷⁾ のレビューでも、長期曝露者では曝露量の増加とともに、呼吸器系がんの SMR の増加を認めている。また、本報告では低濃度曝露でも増加があることを示している。肺がんの観察例が主体で胸膜中皮腫はほとんどない。女性を除いて、男性の呼吸器がんによる累積曝露量と SMR の関係は、30 繊維/ml・年で 1.67、30-60 未満・繊維/ml・年で 1.02、60-120 未満・繊維/ml・年で 1.05、120-240 未満・繊維/ml・年で 1.63 となっている。著者らの推定 K_L は、0.0005 繊維/ml・年 ($0.0016 mppcf$ 年) である。

ケベック石綿採掘作業者における悪性中皮腫発生状況についての最新の報告²⁸⁾ は、肺がんと中皮腫の相対的発生状況を確認するために有用である。最近の死者者の分析結果ほど、全死因からみた悪性中皮腫の PMR (proportional mortality ratio) は増加している。1985-1992 年においては全死因の 1% を占めており、この原因が全て石綿曝露によるものとすれば、肺がん過剰死亡 2 に対し悪性中皮腫 1 という関係は、主にクリソタイル石綿を主体とした場合においても、大きな隔たりは

ないことを示すものとなっている。同一集団の 1976-1988 の肺がん過剰死亡 (2827 全死亡例) は 93、1975-1992 の中皮腫死亡例は 32 (3747 全死亡例) で、概ね 4 対 1 となっている。

世界保健機構は肺がんについては各種文献からの K_L 推定値を示している²⁹⁾。特に悪性中皮腫についての予測式には代入値を提示していない。悪性中皮腫リスクに対する纖維の種類による差は、基準設定においては考慮されておらず、閾値は存在しないという仮定についても変更はない。 K_L 推定値は、紡織で 0.01-0.03、セメント製品で 0.0003-0.0007、摩擦材製造で 0.0005-0.0006、クリソタイル鉱山で 0.0006-0.0017 としている。上記同様の条件で許容濃度対応値 (許容累積曝露量) を推計すると、紡織で 0.006-0.02 繊維/ml (0.3-1 繊維/ml・年)、セメント製品で 0.3-0.6 繊維/ml (15-30 繊維/ml・年)、摩擦材製造で 0.3-0.4 繊維/ml (15-20 繊維/ml・年)、クリソタイル鉱山で 0.12-0.3 繊維/ml (6-15 繊維/ml・年) となる。ここでも、職種によるリスクの違いについて、その原因は明確ではないとしている。

4-5. 試算結果

1) 試算に用いた疫学論文

以上紹介した疫学論文のうち、OSHA モデル (表 2 の式 (1)) に基づき K_L 値が算出可能であった論文数は 14 報 (表 3) であった。このうち、対象集団がクリソタイルのみの単独曝露と考えられた論文数は 4 報であった^{23), 24, 38, 39)}。なお、以下では K_M は前述のごとく $K_L/10^6$ とする。

2) 試算結果

表 3 のうち 4 つのクリソタイル単独コホートの結果を用いると、 K_L の幾何平均値は 1.889×10^{-3} となった。

既に述べた理由から、初回曝露が 16 歳で、曝露期間を 50 年間、潜伏期間を 10 年、そして平均寿命を 77 歳、 K_M 値は前述のごとく K_L の 10^{-6} 倍とそれぞれ仮定した時、石綿繊維 1 繊維/mlあたりの肺がんの生涯過剰死亡リスクは千人あたり 3.0 人、中皮腫のそれは 3.6 人、合計 6.5 人となった (表 4)。この関係をもとに千人あたり 1 人の石綿繊維濃度を逆算すると 0.1527 繊維/ml となつた。

同様にクリソタイル単独曝露以外の 10 のコホート^{20, 30, 32-37, 40)} の結果を用いると、 K_L の幾何平均値は 7.746×10^{-3} で、同一の仮定下では、合計過剰死亡数が 1,000 人あたり 26.8 人となり、これを 1,000 人に 1 人あたりの過剰死亡に相当する石綿繊維濃度に換算すると 0.0373 繊維/ml となつた (表 4)。

中皮腫の推定にはより情報が少ない中、肺がんの 1/2 とする推計もあるが、最終的な推計結果はほぼ同じになった。

表3. 評価値推定のために検討した疫学論文

文献番号	報告者名	発表年	対象集団	職種	対象人数	アスベスト等の曝露				OSHAモデルに基づくK _L 値	備考
						Chr	Cro	Amo	その他		
20 Huuskonen MS		1995	フィンランド, 保険記録	職種全体	18,943人					0.0400	文献40と同じ
22 McDonald JC		1998	レビュー	紡績工場	—					0.0250	
23 Dement JM, Brown DP, et al.		1994	米国, 人種・性混合, コホート	紡織	3,022人	○				0.0005	文献27でレビュー
24 McDonald AD, Fry JS, et al.		1984	米国, 男性, コホート	摩擦材	3,513人	○				0.0005	曝露資料無し
25 Camus		1998	カナダ, ケベック住人女性	採掘地域	221,375人年	○					肺がん・中皮腫別のデータなし
26 Albin		1996	スウェーデン, コホート	石綿セメント	866名						肺がん/中皮腫比を確認した論文
28 McDonald AD		1997	カナダ, 男性, コホート	ケベック石綿採掘	11,000人					0.0006	文献27でレビュー
30 Newhouse and Sullivan KR		1989	英国, コホート	摩擦材	男性9,104人 女性4,346人	○	○				文献37と同じ工場のコホート
31 Weill H, Hughes JM, et al.		1979	米国, コホート	セメント	5,645人	○	○				
32 Henderson VL and Enterline PE		1979	米国, 65歳以上の男性退職者	製品製造	1,348名	○	○	○		0.0047	
33 Peto J		1980	英国, 男性, コホート	紡織	1933-50:424人 51-78:252人	○	○			0.0076	
34 Selikoff IJ		1979	米国, 男性, コホート	断熱材取り扱い	17,800人	○		○		0.0200	
35 Seidman H		1979	米国, コホート	断熱材製造	820人			○		0.0450	
36 Finkelstein MM		1983	カナダ, 男性, コホート	セメント	328人	○	○		珪酸	0.0480	文献27でレビュー
37 Hughes JM Plant 1		1987	米国, コホート	セメント	2,565人	○	△	△		0.0003	下と同論文内 plant 1
37 Hughes JM Plant 2		1987	米国, コホート	セメント	4,151人	○	○		珪酸	0.0070	上と同論文内 plant 2
38 McDonald JC, Liddell FDK, et al.		1980	カナダ, コホート	鉱山	男性10,939人 女性440人	○				0.0006	
39 Nicholson WJ, Selikoff IJ, et al.		1979	カナダ, コホート	鉱山	544人	○				0.0017	
40 McDonald AD, Fry JS, et al.		1983	米国, 男性, コホート	紡織 Charleston	2,543人	○	○			0.0100	

表4. 肺がんと中皮腫による1/1000過剰死亡を引き起こす石綿繊維濃度の推計

	データ数	K _L 値	肺がんの推定過剰死亡数(対千人)	中皮腫の推定過剰死亡数(対千人)	合計推定過剰死亡数(対千人)	1/1000リスク相当値(繊維/ml)
クリソタイル単独曝露コホート	4	0.001890	2.9584	3.5881	6.5465	0.1527
クリソタイル単独のみを除外	10	0.007746	12.1269	14.7083	26.8352	0.0373
全データ	14	0.005176	8.1036	9.8286	17.9322	0.0558

5. 評価値の勧告

上記の計算結果に対して安全性を考慮して切り下げを行い、日本人の石綿曝露による肺がんと悪性中皮腫の合計生涯リスク評価値として、曝露がクリソタイルのみのとき、 10^{-3} リスクを 0.15 繊維/ml (10^{-4} 0.015 繊維/ml) とすることを勧告する。また曝露がクリソタイル以外の石綿繊維を含むときは、値の単純化も考慮して 10^{-3} リスクを 0.03 繊維/ml (10^{-4} 0.003 繊維/ml) を勧告する。

6. 諸外国における規制値または勧告値

米国

ACGIH：すべての種類の石綿（長さ 5 μm 超、アスペクト比 3 : 1 以上） 0.1 繊維/ml,
グループ A1 (確立されたヒト発がん物質)
OSHA (29CFR1910. 1001)：すべての種類の石綿
0.1 繊維/ml
30 分平均 0.5 繊維/ml
発がん物質

NIOSH (REL: Recommended Exposure Limit)
0.1 繊維/ml
発がん物質

英国

(EH10) : Chrysotile 4 時間平均 0.5 繊維/ml
10 分間平均 1.5 繊維/ml
Action level : 連続 12 週間における累積曝露
96 繊維/ml × hr.
Chrysotile 以外または混合物
4 時間平均 0.2 繊維/ml
10 分間平均 0.6 繊維/ml
Action level : 連続 12 週間における累積曝露
48 繊維/ml × hr.

フランス

Chrysotile とその他の石綿について 0.1 繊維/ml
ドイツ
Chrysotile とその他の石綿について 0.15 繊維/ml
MAK (1997) 石綿 なし
発がん物質 グループ A1
オーストラリア (1990) : Chrysotile 1 繊維/ml.

その他の石綿 0.1 繊維/ml

カテゴリ 1 ; 確立されたヒト発がん物質,

アモサイト, クロシドライト一使用禁止勧告,

ギリシャ

Chrysotile 1.0 繊維/ml
Chrysotile 以外の石綿 0.5 繊維/ml

EU

Chrysotile 0.6 繊維/ml
Chrysotile 以外の石綿 0.3 繊維/ml
(EU 指令 99/77/EEC=1999) 5 年以内にクリソタイルを含め全面禁止

IARC

グループ 1

文献

- WHO. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Asbestos. Lyon: IARC, 1977: 14.
- NIOSH—OSHA Asbestos Work Group. Workplace Exposure to Asbestos: Review and Recommendations. DHHS (NIOSH) Pub. 1980: 81-103.
- 環境庁大気保全局企画課監修.石綿・ゼオライトのすべて.川崎：(財)日本環境衛生センター, 1987: 3-6.
- 神山宣彦. 繊維状鉱物の人体影響—職業曝露から一般環境曝露まで—. 鉱物学雑誌 1987; 18: 191-209.
- 神山宣彦, 森永謙二. アスベストの鉱物化学的特性と人体影響. 志賀・池永・森本編. 環境と健康. 東京: HBJ出版局, 1993: 303-319.
- Vorwald AJ, Durban TM, Pratt PC. Experimental studies of asbestosis. AMA Arch Ind Hyg Occup Med 1951; 3: 1-43.
- Wagner JC, Berry G, Skidmore JW, et al. The effects of the inhalation of asbestos in rats. Br J Cancer 1974; 29: 252-269.
- International Programme on Chemical Safety: Chrysotile Asbestos. Environmental Health Criteria 203. Geneva: World Health Organization, 1998: 70-92.
- Wagner JC, Berry G, Timbrell V. Mesothelioma in rats after inoculation with asbestos and other materials. Br J Cancer 1973; 28: 173-185.
- Stanton MF, Wrench C. Mechanisms of mesothelioma induction with asbestos and fibrous glass. J Natl Cancer

- Inst 1972; 48: 797-821.
- 11) Stanton MF, Layard M, Tegeris A, et al. Carcinogenicity of fibrous glass: pleural response in the rat in relation to fiber dimension. *J Natl Cancer Inst* 1977; 58: 587-603.
 - 12) Stanton MF, Layard M, Tegeris A, et al. Relation of particle dimension to carcinogenicity in amphibole asbestos and other fibrous minerals. *J Natl Cancer Inst* 1981; 67: 965-975.
 - 13) Mossman BT, Churg J. Mechanisms in the pathogenesis of asbestosis and silicosis. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 157: 1666-1680.
 - 14) 森永謙二. アスベストの健康障害. 日本医師会雑誌 1992; 108: 1869-1874.
 - 15) 環境庁大気保全局企画課監修. 石綿・ゼオライトのすべて. 川崎: 日本環境衛生センター, 1987: 181-476.
 - 16) International Programme on Chemical Safety: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres Environmental Health Criteria 53 Geneva, World Health Organization, 1986.
 - 17) 佐々木正道, 北川正信, 森永謙二. びまん型悪性中皮腫の病理—大阪中皮腫パネル 117例の検討—. 病理と臨床 1999; 17: 1111-1116.
 - 18) Occupational exposures to asbestos, tremolite, anthophyllite, and actinolite. *Occupational Safety and Health Administration Federal Register* 1986; 51: 22612-22790. (車谷典男訳編「アスベストの人体への影響」(中央洋書出版部, 1990))
 - 19) Consensus report 'Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution' *Scand J Work Environ Health* 1997; 23: 311-316.
 - 20) Huuskonen MS, Koskinen K, Tossavainen A, et al. Finnish Institute of Occupational Health Asbestos Program 1987-1992. *Am J Ind Med* 1995; 28: 123-142.
 - 21) McDonald JC, Liddell FD, Dufresne A, et al. The 1891-1920 birth cohort of Quebec chrysotile miners and millers: mortality 1976-88. *Br J Ind Med* 1993; 50: 1073-1081.
 - 22) McDonald JC. Unfinished Business: the asbestos textile mystery. *Ann Occup Hyg* 1998; 42: 3-5.
 - 23) Dement JM, Brown DP, Okun A. Follow up study of chrysotile asbestos textile workers: cohort mortality and case-control analyses. *Am J Ind Med* 1994; 26: 431-447.
 - 24) McDonald AD, Fry JS, Woolley AJ, et al. Dust exposure and mortality in an American chrysotile textile plant. *Br J Ind Med* 1983; 40: 361-367.
 - 25) Camus M, Siemiatycki J, Meek B. Nonoccupational exposure to chrysotile asbestos and the risk of lung cancer. *New Eng J Med* 1998; 338: 1565-1571.
 - 26) Albin M, Horstmann V, Jakobsson K, et al. Survival in cohorts of asbestos cement workers and controls. *Occup Environ Med* 1996; 53: 87-93.
 - 27) Berry G. Mortality and cancer incidence of workers exposed to chrysotile asbestos in the friction-products industry. *Ann Occup Hyg* 1994; 38: 539-546.
 - 28) McDonald AD, Case BW, Churg J, et al. Mesothelioma in Quebec chrysotile miners and millers: epidemiology and aetiology. *Ann Occup Hyg* 1997; 41: 707-719.
 - 29) International Programme on Chemical Safety: Chrysotile Asbestos. *Environmental Health Criteria* 203. Geneva: WHO, 1998: 118-142.
 - 30) Newhouse ML, Sullivan KR. A mortality study of workers manufacturing friction materials: 1941-86. *Br J Ind Med* 1989; 46: 176-179.
 - 31) Weill H, Hughes J, Waggoner C. Influence of dose and fiber type on respiratory malignancy risk in asbestos cement manufacturing. *Am Rev Respir Dis* 1979; 120: 345-354.
 - 32) Henderson VL, Enterline PE. Asbestos exposure: factors associated with excess cancer and respiratory disease mortality. *Ann NY Acad Sci* 1979; 330: 117-126.
 - 33) Peto J. Lung cancer mortality in relation to measured dust levels in asbestos textile factory. In: Wagner JC ed. *Biological Effects of Mineral Fibres*. IARC Sci Publ No.30. 1980: 829-836.
 - 34) Selikoff IJ. Mortality experiences of insulation workers in the United States and Canada, 1943-1976. *Ann NY Acad Sci* 1979; 330: 91-116.
 - 35) Seidman H, Selikoff IJ, Hammond EC. Short-term asbestos work exposure and long-term observation. *Ann NY Acad Sci* 1979; 330: 61-89.
 - 36) Finkelstein MM. Mortality among long-term employees of an Ontario asbestos-cement factory. *Br J Ind Med* 1983; 40: 138-144.
 - 37) Hughes JM, Weill H, Hammad YY. Mortality of workers employed in two asbestos cement manufacturing plants. *Br J Ind Med* 1987; 44: 161-174.
 - 38) McDonald JC, Liddell FD, Gibbs GW, et al. Dust exposure and mortality in chrysotile mining, 1910-75. *Br J Ind Med* 1980; 37: 11-24.
 - 39) Nicholson WJ, Selikoff IJ, Seidman H, et al. Long-term mortality experience of chrysotile miners and millers in Thetford Mines, Quebec. *Ann NY Acad Sci* 1979; 330: 11-21.
 - 40) McDonald AD, Fry JS, Woolley AJ, et al. Dust exposure and mortality in an American chrysotile textile plant. *Br J Ind Med* 1983; 40: 361-367.

ヒ素およびヒ素化合物

1. 物理化学的性質

ヒ素	As	CAS No.	7440-38-2
アルシン	AsH ₃		7784-42-1
三塩化ヒ素	AsCl ₃		7784-34-1
五酸化二ヒ素	As ₂ O ₅		1303-28-2
ヒ酸	H ₃ AsO ₄		7778-39-4
ヒ酸水素二ナトリウム (酸性ヒ酸ナトリウム)	Na ₂ HAsO ₄		7778-43-0
ヒ酸カルシウム	As ₂ Ca ₃ O ₈		7778-44-1
酸性ヒ酸鉛	PbHAsO ₄		10031-13-7
三酸化ヒ酸 (亜ヒ酸: As(III))	As ₂ O ₃		1327-53-3