

集計結果

1. 対象者のプロフィール

- 表1-1. 都道府県別受け取り数
- 表1-2. 医学的診断票
- 表1-3. ケースカード
- 表1-4. ニーズ判定票
- 表1-5. 支援計画書
- 図1-1. 性別
- 図1-2. 年齢構成
- 図1-3. 利用施設・サービス[新規登録者]
- 図1-4. 利用施設・サービス[既存登録者]

2. 支援センター相談実態

- 表2-1. 全体平均(最小値-最大値)
- 表2-2. 相談のあった市町村の件数
- 表2-3. 相談のあった市町村の人数
- 表2-4. 相談実態[北海道]
- 表2-5. 相談のあった市町村[北海道]
- 表2-6. 相談実態[宮城県]
- 表2-7. 相談のあった市町村[宮城県]
- 表2-8. 相談実態[千葉県]
- 表2-9. 相談のあった市町村[千葉県]
- 表2-10. 相談実態[埼玉県]
- 表2-11. 相談のあった市町村[埼玉県]
- 表2-12. 相談実態[神奈川県]
- 表2-13. 相談のあった市町村[神奈川県]
- 表2-14. 相談実態[岐阜県]
- 表2-15. 相談のあった市町村[岐阜県]
- 表2-16. 相談実態[三重県]
- 表2-17. 相談のあった市町村[三重県]
- 表2-18. 相談実態[大阪府]
- 表2-19. 相談のあった市町村[大阪府]
- 表2-20. 相談実態[岡山県]
- 表2-21. 相談のあった市町村[岡山県]
- 表2-22. 相談実態[広島県]
- 表2-23. 相談のあった市町村[広島県]
- 表2-24. 相談実態[福岡県]
- 表2-25. 相談のあった市町村[福岡県]
- 表2-26. 相談実態[名古屋市]
- 表2-27. 相談のあった市町村[名古屋市]

3. 支援センターネットワーク活動

- 表3-1. 連携した市町村
- 表3-2. 連携した市町村とその内容

4. 支援コーディネーター

- 表4-1. 都道府県ごとの支援コーディネーター
- 表4-2. 支援コーディネーターの集計
- 図4-1. 支援コーディネーターの職種

1. 対象者のプロフィール

表1-1. 都道府県別受け取り数(2005.1.24時点)

	新規登録者	既存登録者	計
北海道	7	14	21
宮城	1	11	12
千葉	0	14	14
埼玉	3	0	3
神奈川	24	0	24
岐阜	0	6	6
三重	7	2	9
広島	1	32	33
大阪	4	1	5
岡山	7	1	8
福岡	5	9	14
名古屋	5	18	23
国リハ	6	0	6
計	70	108	178

表1-2. 医学的診断票データ(2005.1.24時点で入力済みデータ)

		人数
都道府県	宮城	1
	神奈川	11
	三重	7
	広島	1
	福岡	3
	名古屋	5
	国リハ	6
性別	男性	27
	女性	6
年齢	平均(SD)	34.6(11.4)
	～19歳	2
	20代	10
	30代	12
	40代	4
	50代	4
	60代	1
70歳～	0	
身体障害者手帳	あり	17
	なし	6
知的障害者手帳	あり	0
	なし	23
精神障害者福祉手帳	あり	7
	なし	16
主たる項目	記憶障害	
	前向健忘	12
	逆向健忘	0
	注意障害	
	全般性注意障害	9
	半側空間無視	0
	遂行機能障害	
	目的に適った行動計画作成の障害	9
	目的に適った行動実行の障害	3
	社会的行動障害	
	意欲・発動性の低下	2
	情動コントロールの障害	3
	対人関係の障害	2
依存的行動	0	
固執	1	

従たる項目	記憶障害	前向健忘	20
		逆向健忘	23
	注意障害	全般性注意障害	21
		半側空間無視	1
	遂行機能障害	目的に適った行動計画作成の障害	15
		目的に適った行動実行の障害	18
	社会的行動障害	意欲・発動性の低下	9
		情動コントロールの障害	12
		対人関係の障害	13
		依存的行動	6
		固執	9
身体障害	運動機能系障害		16
	感覚機能系障害		1
	失語症		4
症状・状態像の影響	高次脳機能障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。		0
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。		16
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする		14
	高次脳機能障害を認め、そのために日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。		2
	高次脳機能障害を認め、そのために身のまわりのことはほとんどできない。		0
症状・状態像の有無	受傷・発症以前になし		31
	受傷・発症以前あり		1
	どちらとも言えない		0
検査結果	長谷川式簡易痴呆スケールスコア	15未満	1
		16～19	1
		20～24	4
		25～30	6
		MMSE	17
		24	1
		25	1
		29	1
		30	2
	WAIS_FIQ	70未満	10
		70～90	7
		90以上	12
	WAIS_PIQ	70未満	10
		70～90	9
		90以上	10
WAIS_VIQ	70未満	5	
	70～90	12	
	90以上	11	

表1-3. ケースカードより(2005.1.24時点で入力済みデータ)

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	0	13
	宮城	1	11
	神奈川	24	0
	岐阜	0	6
	三重	7	2
	広島	1	32
	大阪	3	1
	岡山	7	1
	福岡	3	9
	名古屋	5	18
	国リハ	6	0
性別	男性	44	78
	女性	11	15
年齢	平均(SD)	34.9(11.8)	33.9(13.2)
	～19歳	3	7
	20代	19	35
	30代	16	31
	40代	10	6
	50代	6	9
	60代	2	3
	70歳～	0	2
利用施設・サービス (複数回答可)	一般病院	15	23
	リハビリテーション病院	17	41
	精神病院	1	6
	身体障害者更生訓練所	9	9
	身体障害者療護施設	1	0
	身体障害者授産施設	1	5
	地域利用施設	4	7
	精神障害者生活訓練施設	1	0
	精神障害者授産施設	0	1
	小規模作業所	10	15
	グループホーム	0	2
	老人福祉施設	1	2
老人福祉在宅サービス	0	2	
支援費制度利用あり	10	14	
介護保険利用あり	5	6	
医療保険	国民健康保険	28	45
	社会健康保険	17	40
	共済保険	6	4
	その他	3	3
障害者医療	更生医療	2	2
	育成医療	0	0
	その他	9	14

高次脳機能障害	記憶障害		55	85
	注意障害		48	76
	遂行機能障害		48	71
	半側空間無視		2	3
	病識欠落		21	52
	失語		7	17
	失認		4	8
	失行		2	5
	依存性・退行		20	57
	欲求コントロール低下		11	33
	感情コントロール低下		27	44
	対人技能拙劣		32	54
	固執性		27	52
	意欲・発動性の低下		26	33
	抑うつ		10	22
	感情失禁		1	5
身体機能	片麻痺		13	21
	運動失調		13	18
検査結果	長谷川式簡易痴呆スケールスコア	15未満	3	5
		15～19	5	7
		20～24	7	9
		25～30	28	53
	パーセルインデックス	60未満	2	0
		60もしくは65	1	2
		70もしくは75	0	3
		80もしくは85	6	2
		90もしくは95	4	7
		100	39	76
	老研式活動能力指標	0	2	1
		1	0	2
		2	6	6
		3	5	9
		4	1	5
		5	3	6
		6	7	1
		7	2	5
		8	5	4
		9	2	13
10		6	11	
11		5	7	
12		2	8	
13	0	4		
障害尺度	3	2	4	
	3～4	1	0	
	4	11	23	
	4～5	0	1	
	5	17	32	
	6	15	26	
	7	7	5	
	8	0	1	

表1-4. ニーズ判定票より(2005.1.24時点で入力済みデータ)

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	0	13
	宮城	1	10
	千葉	0	14
	神奈川	24	0
	岐阜	0	6
	三重	7	2
	広島	1	32
	大阪	4	1
	岡山	7	1
	福岡	3	9
	名古屋	5	18
	国リハ	6	0
性別	男性	45	87
	女性	12	19
年齢	平均(SD)	34.9(11.7)	33.1(13.3)
居住状況	入院	1	2
	入所	13	10
	在宅	41	94
家族状況(援助・理解)	あり	55	96
	なし	1	9
経済状況	良好	29	80
	不良	26	22

表1-5. 支援計画書より(2005.1.24時点で入力済みデータ)

		新規登録者	既存登録者
都道府県	北海道	0	13
	宮城	1	9
	神奈川	24	0
	岐阜	0	6
	三重	7	2
	広島	1	32
	大阪	4	1
	岡山	7	1
	福岡	3	9
	名古屋	5	18
		国リハ	6
支援内容(注1)	就業支援	19	18
	就学支援	2	12
	授産施設支援	3	5
	小規模作業所等支援	6	14
	就業・就学準備支援	9	11
	在宅支援	11	16
	施設での生活訓練支援	2	6
	施設での生活援助支援	1	1

(注1:複数記入されていたケース場合は、事務局で主たる支援1つにしました。)

